

الصفحة  
1  
3

# الأمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة الاستدراكية 2016

### - الموضوع -

٤٠٥٣٤٦٤ | ٤٠٥٣٤٧٦ | ٤٠٥٣٤٩٥ | ٤٠٥٣٤٩٨ | ٤٠٥٣٤٩٩



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم  
وامتحانات والتوجيه

RS 22

3	مدة الإجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها	الشعبة أو المسلك

## تعليمات عامة

- عدد الصفحات: 3 (الصفحة الأولى تتضمن تعليمات ومكونات الموضوع والصفحتان المتبقيتان تتضمنان موضوع الامتحان) ؛
- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- ينبغي تفادى استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ؛
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين ، فكل رمز مرتبط بالتمرین المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

## مكونات الموضوع

- يتكون الموضوع من أربعة تمارين و مسألة، مستقلة فيما بينها، و تتوزع حسب المجالات كما يلي :

3 نقط	المتاليات العددية	التمرین الأول
3 نقط	ال الهندسة الفضائية	التمرین الثاني
3 نقط	الأعداد العقدية	التمرین الثالث
3 نقط	حساب الاحتمالات	التمرین الرابع
8 نقط	دراسة دالة عددية و حساب التكامل	مسألة

- بالنسبة لمسألة  $\ln$  يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري.

**التمرين الأول : (3 ن)**

نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة بما يلي :  $u_{n+1} = \frac{1}{16} u_n + \frac{15}{16}$  و  $u_0 = 2$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

1) أ- بين بالترجع أن  $u_n > 1$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  0.5

ب- تحقق من أن  $u_{n+1} - u_n = -\frac{15}{16}(u_n - 1)$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  ثم بين أن المتالية  $(u_n)$  تناقصية. 0.5

ج- استنتج أن المتالية  $(u_n)$  متقاربة. 0.25

2) لتكن  $(v_n)$  المتالية العددية بحيث  $v_n = u_n - 1$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

أ- بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{1}{16}$  و اكتب  $v_n$  بدالة  $n$  1

ب- بين أن  $u_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  ثم حدد نهاية المتالية  $(u_n)$  0.75

**التمرين الثاني : (3 ن)**

نعتبر، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، النقطتين  $A(1, 3, 4)$  و  $B(0, 1, 2)$

1) أ- بين أن  $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$  0.5

ب- بين أن  $2x - 2y + z = 0$  هي معادلة ديكارتية للمستوى  $(OAB)$ . 0.5

2) لتكن الفلكة  $(S)$  التي معادلتها  $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z + 2 = 0$  0.5

بين أن مركز الفلكة  $(S)$  هو النقطة  $\Omega(3, -3, 3)$  و شعاعها 5

3) أ- بين أن المستوى  $(OAB)$  مماس للفلكة  $(S)$  0.75

ب- حدد مثلث إحداثيات  $H$  نقطة تمس المستوى  $(OAB)$  و الفلكة  $(S)$  0.75

**التمرين الثالث: (3 ن)**

1) حل في مجموعة الأعداد العقدية  $C$  المعادلة :  $z^2 - 8z + 41 = 0$  0.75

2) نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعمد منظم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $\Omega$  التي أحقها

على التوالي هي  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $\omega$  بحيث  $a = 4 + 5i$  و  $b = 3 + 4i$  و  $c = 6 + 7i$  و  $i$  و  $\omega = 4 + 7i$  0.75

أ- احسب  $\frac{c-b}{a-b}$  و استنتاج أن النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية . 0.75


ب- ليكن  $z$  لحق نقطة  $M$  من المستوى و  $z'$  لحق النقطة  $M'$  صورة  $M$  بالدوران  $R$  الذي مركزه  $\Omega$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$  0.75

بين أن  $z' = -iz - 3 + 11i$

ج- حدد صورة النقطة  $C$  بالدوران  $R$  ثم أعط شكلاً مثلياً للعدد  $\frac{a-\omega}{c-\omega}$  0.75

التمرين الرابع : (3 ن)

يحتوي صندوق على 10 كرات تحمل الأعداد : 1 و 2 و 2 و 3 و 3 و 3 و 4 و 4 و 4 و 4 .  
( لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس ) .



نعتبر التجربة التالية: نسحب عشوائياً بالتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق.  
(1) ليكن  $A$  الحدث : " الحصول على كرتين تحملان عددين زوجيين " .

$$\text{بين أن : } p(A) = \frac{1}{3}$$

(2) نكرر التجربة السابقة ثلاثة مرات بحيث نعيد الكرتين المسحوبتين إلى الصندوق بعد كل تجربة .  
ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد المرات التي يتحقق فيها الحدث  $A$

$$\text{بين أن } p(X=1) = \frac{4}{9} \text{ ثم حدد قانون احتمال المتغير العشوائي } X$$

مسألة : (8 ن)

I- لتكن  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $[0, +\infty]$  بما يلي :

الجدول جانبه هو جدول تغيرات الدالة  $g$  على  $[0, +\infty]$

$x$	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$\downarrow g(1)$	$+\infty$

$$(1) \text{ احسب } g(1)$$

(2) استنتج انطلاقاً من الجدول أن:  $g(x) > 0$  لكل  $x$  من  $[0, +\infty]$

1

2

II- نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $[0, +\infty]$  بما يلي :

وليكن  $(C)$  المنحني الممثل للدالة  $f$  في معلم متعمد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ( الوحدة :  $2 \text{ cm}$  )

(1) بين أن  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  و أعط تأويلاً هندسياً لهذه النتيجة .

(2) أ- بين أن  $f(x) = x \left[ \frac{3}{x} - 3 + 2 \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right]$  ( لحساب النهاية يمكنك كتابة  $f(x)$  على الشكل

ب- بين أن المنحني  $(C)$  يقبل فرعاً شلجمياً في اتجاه محور الأراتيب بجوار  $+\infty$

(3) أ- بين أن  $f'(x) = g(x)$  لكل  $x$  من  $[0, +\infty]$

ب- استنتاج أن الدالة  $f$  تزايدية قطعاً على  $[0, +\infty]$  ثم ضع جدول تغيرات الدالة  $f$  على  $[0, +\infty]$

(4) أ- بين أن  $(1, 0)$  نقطة انعطاف للمنحني  $(C)$

ب- بين أن  $y = x - 1$  هي معادلة ديكارتية للمستقيم  $(T)$  مماس المنحني  $(C)$  في النقطة  $I$

ج- أنشئ ، في نفس المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ، المستقيم  $(T)$  و المنحني  $(C)$

$$(5) \text{ أ- بين أن } \int_1^2 \left( 1 + \frac{x}{2} \right) dx = \frac{7}{4}$$

$$\text{ب- باستعمال متكاملة بالأجزاء ، بين أن } \int_1^2 (x+1) \ln x dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$$

ج- احسب ، ب  $\text{cm}^2$  ، مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحني  $(C)$  و محور الأفاصيل و المستقيمين

$$\text{الذين معادلتها } x=1 \text{ و } x=2$$

$$(6) \text{ حل مبيانيا المترابطة : } x \in [0, +\infty[ ; (x+1) \ln x \geq \frac{3}{2}(x-1)$$

0.25

0.75

0.75

0.5

0.5

0.75

0.75

0.75

0.5

0.5

0.25

0.75

0.75

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5