

الصفحة	1	<b>الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا</b> الدورة الاستدراكية 2020 - الموضوع -	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات
4	**1		
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS		RS 22	

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلك

### تعليمات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة .

### مكونات الموضوع

يتكون الموضوع من ثلاثة تمارين و مسألة، مستقلة فيما بينها، و تتوزع حسب المجالات كما يلي:

2 نقط	المتتاليات العددية	التمرين الأول
5 نقط	الأعداد العقدية	التمرين الثاني
4 نقط	الاشتقاق و حساب التكامل	التمرين الثالث
9 نقطة	دراسة دالة عددية و متتالية عددية	المسألة

• نرمز بـ  $|z|$  لمعيار العدد العقدي  $z$  و بـ  $\bar{z}$  لمرافق  $z$

•  $\ln$  يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري

الصفحة	RS 22	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - الموضوع - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	
2			
4			
		التمرين الأول ( 2 نقط ):	
		لتكن المتتالية العددية $(u_n)$ المعرفة كما يلي: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n - 8}{2u_n - 5}$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
	0.5	(1) بين أن $u_n < 2$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
	0.5	(2) نضع $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n - 2}$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
	0.5	أ- بين أن $(v_n)$ متتالية حسابية أساسها 2	
	0.75	ب- اكتب $v_n$ بدلالة $n$ واستنتج $u_n$ بدلالة $n$	
	0.25	ج- احسب نهاية المتتالية $(u_n)$	
		التمرين الثاني ( 5 نقط ) :	
	0.75	(1) حل في مجموعة الأعداد العقدية $\square$ المعادلة: $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$	
	0.75	(2) نضع $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$	
	0.75	أ) أكتب $a$ على الشكل المثلثي واستنتج أن $a^{2020}$ عدد حقيقي	
	0.5	ب) ليكن العدد العقدي $b = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ ، أثبت أن $b^2 = a$	
	0.25	(3) في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط $A$ و $B$ و $C$ التي أحاقها على التوالي هي $a$ و $b$ و $c$ حيث $c = 1$ . ليكن الدوران الذي مركزه $O$ وزاويته $\frac{\pi}{8}$ والذي يحول النقطة $M$ ذات اللق $z$ إلى النقطة $M'$ ذات اللق $z'$	
	0.5	أ- تحقق أن $z' = bz$	
	0.5	ب- حدد صورة النقطة $C$ بالدوران $R$ و بين أن النقطة هي $A$ صورة النقطة $B$ بالدوران $R$	
	0.75	(4) أ- بين أن $ a-b  =  b-c $ ثم استنتج طبيعة المثلث $ABC$	
	0.5	ب - حدد قياسا للزاوية $(\overline{BA}, \overline{BC})$	
	0.25	(5) نعتبر $T$ الإزاحة ذات المتجهة $\vec{u}$ و لتكن النقطة $D$ صورة النقطة $A$ بالإزاحة $T$	
	0.75	أ- تحقق ان لاق النقطة $D$ هو العدد العقدي $b^2 + 1$	
	0.75	ب- بين أن $\frac{b^2 + 1}{b} = b + \bar{b}$ واستنتج ان النقط $O$ و $B$ و $D$ مستقيمية	
		التمرين الثالث ( 4 نقط ) :	
	0.5	نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\square$ بما يلي : $u(x) = e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}$	
	0.25	(1) أ- بين ان لكل $x$ من $\square$ : $u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$	
	0.5	ب - ضع جدول تغيرات الدالة $u$ (حساب النهايات غير مطلوب)	
	0.5	ج - استنتج إشارة الدالة $u$ على $\square$ (لاحظ ان $u(0) = 0$ )	
	0.25	(2) لتكن الدالة $v$ المعرفة على $\square$ ب : $v(x) = e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3$	

الصفحة	RS 22	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - الموضوع - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	
3			
4			
		<p>أ - تحقق من أن <math>v(x) = e^x u(x)</math> لكل <math>x</math> من <math>\square</math> 0.5</p> <p>ب - استنتج إشارة الدالة <math>v</math> على <math>\square</math> 0.5</p> <p>3) أ- بين أن الدالة <math>W</math> المعرفة بـ: <math>W(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + (4-2x)e^x - 3x</math> هي دالة أصلية للدالة <math>v</math> على <math>\square</math> 0.5</p> <p>ب- أحسب التكامل <math>\int_0^2 v(x)dx</math> 0.5</p> <p>ج- بين أن <math>\frac{9}{2}</math> هي القيمة الدنيا المطلقة للدالة <math>W</math> على <math>\square</math> 0.75</p>	
		<p>المسألة (9 نقطة) :</p> <p>I - لتكن <math>g</math> الدالة العددية المعرفة على <math>]0, +\infty[</math> كما يلي : <math>g(x) = e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2</math></p> <p>1) بين أن <math>\forall x \in ]0, +\infty[, g'(x) &lt; 0</math> 0.5</p> <p>2) استنتج جدول إشارة <math>g(x)</math> على المجال <math>]0, +\infty[</math> (لاحظ أن <math>g(1) = 0</math>) 0.5</p> <p>II - نعتبر الدالة العددية <math>f</math> المعرفة على <math>]0, +\infty[</math> بما يلي : <math>f(x) = (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln x</math></p> <p>و <math>(C)</math> المنحنى الممثل للدالة <math>f</math> في معلم متعامد ممنظم <math>(O, \vec{i}, \vec{j})</math> (الوحدة <math>2\text{ cm}</math>)</p> <p>1) أثبت أن <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty</math> ثم أول النتيجة هندسيا 0.5</p> <p>2) أ) بين أن <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty</math> 0.5</p> <p>ب) بين أن <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty</math> ثم أول النتيجة هندسيا 0.75</p> <p>3) أ) بين أن <math>f'(x) = (x-2)g(x)</math> لكل <math>x</math> من <math>]0, +\infty[</math> 1</p> <p>ب) بين أن الدالة <math>f</math> تناقصية على <math>]0, 1[</math> وعلية <math>]2, +\infty[</math> وأنها تزايدية على المجال <math>[1, 2]</math> 0.75</p> <p>ج) ضع جدول تغيرات الدالة <math>f</math> على المجال <math>]0, +\infty[</math> (نقبل أن <math>f(2) \square 1, 25</math>) 0.25</p> <p>4) علما أن <math>f(3) \square 0, 5</math> و <math>f(4) \square -1, 9</math> برهن أن المعادلة <math>f(x) = 0</math> تقبل حلا وحيدا في المجال <math>]3, 4[</math> 0.5</p> <p>5) أنشئ المنحنى <math>(C)</math> في المعلم <math>(O, \vec{i}, \vec{j})</math> 1</p>	
		<p>III- نضع <math>h(x) = f(x) - x</math> لكل <math>x</math> من المجال <math>[1, 2]</math></p> <p>1- أ) انطلاقا من جدول تغيرات الدالة <math>h</math> جانبه بين أن <math>f(x) \leq x</math> لكل <math>x</math> من المجال <math>[1, 2]</math> 0.5</p> <p>ب) بين أن 1 هو الحل الوحيد للمعادلة <math>f(x) = x</math> على المجال <math>[1, 2]</math> 0.25</p> <p>2) لتكن المتتالية العددية <math>(u_n)</math> المعرفة كما يلي : <math>u_0 = 2</math> و <math>u_{n+1} = f(u_n)</math> لكل <math>n</math> من <math>\mathbb{N}</math></p> <p>أ) بين بالترجع أن لكل <math>n</math> من <math>\mathbb{N}</math> <math>1 \leq u_n \leq 2</math> 0.75</p> <p>ب) بين أن المتتالية <math>(u_n)</math> تناقصية 0.5</p> <p>ج) استنتج أن المتتالية <math>(u_n)</math> متقاربة ثم أحسب <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n</math> 0.75</p>	

$x$	1	2
$h(x)$	0	$h(2)$

الصفحة	4		<b>الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا</b> الدورة العادية 2020 - عناصر الإجابة -	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات
4				
**1	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS		NR 22	
3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة	
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلك	