

التمرين 1: bac_pc_2015_Nor

ن 0.75	<ul style="list-style-type: none"> • الخصائص البنوية: <ul style="list-style-type: none"> - وجود تراكبات. - وجود فوالق معاكسة. - وجود طيات. 	أ-1
ن 0.75	<ul style="list-style-type: none"> • الخصائص الصخرية: <ul style="list-style-type: none"> - وجود صخور بلوتونية : الكرانوديوريت - أوفيليت. <p>- صخور متحولة : الشيست الأخضر والشيست الأزرق.</p>	ب
ن 0.5	<ul style="list-style-type: none"> • دليلي الطمر : <ul style="list-style-type: none"> - وجود الأوفيليت المتحول ← اختفاء محيط قديم. - الكرانوديوريت: صهارة أنديزيتية. 	ب
ن 0.5	<ul style="list-style-type: none"> • دليلي الاصطدام : <ul style="list-style-type: none"> - تشوہات تکتونیہ من النوع الانضغاطی: تراكبات، طیات، فوالق معاكسة. - تواجد سلسلة جبال زاغروس فی منطقہ تجابہ صفحیتین (مجالین قاریین). - وجود أوفيليت بين مجالين قاريين. 	ب
ن 0.5	<ul style="list-style-type: none"> • الشيست الأخضر ينتمي إلى المجال B : <p style="text-align: center;">$0.4 \text{ GPa} < P < 1 \text{ GPa}$</p> <p style="text-align: center;">$70^\circ\text{C} < T < 470^\circ\text{C}$</p> <ul style="list-style-type: none"> • الشيست الأزرق ينتمي إلى المجال C : <p style="text-align: center;">$0.6 \text{ GPa} < P < 1.4 \text{ GPa}$</p> <p style="text-align: center;">$100^\circ\text{C} < T < 390^\circ\text{C}$</p>	- 2
ن 0.25	<p>هذه القيم تقریبیة، تقبل كل قيمة درجة حرارة ($\pm 10^\circ\text{C}$) وضغط ($\pm 0.1 \text{ GPa}$)</p>	ب
ن 0.25	<p>تشكل كل من الشيست الأخضر والشيست الأزرق نتيجة حدوث تحول دینامي.....</p> <p>التعديل : التحول في ظروف ناجمة عن ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة نسبيا.....</p>	3
ن 1	<p>خضوع الصفيحتين العربية والأوروآسيوية لقوى انضغاطية ← انغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة العربية ← ارتفاع مهم للضغط دون تغير ملحوظ في درجة الحرارة ← تحول دینامي ← تشكل صخور متحولة.....</p> <p>ملحوظة: يقبل الجواب إذا تجاوز المترشح مرحلة الطمر بتطرفه لظاهرة الاصطدام.</p>	4

التمرين 2: bac_pc_2014_Nor

ن 0.5	<p>التغيرات العيدانية:</p> <p>عند الانتقال من X إلى Y يلاحظ ظهور البيوتيت ثم البيجادي ثم الستوروتيت ثم الدستين ثم السليمانيت.....</p>	أ-1
ن 0.5	<p>الخصائص البنوية:</p> <p>الصخرة A (الميكاشيت): تتميز بنية الشيستية (قبل بداية التوريق) حيث تتشكل من أسرة داكنة من البيوتيت الموجهة وأسرة فاتحة مكونة من المرول فقط.....</p>	ب
ن 0.5	<p>الصخرة B (الغليس): تتميز بنية مورقة حيث تتشكل من أسرة فاتحة من الفلدسبات والمرول تتلاوب مع أسرة داكنة من البيوتيت</p>	ب
ن 0.5	<p>الصخرة C (الميكمايت): تتميز بتدخل بنتين بنية غنایسية وبنية كرانيتية.....</p>	ب
ن 0.25	<p>- عند المرور من الصخرة A إلى الصخرة B: تزداد درجة الحرارة بشكل ملموس بينما يزداد الضغط بنسبة ضعيفة</p>	أ-2

0.25	- عند الانتقال من الصخرة B إلى الصخارة C: تزداد درجة الحرارة ويتحفظ الضغط.....	
0.25	- يتغير التركيب العيداني وتتغير البنية عند الانتقال من الميكاishiست إلى الغايس.....	b
0.25	- يصاحب التغيرات البنوية والعيدانية ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة. إذن خضعت هذه الصخور للتحول.....	
0.25	- تشكلت هاتين الصخرتين في مجال التحول الدينامي الحراري.....	
1	- عند الانتقال من الصخرة A إلى الصخرة C تزداد شدة التحول، وفي أقصى ظروف التحول تخضع صخور الغايس لانصهار جزئي يؤدي إلى ظهور سائل كرانيني يتصلب ويبقى مرتبًا بالجزء الصلب من الغايس فتشكل صخرة الميكمايت.....	3
0.75	- عندما يكون السائل الكرانيني وافرا يتصلب ببطء في عمق القشرة الأرضية ليعطي صخرة الكرانين.....	

التمرين 3: bac_pc_2013_Nor**المؤشرات البنوية والصخرية :** 1

1	▪ الوثيقان 1 و 2 (الخريطة و المقطع الجيولوجي لأوفيليت كتلة Chenaillet): وجود بنية غلاف صخري محيطي ضمن جبال الألب و رواسب بحرية، ما يؤشر على انغلاق محيط قديم.....	
1	الوثيقة 3: وجود التراكب في صخور كتلة Bornes (طبقات سميكة من الكلس ومشوهة تنتهي إلى الكريتاسي السفلي Cinf ₂) راكبة فوق الكريتاسي العلوي) مؤشر على حدوث قوى انضغاطية. احتواء الكريتاسي السفلي Cinf ₁ و Cinf ₂ على مستحاثات بحرية (رخويات ومنخربات) مؤشر على أصل محيطي لهذه الصخور.....	2
0.75	الوثيقة 4: يبين رسم الصفيحة الدقيقة لصخورة الميتاكبرو وجود ثلاث معادن مؤشرة هي الكلوكوفان والبيجادي والجادبيت الشكل (أ). و حسب الشكل (ب) ظهور هذه المعادن يتم في ظروف ضغط مرتفع يفوق 1GPa و درجة حرارة مابين 300°C و 500°C تقريبا : التحول الدينامي المميز لظاهرة الطمر إذن سلسلة جبال الألب سلسلة اصطدام مسبوق بطرmer.....	2
2	▪ توضع رواسب الحقب الثاني البحري المستحاثية (الكريتاسي 1 ثم 2). ▪ تحرك وتقارب الصفيحتين الإفريقية والأورووبية نتيجة انغراز هذه الأخيرة تحت الصفيحة الإفريقية الأقل كثافة (الطمر). تحول دينامي للغلاف الصخري المحيطي المنغرز (ظهور معادن مؤشرة كالكلوكوفان والبيجادي والجادبيت). ▪ توقف الطمر واستسطاح الأوفيليت. ▪ انغلاق المحيط واصطدام الصفيحتين نتيجة القوى الانضغاطية، ما ينجم عنه تشوه صخور الكريتاسي السفلي والعلوي. تزايد الانضغاط وترابك طبقات الكريتاسي السفلي فوق الكريتاسي العلوي وارتفاع السلسلة الجبلية. (ملحوظة: يراعى في سرد المراحل استثمار معطيات الوثائق، مع عدم احتساب مرحلة نشأة المحيط الألبي و تشكل القشرة المحيطية).	3

التمرين 4: bac_pc_2012_Rat**+ مؤشرات انتماء سلسلة جبال كليدونيا إلى سلاسل الطفو:** 1

1 ن	- الوثيقة 1: وجود سديمة أو فيوليتية راكبة فوق وحدة Pouebo المطوية والمكونة من بازلت وصخور من أصل رسوبي ووحدات Diahot و Koumac الرسوبيات التي تظهر فوالق معكوسه نتجت عن قوى انضغاطية؛.....	
1 ن	- الوثيقة 2: تشابه مكونات السديمة الأوفيليتية لسلسلة جبال كليدونيا الجديدة ومكونات الغلاف الصخري المحيطي (المرجعي).....	

	- ظهور معدن (بلورات) Diahot يدل على انتهاها إلى مجال الاستقرار B و(أو) C	0.25 ن
0.25 ن	- ظهور معدني البيجادي والجادييت في وحدة Pouebo يدل على انتهاها إلى مجال الاستقرار D .. - بالانتقال من الغرب نحو الشرق خضعت المجموعات الصخرية لتحول تزايدى تميز بدرجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع (الانتقال من مجال الاستقرار B إلى D) وهي ظروف تميز التحول الدينامي الناتج عن ظاهرة الطمر.....	0.25 ن
1 ن		1 ن
0.5 ن	- 50MA : انغراز غلاف صخري محيطي تحت غلاف صخري محيطي آخر(طمر ضمحيطي) وتشكل موشور التضخم الذي أعطى وحدة Pouebo - استمرار الطمر وجذب وحدتي Diahot و Pouebo من طرف الصفيحة المنغرزة نحو العمق(تحول دينامي) مع طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي من الشرق نحو الغرب	3
0.5 ن	- 35MA : طفو الغلاف الصخري المحيطي (السديمة الأوفيليتية) فوق القشرة القارية وصعود الوحدات: نشوء سلسلة جبال كليدونيا الجديدة.....	0.5 ن
	bac_pc_2012_Nor التمرين 5:	
0.25 ن	- الوثيقة 1: انخفاض سريع لكمية الشابل المصطاد بالطن بنهر سبو ما بين 1963 و 1980.....	1
0.25 ن	- الوثيقة 2: ارتفاع درجة حرارة مياه نهر سبو بعد إحداث معامل السكر ب 6°C	0.25 ن
0.25 ن	- الوثيقة 3: انخفاض ذوبانية ثاني الأوكسجين ب (10^{-3} mol/l) مع ارتفاع درجة حرارة مياه نهر سبو	0.25 ن
0.75 ن	- التفسير: الأنشطة الصناعية المكثفة في حوض سبو أثرت سلبا على جودة مياهه عبر الرفع من درجة حرارتها ما نتج عنه انخفاض في ذوبانية ثاني الأوكسجين في الماء، الشيء الذي تسبب في تراجع كميات الشابل المصطاد(ظروف عيش وتواجد غير ملائمة).....	0.75 ن
0.75 ن	- على امتداد 40 km أثناء فترة طرح المرجين من معاصر الزيتون، يرتفع DBO5 إلى قيم تتعدى 60mg/l مقارنة مع ما قبل هذه الفترة. ثم ينخفض إلى أقل من 10mg/l بالابتعاد عن موقع طرح نفايات فاس..... - على امتداد نفس المسافة (أي حوالي 40 km) ينخفض تركيز ثاني الأوكسجين الذائب في مياه نهر سبو، أثناء فترة طرح المرجين، إلى حدود 0mg/l قياسا إلى ما قبلها. ثم تعود كمية O_2 إلى الارتفاع بالابتعاد عن موقع طرح نفايات فاس	2
1 ن	تتسبب النفايات العضوية في تدهور مياه نهر سبو(تغير الجودة) من خلال تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والإحيائية لهذا الوسط البيئي (انخفاض ذوبانية O_2 في الماء وارتفاع DBO5)	3
1 ن	+ معالجة النفايات العضوية (وغير العضوية) الناتجة عن النشاط الصناعي قبل طرحها في الأوساط الطبيعية. + التوقف عن قذف النفايات العضوية في نهر سبوملحوظة : قبول تدبير واحد ملائم.	4
	bac_pc_2011_Nor التمرين 6:	
0.75 ن	- الوثيقة 1: ▪ وجود تراكبات وزحف. ▪ تجاه كتلة الهمش الأفريقي وكتلة الهمش الأوروبي(تجاه صفيحتين). ▪ استسطاح الأوفيليت	1
0.25 ن	الوثيقة 2 الشكل (أ): ▪ ارتفاع كتلة Chenaillet ب m 2650 عن سطح البحر..... الشكل (ب): ▪ تراكب وحدات الصفيحة الإفريقيية ▪ طفو وزحف الأوفيليت والقشرة القارية الإفريقيبة فوق القشرة القارية الأوروبية	0.25 ن
0.5 ن		0.5 ن

- الانتقال من الكابرو إلى الشيست الأزرق فالإكلوجيت.

- اختفاء معادن البلاجيوكلاز والبيروكسین وظهور الكلكوفان ثم الجاديت والبيجادي يعني

تصاعد شدة التحول من الغرب إلى الشرق.....

الوثيقة 4:

- الانتقال من المجال A (مجال استقرار البلاجيوكلاز) إلى المجال D (مجال استقرار البيجادي

- + الجاديت ± الكلكوفان) يؤشر على تحول دينامي (ضغط مرتفع و T° متوسطة حوالي

500°C).

الظاهر: الطمر بانغراز القشرة المحيطية لصفحة الأوروبي تحت القشرة القارية لصفحة الإفريقية.

- تقارب الصفيحتين الأوروبيية والإفريقية.

- طمر الصفحة الأوروبيية وختفاء المحيط الألبي.

- تحول دينامي لصخور القشرة المحيطية المنغذرة.

- طفو ورشف الأوفيليت وتراكب القشرة القارية الإفريقية على القشرة الأوروبية.....

التمرين 7: bac_pc_2010_Rat

التمرين الرابع (5 نقط)

- الخصيات التي تدل على ظاهرة طمر سابق هي:

- + المركب الأوفيليتني

- + بئر زلزالية ذات أعمق كبيرة

- + وجود بلوتون من الكرانوديوريت.....

- الخصيات التي تدل على ظاهرة الاصطدام:

- + تحرك الصفيحة العربية نحو الصفيحة الأوروبي وأسيوية

- + وجود تراكبات وفوالق معكوسة وطيات

- + غلاف صخري سميك.....

- يبرز جدول الشكل (أ) أن الغابرو والميتاغابرو لهما نفس التركيب الكيميائي ويبيّن الشكل (ب) أنه ليس لهما نفس التركيب العيداني.....

- بما أن للصخرتين نفس التركيب الكيميائي وصخرة الغابرو تتنتهي لقشرة المحيطية وصخرة الميتاغابرو تكونت في ظروف ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة تناسب مع منطقة الطمر: إذن الميتاغابرو ناتج عن تحول الغابرو إثر ظاهر الطمر.....

- تقاطع منحنى ارتفاع درجة الحرارة الرداء العلوي مع منحنى انصهار البيريدوتيت المميّة ابتداء من عمق 60km

اثناء ظاهرة الطمر تحرر صخور القشرة المحيطية المنغذرة الماء إثر التحول، يؤدي هذا إلى تميّه بيريدوتيت الرداء العلوي وبالتالي انصهارها جزئياً مع تكون صهارة تتبرد في العمق تعطي صخرة الكرانوديوريت.....

تسلسل الأحداث التي أدت إلى تشكيل سلسلة جبال زاغروس:

- زحف الصفيحة العربية نحو صفيحة أوراسيا؛

- طمر الغلاف الصخري المحيطي لصفحة العربية تحت صفيحة أوراسيا؛

- تحول صخور القشرة المحيطية المطمورة نتيجة ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة؛

- انصهار جزئي لبيريدوتيت الرداء العلوي وتشكل صهارة أعطت صخرة الكرانوديوريت؛

- انغلاق المحيط القديم؛

- اصطدام الصفيحتين العربية والأوراسيوية مما أدى إلى حدوث تراكبات وطيات.....

ربط العلاقة بين الصفة لون زغب الأرانب ونشاط أنزيم التيروزيناز:

- عند السلالة من الصنف الهيملاي: ارتفاع درجة الحرارة عن 33°C \rightarrow أنزيم التيروزيناز غير نشط \leftarrow جسم أبيض ما عدا الأطراف والأذنين تكون درجة حرارتهما لا تتعدي 33°C .
- عند السلالة المتوجهة يبقى أنزيم التيروزيناز نشطاً في درجة الحرارة تفوق 33°C \rightarrow يكون جسمها أسوداً.

يعود اللون الأسود إلى صبغة الميلانين التي تتطلب تدخل أنزيم التيروزيناز (بروتين) الذي يمكن من تحويل التيروزين إلى دوبا. في حالة عدم فعالية هذا الأنزيم تظهر صفة المهد. مما يدل عن العلاقة بروتين صفة.

التمرين الثالث (5 ن)

- استغلال الوثيقة 1: يوفر تركيز ATP بالعضلة ما بين 5,1 إلى 7,5Kj لكن المجهود العضلي يتطلب 35Kj، وعليه فالمخزون العضلي من الطاقة غير كاف لتلبية حاجات المجهود العضلي.
- يستوجب ضمان استمرار النشاط العضلي التجديد المستمر لجزيئات ATP داخل العضلات.....

- الشكل أ: أثناء التمرين العضلي يبقى تركيز ATP في العضلة شبه ثابت نستنتج على أنه يتجدد باستمرار.....
- ينخفض تركيز الفوسفوكرياتين في العضلة تدريجياً، نستنتج أنه يستعمل في تجديد جزيئات ATP التي استعملت في التقلص العضلي حسب التفاعل $\text{CP}+\text{ADP} \rightarrow \text{ATP}+\text{C}$
- يرتفع تركيز الحمض اللبني في الدم تدريجياً أثناء التمرين العضلي، ينتج هذا الحمض اللبني عن ظاهرة التخمر اللبني في العضلات والتي تمكن من تجديد جزيئات ATP المستعملة في التقلص العضلي.....
- في حالة المجهود العضلي لمدة طويلة (الشكل ب) يرتفع استهلاك الأوكسجين بسرعة ويستقر في قيمة قصوى تعادل $2\text{L/min}/2\text{L}$ مما يدل على تجديد ATP بواسطة الأكمدة التنفسية.....

الشكل أ:

- بين الزمنين t_1 و t_2 يعود إنتاج ATP إلى تدفق H^+ من الماتريس إلى الوسط الخارجي عبر السلسلة التنفسية فيتشكل ممال له H^+ . يعود H^+ إلى الماتريس عبر الكرات ذات الشمراخ مما يؤدي إلى تركيب ATP.....
- بعد الزمن t_2 عند إضافة مادة FCCP يصبح الغشاء الداخلي نفذاً للبروتونات مما يؤدي إلى غياب ممال البروتونات بين جهتي الغشاء الداخلي، وبالتالي عدم تركيب ATP من طرف الكرات ذات شمراخ.....

التمرين 9: bac_pc_2009_Rat

المعايير المؤشرة على وجود منطقة الطرmer:

- وجود حفرة بين الصفيحة الهندية الاسترالية وصفحة الهايدي؛
- وجود نشاط زلزالي مميز، بحيث يزيد عمق بور الزلازل كلما تم الابتعاد من الحفرة في اتجاه الصفيحة الهندية الاسترالية.
- وجود برakin.....

إنجاز رسم تخطيطي مفسر يبين:

انغراز صفيحة الهايدي تحت الصفيحة الهندية الاسترالية،
توزيع بور الزلازل حسب مستوى بنبيوف؛
تمثيل البراكين.....

- يبين الشكل أ من الوثيقة 2، أنه في غياب الماء لا يتقطع منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطرmer مع منحنى الانصهار الجزئي للبيروديت، في هذه الظروف لا يحدث الانصهار الجزئي للبيريدوتيت؛
- بينما يبين الشكل ب من الوثيقة 2 أنه بوجود الماء، يتقطع منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطرmer مع منحنى تصلب البيروديت، يسهل وجود الماء الانصهار الجزئي للبيروديت حيث تنخفض درجة حرارة بداية الانصهار ..

- خلال ظاهرة الطمر، تتعرض صخور الغلاف الصخري المحيطي المنغز لتأثير عامل الضغط ودرجة الحرارة مما يؤدي إلى تحرير الماء الذي ينتشر عبر الرداء ويسهل الاتصهار الجذني لبريدوتيت الغلاف الصخري للصفحة الراكبة ويبدأ تصدع الصهارة عموديا نحو السطح مؤدية إلى براكين الجزيرة

ن 1

bac_pc_2009_Nor التمرين 10:

- 1- عند الانتقال من الجنوب إلى الشمال، يلاحظ ظهور البيوتيت ثم الدستين فما سبب ذلك؟
 يفسر هذا التسلسل في تشكيل المعادن بارتفاع تدريجي للضغط ولدرجة الحرارة؛
 2- تحول دينامي حراري (أو إقليمي) (+ التعليل)
 3- المرحلة الأولى: تقارب الصفيحتين A و B وإنفراز الغلاف الصخري المحيطي للصفحة A تحت الغلاف الصخري القاري للصفحة B؛
 المرحلة الثانية والثالثة: تبادل الصفيحتين A و B نتيجة قوى الانضغاطية، ظهور تشوّهات وتشكل صخور متّحولة؛
 نتاج عن هرّيّة الصفيحتين A و B ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة المسؤولين عن التحول الدينامي الحراري الذي عرفته المنطقة المدرّسة.

ن 2

ن 1

ن 2

bac_pc_2008_Rat التمرين 11:

- 1- تواجد الصخور المتحولة في المجال رقم 2 وهو مجال التحول الدينامي الحراري الذي يتميز بضغط مرتفع وحرارة متوسطة.....
 2- تنتهي جبال عمان إلى نمط سلاسل الطفو
 3- التعليل: تدل البنية الجيولوجية 3 (السديمة الأفيولوتية) على انغلاق بحر قديم نتج عنه زحف للقشرة المحيطية فوق القشرة القارية بفعل تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوروآسيوية

ن 1

ن 1

ن 1

مراحل التشكّل:


- + 95 MA : بفعل تأثير قوى تكتونية انضغاطية تم طمر الغلاف الصخري المحيطي للصفحة الإفريقية تحت الصفحة الأوروآسيوية؛
 + 80MA : انغلاق مجال المحيط نتيجة زحف الصفيحة المحيطية الأوروآسيوية فوق الصفيحة الإفريقية أدى إلى تكون تراكبات مهمة للصخور الرسوبية (موشور التضخم) وصعود الأفيوليت فوق الصفيحة الإفريقية؛ استمرار القوى التكتونية الانضغاطية أدى إلى تكون تشوّهات جيولوجية وتكون صخور متّحولة.

ن 1

- + 80MA : انغلاق مجال المحيط نتيجة زحف الصفيحة المحيطية الأوروآسيوية فوق الصفيحة الإفريقية أدى إلى تكون تراكبات مهمة للصخور الرسوبية (موشور التضخم) وصعود الأفيوليت فوق الصفيحة الإفريقية؛ استمرار القوى التكتونية الانضغاطية أدى إلى تكون تشوّهات جيولوجية وتكون صخور متّحولة.

ن 1

(1 ن)	- يظهر المقطع نوعين من التشوّهات التكتونية : الطيات و الفوالق . - نمط السلسلة: سلسلة الطمر - الظاهرة المسيبة لها ظاهرة الطمر - من بين الأدلة التي تأكّد ذلك : • وجود نشاط بركاني	1
(0,5 ن)	• وجود نشاط زلزالي: ازدياد عمق بؤر الزلازل كلما ابتعدنا عن الحفرة في اتجاه القارة(مستوى Benioff) • وجود حفرة محيطية موازية للهامش النشيط، • السلسلة الجبلية موازية للحافة القارية .	2
(0,5 ن)	- بفعل تعرض الصفيحة المحيطية المنغرة والمشبعة بالماء لارتفاع الضغط والحرارة ،تفقد الماء تدريجياً، هذا الماء ينتشر عبر الرداء مما يجعل هذا الأخير تحت ظروف الإنصهار الجزيئي، نحصل في النهاية على صهارة تتعرض لتبريد بطيء قبل وصولها إلى السطح لنحصل على بلوتونات كرانبيتية ونتيجة لذلك تستسقّط الكتل البلوتونية.	3
(1 ن)	- الرسم التخطيطي لظاهرة الطمر: في حدود الشكل التالي	4



التمرين 13: bac_svt_2015_Nor

0.25	التغيرات العيدانية : - عند الانتقال من R1 إلى R2 نسجل : - اختفاء الكلوريت - ظهور البيوتيت والموسکوفيت. - عند الانتقال من R3 إلى R4 نسجل : - اختفاء الأنجلوسيليت والموسکوفيت - ظهور السيليمانيت و الفلسبات البوتاسي ..	1
0.5	تفسير التغيرات العيدانية : - عند الانتقال من R1 إلى R2 : ارتفاع في درجة الحرارة ← المرور من مجال استقرار الكلوريت إلى مجال استقرار البيوتيت .. - عند الانتقال من R3 إلى R4 : ارتفاع كل من الضغط و درجة الحرارة ← المرور من مجال استقرار الأنجلوسيليت إلى مجال استقرار كل من السيليمانيت و الفلسبات البوتاسي.	2
0.5	تفسير تشكّل الصخرة R5 : ارتفاع الضغط و درجة الحرارة ← انصهار جزئي للصخرة R4 ← جزء لم ينصلّر له بنية شبّيهة بصخرة الغایس R4 و جزء سائل تصلب ببطىء في مكانه ليعطي بنية حبيبية تشبه صخرة الكرانيت R6 ..	3

- الظروف القصوى للضغط و درجة الحرارة التي عرفتها المنطقة هي ظروف تشکل الصخرة R6 و $T = 370^{\circ}\text{C}$

- الظروف القصوى للضغط و درجة الحرارة التي عرفتها المنطقة هي ظروف تشکل الصخرة R6 و $T = 700^{\circ}\text{C}$ (تقبل الأوجبة القريبة من هذه القيم)

- نمط التحول الذي عرفته المنطقة هو تحول دينامي حراري

- الظاهرة الجيولوجية المسؤولة عن هذا التحول هي ظاهرة الاصطدام

التمرين 14: bac_svt_2014_Rat

1 - يتموضع الكرانيت الانداسىي في شكل كتلة محدودة جغرافيا تحيط بها صخور متحولة في شكل هالة تتكون من الشيست المبقع والكورنرین (الوثيقة 1). يظهر الشكل أ من الوثيقة 2 أن الكرانيت يخترق الصخور المحاطة به.....

- لم تتعرض الطبقات الرسوبيه التي تتتمى إلى الكمبري للتتحول لكونها ترسبت بعد تموضع الكتلة الكرانينية.....

2 - يدل وجود حبيسة الغنايس أن الصهارة التي أعطت هذا الكرانيت قادمة من العمق الذي تكون فيه الكرانيت الانداسىي بمحاذاة صخور الغنايس. انفصلت، هذه الصهارة، في شكل كتلة صعدت نحو الأعلى فأعطت الكرانيت الانداسىي.

3 - يستقر معدن البيوتيت في درجة حرارة أكبر من 400°C

- يستقر الكورديريت بين درجة حرارة بين 510°C و 580°C

- يستقر معدن الأنجلوسيليت بين درجة حرارة 450°C و درجة 650°C

- يستقر معدن السيليميات في درجة حرارة أكبر من 650°C ; (يمكن قبول أي قيمة قريبة من القيم المذكورة أعلاه)

استنتاج: تشير هذه المعادن أن درجة حرارة استقرار الصخور المكونة لهالة التحول ترتفع تدريجياً كلما اقتربنا من الكتلة الكرانينية.....

4 - تكون عند صعود الصهارة الكرانينية كتل اندساسية تتبرد وتصاب قبل الوصول إلى السطح فتتعرض الصخور المحاطة بها إلى ارتفاع في درجة الحرارة فتشكل معادن جديدة مؤشرة على هذه الظروف مكونة صخور تحول التماس.

التمرين 15: bac_svt_2013_Rat

1 - المميزات الصخرية والبنيوية:

- وجود حفرة محاطية.....

- وجود بركانية أنديزية وصخور بلتونية من الكرانتيدات.....

- وجود موشور التضخم.....

- وجود فووالق معكوسة.....

2 - توزيع بؤر الزلازل حسب العمق بشكل مائل في اتجاه القارة حسب مستوى Benioff.....

- وجود شذوذ في منحدرات تساوي درجة الحرارة بحيث تتغير مائلة حسب مستوى Benioff.....

3 - كثافة القشرة المحاطية أكبر من كثافة القشرة القارية..... لا يمكن تفسير هذه الخاصيات إلا باعتبار أن الصفيحة المحاطية تتغير تحت الصفيحة القارية أي حدوث ظاهرة الطرmer.....

3 - الشكل أ: بوجود الماء \rightarrow تقاطع بين منحنى الدرجة الحرارة (1) لمنطقة الطرمر ومنحنى تصلب البيريديوتيت للمياه (2) \rightarrow انصهار جزئي للبيريديوتيت.....

- توجد منطقة الانصهار الجزئي للبيريديوتيت في عمق حوالي 100km ودرجة حرارة 1000°C

الشكل (ب): وجود منطقة الانصهار الجزئي بمحاذاة منحنى درجة الحرارة 1000°C مع وجود صهارة بركانية تعلو منطقة الانصهار الجزئي.....

ظروف تشكيل الصخور الصهارية في مناطق الطرmer:

- انغراز الغلاف الصخري المحاطي \rightarrow ارتفاع كبير للضغط \rightarrow تحرير الماء من طرف القشرة المحاطية المنغرة \rightarrow تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريديوتيت \rightarrow تكون الصهارة.....

- تبريد جزء من الصهارة في العمق \rightarrow تشكيل الصخور البلتونية.....

- صعود جزء من الصهارة إلى السطح \rightarrow البركانية الأنديزية.....

0.25	مؤشر القوى الانضغاطية:	1
0.25	• وجود سديمة؛.....	
0.25	• وجود موشور التضخم؛.....	
0.25	مؤشر احتفاء مجال محيطي:	
0.25	• وجود أفيوليت	
0.25	• وجود رواسب بحرية (رواسب الحواسنة)	
0.25	عمق بداية تشكل الشيست الأزرق: ابتداء من 42km (تقبل القيم ما بين 40 و 45km)	2
0.25	عمق بداية تشكل الإيكلوجيت : ما فوق 53Km (تقبل القيم ما بين 50 و 55km)	
0.5	استنتاج: نوع التحول هو دينامي لكون العامل الأساسي هو ارتفاع الضغط	

bac_svt_2012_Rat التمرين 17:

0.25	- مؤشرات القوى الانضغاطية هي:	1
0.25	• وجود فوالق معكوسة وتراكبات	
0.25	• وجود سدائم	
0.25	• وجود طيات	
0.25	المؤشر الدال على احتفاء محيط هو: وجود خياطة أفيولوتية بين الهاشمين القاريين	
0.25	السخنات المناسبة لصخور المتكابرو هي:	2
0.25	• MG ₁ ينتمي لسخنة الشيست الأخضر لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوريت واكتينوت.....	
0.25	• MG ₂ ينتمي لسخنة الشيست الأزرق لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوكوفان وابيدوت.....	
0.25	• MG ₃ ينتمي لسخنة الإيكلوجييت لاحتوائه على التجمع المعدني بجادي وجادبيت.....	
0.5	نلاحظ عند الانتقال من MG ₁ إلى MG ₂ إلى MG ₃ ارتفاعاً مهماً في قيمة الضغط وارتفاع ضعيف في درجة الحرارة ← تحول دينامي	
0.25	المراحل المؤدية إلى تشكيل سلسلة جبال الألب :	3
0.25	- وجود مؤشرات التحول الدينامي ← حدوث طمر.....	
0.25	- وجود خياطة أفيولوتية ← انلاق مجال محطي.....	
0.25	- وجود تشوهات مهمة دالة على قوى انضغاطية ← اصطدام الصفيحتين.....	

bac_svt_2012_Nor التمرين 18:

0.25	- بالنسبة للبنية: نمر من البنية الشيستية بالنسبة للميكايشست إلى البنية المورقة بالنسبة للغنايس . (يمكن قبول بنية مورقة بالنسبة للميكايشست)	1
0.5	- بالنسبة للتركيب العيداني: احتفاء معدن الكلوريت؛	
0.25	ظهور معادن جديدة كالكوردييرت والفلدسبات والسليمانيت.....	
0.25	- إذن عند المرور من الميكايشست إلى الغنايس هناك تغيرات بنوية وعيدانية وبالتالي المنطقة خضعت لظاهرة التحول.....	
0.25	- حدود احتفاء الكلوريت: درجة الحرارة من 350°C إلى 450°C تقريبا	2
0.25	- حدود ظهور الكوردييريت: درجة الحرارة من 500°C إلى 680°C تقريبا.....	
0.25	- حدود ظهور الفلدسبات: درجة الحرارة من 620°C إلى 880°C تقريبا.....	
0.25	إذن كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G ₁ تزداد درجة الحرارة.....	
0.25	كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G ₁ تزداد شدة التحول،.....	3
0.25	وفي أقصى ظروف التحول تخضع الصخور المتحولة لانصهار جزئي معطية سائلاً له تركيب كرانيتي،.....	
0.5	عند تصلبه يبقى مرتبطاً مع مادة لم تتصهر بعد (الغنايس) مشكلة الميكمايت.	

0.25 0.25 0.25 0.25	وجود بؤر زلزالية يزداد عمقها كلما اتجهنا داخل القارة وجود حفرة محيطية وجود براكين تحرك الصفيحة المحيطية لنازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية في اتجاه معاكس الصفيحة المنغرزة هي صفيحة نازكا والصفيحة الراكبة هي صفيحة صفيحة أمريكا الجنوبية ..	
0.25 0.25 0.25 0.25	- الشكل (أ): غياب الماء → عدم تقاطع بين منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر ومنحنى تصلب البيريوديت ← عدم توفر ظروف الانصهار الجزئي للبيريوديت في منطقة الطمر - الشكل (ب): بوجود الماء → تقاطع بين منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر ومنحنى تصلب البيريوديت ← انصهار جزئي للبيريوديت - ظروف الانصهار الجزئي للبيريوديت المميه في منطقة الطمر: عمق بين 80 و 200Km درجة حرارة بين 750°C و 1200°C	2
0.5	توجد منطقة الانصهار الجزئي للبيريوديت في عمق حوالي Km 100 و درجة حرارة حوالي 1000°C ..	3
0.75	انغراز الغلاف الصخري المحيطي → ارتفاع كبير للضغط → تحول الصخرة R1 إلى R2 وتحول الصخرة R2 إلى R3 وحدوث تفاعلات عيدانية → تحرير الماء → تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريوديت ← تشكل الصهارة ..	4

التمرين 20: bac_svt_2010_Rat

1 ن	- تطابق صخور المجموعة A مع صخور الغلاف الصخري المحيطي (المعتلة في الوثيقة 2) - تواجد صخور المجموعة A (جزء من الغلاف الصخري المحيطي) فوق صخور الغلاف الصخري القاري يدل على وجود طفو لغلاف صخري محيطي فوق مختلف صخري قاري: السلسلة المدروسة سلسلة طفو ..	1
1 ن	- وجود معدن الكلوكوفان في المجموعة الصخرية B مؤشر على خضوعها لتحول تحت ضغط مرتفع (تحول دينامي). - طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق الغلاف الصخري القاري → ارتفاع الضغط → تحول دينامي ..	2
1 ن	- قبل Ma 50 حدوث طمر ضممحيطي! - قبل Ma 39 انفصل جزء من أستراليا وتشكل مجال محيطي "بحر الكورالي" و استمرار الطمر الضممحيطي! - قبل Ma 23 : طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق الجزء القاري المنفصل من أستراليا، مما أدى إلى تشكيل سلسلة جبال غينيا الجديدة التي تتميز بتشوهات تكتونية و تشكل صخور متولدة مع حت جزء من الغلاف الصخري المحيطي ..	3

التمرين 21: bac_svt_2010_Nor

0,5 ن	- ظهور معادن مؤشرة جديدة من الشمال نحو الجنوب - ارتفاع تدريجي للضغط و درجة الحرارة من الشمال إلى الجنوب ..	1
1 ن	- المجال A ← سحنة الشيست الأخضر، وال المجال B و C ← سحنة الأمفيبوليكات. إذن السحنات المميزة للمنطقة هي سحنة الشيست الأخضر وسحنة الأمفيبوليكات، وذلك عند الانتقال من الشمال إلى الجنوب. - تتنمي هذه السحنات إلى المجال 2.	2
1 ن	- نمط التحول : تحول دينامي- حراري : ضغط و درجة حرارة متسلطان ..	3
1,5 ن	- تجاه الصفيحتين نتيجة لقوى انضغاطية → تقصير الغلاف الصخري وازيداد سمه → انغراز صخور الغلاف الصخري في العمق → ارتفاع الضغط و درجة الحرارة → خضوع الصخور لتحول دينامي- حراري (إقليمي) ..	3

توفر الصخرة M1 على معادن البروكسين والكلوروفان والبلاجيوكلاز. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال C.

توفر الصخرة M2 على معادن البيجادي والجدييت. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال E

تشكلت الصخرة M1 في عمق يتراوح ما بين 15 و 35 Km وتحت درجة حرارة أقل من 450°C
تميز هذه الصخرة بكتافة تتراوح ما بين 2.8 و 3

تشكلت الصخرة M2 في عمق يفوق Km 30 و درجة حرارة تتراوح ما بين 250°C و 550°C تقريبا
تميز هذه الصخرة بكتافة مرتفعة (أكثر من 3).

عند انغراز القشرة المحيطية تتعرض الصخور للتحول، فتمر الصخرة M1 من المجال C ذي درجة حرارة وضغط منخفضين إلى المجال E ذي ضغط ودرجة حرارة مرتفعين، مصحوب بارتفاع الكثافة. تشهد هذه التحولات المعدنية والكتافة عن وجود طمر قديم.

التمرين 23: bac_svt_2008_Rat

1

ذكر أربعة مؤشرات من بين ما يلي:

- وجود ثلاثة تراكبات (فوالق معاكسة ذات بعد كبير) متتدة في اتجاه الجنوب الغربي؛
- تموضع انقطاع Moho الذي يفصل بين القشرة والرداة على عمق كبير يتجاوز 50 كلومترا، ويشير هذا إلى زيادة سمك القشرة القارية في هذه المنطقة؛
- وجود قشرة قارية مشوهه ومتحولة؛
- وجود الأوفيليت في الشمال الشرقي وهو قطعة من الغلاف الصخري المحيطي؛
- وجود بلتونون كرانينتي يخترق الرواسب البحرية.

2

يبرز الشكل (أ) أن الغابرو يتضمن معادن البروكسين والبلاجيوكلاز بينما الميتاغابرو يتضمن معادن الجادبيت والكلوروفان.

تدل معطيات الوثيقة 3 أن معادن الجادبيت والكلوروفان المميزين لصخرة الميتاغابرو (الوثيقة 2) تكونوا تحت ظروف درجة حرارة بين 100°C و 400°C وضغط بين 0,6 و 1,5 GPa (المجال C). يتتناسب هذا المجال مع تغير درجة الحرارة السعيرية السائدة في مناطق الطمر.

3

تشهد الأوفيليت المحصورة بين الطبقات القارية عن انغلاق محيط قديم وتؤكد التراكبات وسمك القشرة القارية عن وجود قوى انضغاطية. تدل هذه الخصائص على أن سلسلة جبال الهيمالايا سلسلة ناتجة عن اصطدام غلافين صخريين.

إذن فقد نتاجت سلسلة جبال الهيمالايا عن المراحل التالية:

- زحف القارة الهندية نحو الصفيحة الأوروآسيوية، وقد كان هذا الزحف مصحوبا بطرmer القشرة المحيطية تحت الصفيحة الأوروآسيوية؛
- انغلاق هذا المحيط حيث لم يبقى منه سوى قطعة من الأوفيليت؛
- النقاء الهاشمين القاريين للهند وآسيا مع حدوث اصطدام وتشكل تراكبات.

2

التمرين 24: bac_svt_2008_Nor

1

المعطيات التي تدل عن انغلاق محيط قديم وتجابه صفيحتين صخريتين:

- وجود رواسب تنتهي لقعر المحيط؛

- وجود الأوفيليت وهو مركب ينتمي لقشرة المحيطية؛

- وجود فوالق معاكسة وطبقات تدل عن قوى تقصيرة؛

- وجود أراضي قديمة (تنتمي للحقب الثاني) تركب أراضي حديثة (تنتمي للحقب الثالث) في اتجاه الشمال الغربي؛

2

يتكون الإكلوجيت تحت درجة حرارة تناهز 400°C وضغط يناهز 15kbar. تتناسب هذه الظروف مع منطقة التحول الدينامي. المنطقة الملائمة لهذه الظروف هي منطقة الطمر.

0.5

- تكون الأوفيليت المكون للقشرة المحيطية في مستوى الذروة وتوضعت عليه الصخور الرسوبيّة؛
 - تقارب القارة الإفريقيّة والقارّة الأوروبيّة.
 - انغراز القشرة المحيطية للصفيحة الأوروبيّة تحت الصفيحة الإفريقيّة (أو ظاهرة الطمر) فتعرّضت صخور المركب الأوفيليري لشدة تحول دينامي ترتب عنه تكون صخرة الإكلوجيت؛
 - التقاء الهاامشين القاربيّن لإفريقيا وأوروبا إثر الاصطدام مع تكون طيات وفوالق وترابك في اتجاه الشمال الغربي؛
 - رفع الصخور من الأعماق الكبيرة إلى الأعلى عبر الظواهر الجيولوجية المصاحبة لتكون سلاسل الاصطدام؛
 - تعرض الصخور للتحت مع استسماح صخور الأوفيليت.

bac_svt_2015_Rat التمرن:25

0.5 4 ×	(١،٢) ، (١،٣) ، (٤،٥)	(١، ب)	I
0.5	<p>- تعريف صحيح من قبيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الصخور المتحولة: صخور ناتجة عن تغيرات بنوية و/أو عيدانية لصخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير تغير عاملين الضغط ودرجة الحرارة. - المعدن المؤشر: معدن يتشكل في ظروف ضغط ودرجة حرارة محددة، يؤشر تواجده في الصخور على الظروف التي خضعت لها هذه الصخور أثناء تحولها. 		II
0.5	د. صحيح	ج. خطأ	III
0.25 4 ×	ج ← ٤ . . . ٣ ← ١ . . . ٢ ← و . . . ٥ ← ١	ا. صحيح	IV

المكون الثاني : الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبيانى (15 نقطة)

التمرين الأول (3 نقط)

- #### **وصف توزيع الألياف العضلية:**

- بالنسبة لعداء 10000 متر : تتوفر العضلات على نسبة مهمة من الألياف F_I (70 %) و نسبة أقل من الألياف F_{II} (30 %)	1
- بالنسبة لعداء 100 متر : تتوفر العضلات على نسبة مهمة من الألياف F_{II} (65 %) و نسبة أقل من الألياف F_I (35 %)	2
<ul style="list-style-type: none"> - خصائص التقلص : - بالنسبة للألياف F_I : تقلص بشدة متوسطة (UA 1.2) و تحافظ على نفس الشدة لمدة طويلة - بالنسبة للألياف F_{II} : تقلص بشدة كبيرة (UA 2) وتتخفص هذه الشدة سريعا حتى تنعدم 	2
<ul style="list-style-type: none"> - المسلك الاستقلابي المميز لكل نوع من الألياف : - بالنسبة للألياف F_I : تتميز بالتنفس الخلوي . التعليل (تعليلين من بين) : - حجم كبير للميتوكوندريات - نسبة مهمة للخضاب الدموي المثبت لـ O_2 - وفراة انزيم MDH - القابلية للتعب ضعيفة - بالنسبة للألياف F_{II} : تتميز بالتخمر اللبني. التعليل (تعليلين من بين) : - وفراة انزيم LDH - صغر حجم الميتوكوندريات - نسبة ضعيفة للخضاب الدموي المثبت لـ O_2 - القابلية للتعب كبيرة 	3
<ul style="list-style-type: none"> - تفسير الاختلاف بين العدائين : - تتطلب مسافة 100 m مجهودا بشدة كبيرة و لمدة وجيزة و هذا يتواافق مع سيادة الألياف F_{II} التي تتميز بارتفاع شدة تقلصها في مدة قصيرة و اعتمادها على التخمر اللبني كمصدر للطاقة الضرورية لإنجاز هذا المجهود العضلي - تتطلب مسافة 10000 m مجهودا بشدة منخفضة و لمدة طويلة و هذا يتواافق مع سيادة الألياف F_I التي تتميز بطول مدة تقلصها بشدة ضعيفة و اعتمادها على التنفس الخلوي كمصدر للطاقة الضرورية لإنجاز هذا المجهود العضلي 	4

التمرين: 26 bac pc 2015 Rat

- جبال البير وتنتمي إلى جبال البير وتنتمي إلى درجة الحرارة الضرورية لانصهار البريدوتيت دائمًا أكبر من درجة الحرارة السعيرية، وبذلك لا ينصلح البريدوتيت مهما كان العمق.....
 • بوجود الماء تنخفض درجة الحرارة الضرورية لانصهار البريدوتيت لتصبح أقل من درجة الحرارة السعيرية في عمق يتراوح بين 80km و 200km
 $800^{\circ}\text{C} < T < 1200^{\circ}\text{C}$ و $25\text{kbar} < P < 63\text{kbar}$
 هذه القيم تقريرية، تقبل كل قيمة درجة حرارة ($\pm 20^{\circ}\text{C}$) وضغط ($\pm 5\text{kbar}$)

2

الوثيقة 3 :
 عند المرور من الغابرو إلى الميتاGabro ثم إلى الإيكولوجيت ، يلاحظ اختفاء معادن وظهور معادن أخرى.....
 هذا التغير في التركيب العيداني يدل على حدوث ظاهرة التحول.....

3

- الوثيقة 4 :
 معادن الميتاGabro 1 تستقر في المجال B .
 معادن الميتاGabro 2 تستقر في المجال C .
 معادن الإيكولوجيت تستقر في المجال D
 وبالتالي فالمرور من الميتاGabro 1 إلى الميتاGabro 2 ثم إلى الإيكولوجيت ناتج عن ارتفاع هام للضغط وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة.....
 ← تحول دينامي.....

4

انغراز الغلاف الصخري المحيطي لصفحة نازك ← ارتفاع هام للضغط وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة ← حدوث تحول دينامي وتحرير الماء ← انصهار جزئي للبريدوتيت ← تشكل صهارة أنديزيتية.

bac_pc_2016_Nor التمرين: 27

- التحول : ظاهرة جيولوجية تؤدي إلى تغيير كل من التركيب العيداني وبنية صخور في حالتها الصلبة تحت تأثير تغير ظروف الضغط ودرجة الحرارة.....
 - المعدن المؤشر: معدن يمكن من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة أثناء تشكيل الصخرة التي تحتوي عليه.....

I

ذكر خصائص من قبيل:

- 1- سلاسل الطمر: وجود حفر محيطية - حدوث بركانية أنديزيتية - توزيع مائل للبؤرزلزالية - متالية صخرية تحولية (الشيست الأخضر - الشيست الأزرق - الإكلوجيت).....
 2- الكرانيت الأناتيكتي: مساحته شاسعة - يتشكل في عمق كبير - حدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة - مرتب بالتحول الدينامي الحراري

II

- الاختيار من المتعدد:
 $(1 ; \text{ج}) ; (2 ; \text{ب}) ; (3 ; \text{د}) ; (4 ; \text{ب})$

III

المزاوجة:	أرقام عناصر المجموعة 1				
	4	3	2	1	ج
1	د	أ	ب	ج	الحرف الذي يشير إلى التعريف

IV

0.5 4 ×	(1، ب) ، (2، ب) ، (3، ب) ، (أ، 4)	I
0.5	أ. نمطين من التشوّهات التكتونية المميزة لمناطق التقارب من قبيل : - الفوّالق المعكوسه - الطيات - السدائم	II
0.5	ب . تعريف صحيح لظاهرة التحول: هو تغيير في بنية وعديانية صخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير تغير الضغط ودرجة الحرارة	II
0.25 4 ×	أ. خطأ ج. صحيح ب. صحيح	III
0.25 4 ×	1 : غلاف صخري قاري ؛ 2 : غلاف صخري محيطي ؛ 3 : حفرة محيطية 4 : بركانية أنديزيتية	IV

bac_pc_2016_Rat التمرين: 29

0.25	أدلة على اختفاء محيط قديم وتجابه الصفيحة الأفريقيّة والصفيحة الأوروبيّة:	1												
0.25	- وجود الأفيوليت بين الهاشم الأفريقي والهاشم الأوروبي													
0.25	- وجود تشوّهات تكتونية انصهاعيّة: طيات وفوّالق معكوسه وترابّكات													
0.25	- تجابه الهاشميين القاربيّن الإفريقي والأوروبي													
0.5	مقارنة التركيب العيادي للعينات الصخرية:	2												
0.5	أ- عينة 1 و عينة 2: يتضمنان البيروكسين والبلاجيوكلاز ، في حين تحتوي العينة 2 إضافة إلى ذلك على الأيدوتو وتفتقر للهرنبلاند													
0.5	ب- عينة 3 و عينة 4: يتضمنان البلاجيوكلاز والغلوكون ، في حين تفتقر العينة 4 لمعدني البيروكسين والأيدوتو وظهر بها معدني البيجادي والجادبيت													
0.5	ج- عينة 4 و عينة 5: يتوفّران على معدن البلاجيوكلاز ، كما تتوفّر العينة 5 على الأيدوتو والهرنبلاند ، واحتفى منها كل من الغلوكون والبيجادي والجادبيت													
0.75	ظروف الضغط ودرجة حرارة تشكّل كل من الغابرو والعينتين الصخريتين 3 و 5 :	3.1												
0.75	(تقبل كل القيم المقاربة للقيم الواردة في الجدول: بالنسبة لدرجة الحرارة $20^{\circ}\text{C} \pm$ ، وبالنسبة للضغط $\pm 0.2\text{Kbar}$)													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>العينة الصخرية</th> <th>الضغط بـ Kbar</th> <th>درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الغابرو</td> <td>3</td> <td>980</td> </tr> <tr> <td>عينة 3</td> <td>9</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>عينة 4</td> <td>11</td> <td>680</td> </tr> </tbody> </table>	العينة الصخرية	الضغط بـ Kbar	درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$	الغابرو	3	980	عينة 3	9	300	عينة 4	11	680	
العينة الصخرية	الضغط بـ Kbar	درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$												
الغابرو	3	980												
عينة 3	9	300												
عينة 4	11	680												
	استنتاج:													
0.25	- بالنسبة للعينة 3: تحول دينامي ، درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع													
0.25	- بالنسبة للعينة 4: تحول دينامي حراري ، درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع													
0.25	الظواهر الجيولوجية المؤدية لتشكل كل من العينتين 3 و 5 :	3.2												
0.25	- بالنسبة للعينة 3: ظاهرة الطمر (انغراز صخرة الغابرو)													
0.25	- بالنسبة للعينة 5: ظاهرة الاصطدام على اثر تجابه مجالين قاربيين													
0.5	- زحف القارة الإفريقيّة نحو القارة الأوروبيّة، مصحوباً بطرmer القشرة المحيطية تحت القشرة القاريّة.....	4												
0.25	- انلاق المحيط الذي لم يتبق منه سوى قطع من الأفيوليت الناتجة عن ظاهرة الطفو													
0.25	- تجابه الهاشميين القاربيّن الإفريقيا وأوروبا ← تعرّض الصخور لتشوهات تكتونية انصهاعيّة ← ارتفاع التضاريس ← تشكّل سلاسل جبليّة													

0.25	- الأدلة على القوى الانضغاطية التي عرفتها المنطقة (ذكر دليل واحد على الأقل): وجود تراكاتبات و سدامن	1
0.25	- الأدلة على اختفاء محیط قدیم (ذكر دليل واحد على الأقل): وجود رواسب بحرية و أوفیولیت	
0.25	أ-التغيرات التي نطرأ على الصخور : عند الانتقال من R_1 إلى R_2 نسجل اختفاء البلاجيوكلاز و ظهور الجادیت و البیجادي	
0.25	ظروف تشكل الصخرتين R_1 و R_2 : R_1 درجة الحرارة من 80°C إلى 480°C الضغط من 0.45 GPa إلى 1.1 GPa . R_2 درجة الحرارة من 250°C إلى 540°C الضغط من 0.8 GPa إلى 1.9 GPa .	
2 × 0.5	ب-تفسير التغيرات العیدانیة: عند الانتقال من المجال A إلى المجال C تخضع الصخور لارتفاع كبير في الضغط مقارنة مع ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات کیمیائی يتبع عنها اختفاء البلاجيوكلاز و ظهور الجادیت و البیجادي (قبل أي تفسير صحيح) نمط التحول الذي خضعت له المنطقة : تحول دینامی (أو تحول الطمر).....	2
0.25 x3 0.5	مراحل تشكل سلسلة جبال الألب: طمر الغلاف الصخري المحیطي تحت الغلاف الصخري القاري نتيجة لقوى انضغاطية (تحول دینامی) ← اختفاء مجال محیطي ← تجاه الهاشمين القاريين الإفریقي والأوروبي وتشوه الطبقات الصخرية (سدامن وتراکبات) و تشكل سلسلة جبال الألب.	3