



الصفحة
1
3

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2012

عناصر الإجابة

5	المعامل	RR34	علوم الحياة والأرض	المادة
3	مدة الإنجاز		شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبية أو المسلك

النقطة	عناصر الإجابة	رقم السؤال
	التمرين الأول (5 نقط)	

0.5 ن	<ul style="list-style-type: none"> • أنواع الغازات الملوثة ومصادرها: + أوكسيدات الأزوت (NO و NO₂): تتشكل من ارتباط الأزوت بثنائي أوكسجين الهواء بفعل الاحتراق (وسائل النقل- الصناعات- الفلاحة)..... + ثباني أوكسيد الكبريت: ينبع من البراكين واحتراق الفحم والمشتقات البترولية وبعض المنشآت الصناعية..... + ثباني وأحادي أوكسيد الكربون: يصدر عن الاحتراق في الصناعة والتسيخ المنزلي ومحركات السيارات والحرائق..... + الكلور الناتج عن مركب CFC: الصادر عن صناعات التبريد والتكييف والمبيدات الحشرية ملحوظة: قبول الأوزون O₃ غازاً ملوثاً (بين سطح الأرض وعلو 10Km) الناتج عن تأكسيدات الأزوت NO والمركبات العضوية المتطرفة تحت تأثير أشعة الشمس والهواء. 	
0.25 ن	<ul style="list-style-type: none"> • الآثار السلبية للغازات الملوثة على الصحة: + تهيج مخاطية العين والمسالك التنفسية..... + التأثير على سلامة الجهاز العصبي والقلب والشرايين..... 	
0.25 ن	<ul style="list-style-type: none"> • الآثار السلبية للغازات الملوثة على البيئة: + تضخم ظاهرة الاحتباس الحراري بفعل ارتفاع نسبة الغازات المسامية (CO₂,CH₄,CFC)..... + تساقط الأمطار الحمضية المدمرة للغابات بفعل NO₂ و SO₂..... + الأعاصير والتصرّح بفعل التغيرات المناخية المرتبطة بهذه الملوثات..... + ثقب طبقة الأوزون بفعل مركب CFC مما يهدد حياة الكائنات الحية 	
0.5 ن	<ul style="list-style-type: none"> • تدابير للحد من الآثار السلبية للغازات الملوثة: + خفض إنتاج الغازات الملوثة على الصعيد العالمي والمسمية للإحتباس الحراري..... + استعمال الطاقات المتجدددة الشمسية والريحية في إنتاج الطاقة الكهربائية، والبحث عن بدائل أخرى لاستعمال الطاقات الأحفورية (الغاز الطبيعي-الفحم الحجري- البترول)..... + معالجة المصانع لنفاياتها الغازية قبل طرحها في الهواء (استعمال مصفات للتقليل من نسبة الغازات المطرودة في الهواء)..... <p>ملحوظة : قبول تدابير مراقبة مطارات النفايات.</p>	
0.5 ن		

رقم السؤال	عنصر الإجابة	النقطة
التمرин الثاني (5 نقط)		
1	+ الوثيقة 1 : - استقرار حركة الحيوانات المنوية بوجود ثباتي الأوكسجين بالرغم من غياب ATP - انخفاض حركة الحيوانات المنوية عند افتقار الوسط لثباتي الأوكسجين و ATP - ارتفاع حركة الحيوانات المنوية إلى قيمتها الأصلية في غياب ثباتي الأوكسجين بوجود ATP + الوثيقة 2 : - احتواء القطعة المتوسطة للحيوان المنوي على عدد كبير من الميتوكوندريات => يتوفر الحيوان المنوي في قطعته المتوسطة على ميتوكوندريات عديدة قادرة على استعمال ثباتي الأوكسجين الضروري لإنتاج جزئية ATP (التنفس الخلوي) التي تخزن الطاقة اللازمة لحركة السوط.....	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.25 ن 0.75 ن
2	التفاعلات التنفسية المسؤولة عن إنتاج ATP على مستوى الميتوكوندري: - أكسدة حمض البيروفيك إلى أستيل كوانزيم A - تفاعلات دورة Krebs في الماتريس: + إزالة الكربون وتحرير CO_2 + اختزال NAD^+ إلى $\text{NADH}+\text{H}^+$ + إنتاج (ATP)GTP - النكسفر المؤكسد في الغشاء الداخلي للميتوكوندري: + إعادة أكسدة النواقل + اختزال ثباتي الأوكسجين وتكون جزيئات الماء + تكسير ATP إلى ADP التمرين الثالث (5 نقط)	0.5 ن 0.25 ن
I	<ul style="list-style-type: none"> • متالية الأحماض الأمينية عند الشخص A : <p style="text-align: center;">CCA AAC TAA ACC TTA TAT : ADN GGU UUG AUU UGG AAU AUA : ARNm متالية الأحماض الأمينية : Gly-Leu-Ile-Trp-Asn-Ile</p> <ul style="list-style-type: none"> • متالية الأحماض الأمينية عند الشخص B : <p style="text-align: center;">CCA AAC TAA ACT TTA TAT : ADN GGU UUG AUU UGA AAU AUA : ARNm متالية الأحماض الأمينية : Gly-Leu-Ile</p> <p>- ترَكَب خلايا الشخص A بروتين Dystrophine تماماً بينما ترَكَب خلايا الشخص B بروتيناً ناقصاً ناتجاً عن توقف عملية الترجمة</p>	0.25 ن 0.25 ن
2	- سبب ظهور نوع من الهزال العضلي لدى الشخص B هو تركيب بروتين ناقص نتيجة طفرة استبدال السيتوزين C بالتيمين T على مستوى متالية النكليوتيدات للمورثة المسؤولة عن تركيب الديستروفين. أدت هذه الطفرة إلى استبدال الوحدة الرمزية UGG بالوحدة الرمزية UGA بدون معنى ← توقف تركيب البروتين	1 ن

النقطة	عناصر الإجابة	رقم السؤال										
0.25 0.25 ن 0.5 ن 1	<p>II - التزاوج الاختباري تم بين نبتة هجين ذات المظهر الخارجي السائد ونبتة ثنائية التنجي.....</p> <p>- نسب المظاهر الخارجية المحصلة متقاربة ما يدل أن المورثتين مستقلتان.....</p> <p>- التفسير الصبغي :</p> <p style="text-align: center;"> $\begin{array}{ccc} [H,D] & \times & [h,d] \\ H//h D//d & \times & h//h d//d \end{array}$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th rowspan="2">الأمثاج</th> <th>H/ D/ 25%</th> <th>H/ d/ 25%</th> <th>h/ D/ 25%</th> <th>h/ d/ 25%</th> </tr> <tr> <th>h/ d/ 100%</th> <td>H//h D//d [H,D] 25%</td> <td>H//h d//d [H,d]25%</td> <td>h//h D//d [h,D]25%</td> <td>h//h d//d [h,d]25%</td> </tr> </table> </p>	الأمثاج	H/ D/ 25%	H/ d/ 25%	h/ D/ 25%	h/ d/ 25%	h/ d/ 100%	H//h D//d [H,D] 25%	H//h d//d [H,d]25%	h//h D//d [h,D]25%	h//h d//d [h,d]25%	3
الأمثاج	H/ D/ 25%		H/ d/ 25%	h/ D/ 25%	h/ d/ 25%							
	h/ d/ 100%	H//h D//d [H,D] 25%	H//h d//d [H,d]25%	h//h D//d [h,D]25%	h//h d//d [h,d]25%							
0.75	<p>- يسمح التزاوج الاختباري بتحديد عدد أنواع الأمشاج المنتجة من قبل النبتة (الفرد) المختبرة ذات المظهر الخارجي السائد وبالتالي تحديد نمطها الوراثي</p>	4										
التمرين الرابع (5 نقط)												
1 ن 1 ن 1	<p>+ مؤشرات انتماء سلسلة جبال كليدونيا إلى سلاسل الطفو:</p> <p>- الوثيقة 1: وجود سديمة أو فيوليتية راكبة فوق وحدة Pouebo المطوية والمكونة من بازلت وصخور من أصل روسي ووحدات Diahot و Koumac الروسوبية التي تظهر فوق معكوسه نتجت عن قوى انضغاطية؛.....</p> <p>- الوثيقة 2:تشابه مكونات السديمة الأوقيوليتية لسلسلة جبال كليدونيا الجديدة ومكونات الغلاف الصخري المحيطي (المرجعي)</p>	1										
0.25 0.25 ن 1	<p>- ظهور معدن (بلورات) الكلوكوفان في وحدة Diahot يدل على انتمامها إلى مجال الاستقرار B و(Ao)</p> <p>- ظهور معدني البيجادي والجادبيت في وحدة Pouebo يدل على انتمامها إلى مجال الاستقرار D ..</p> <p>- بالانتقال من الغرب نحو الشرق خضعت المجموعات الصخرية لتحول تزايدي تميز بدرجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع (الانتقال من مجال الاستقرار B إلى D) وهي ظروف تميز التحول الدينامي الناتج عن ظاهرة الطرmer.....</p>	2										
0.5 ن 0.5 ن 0.5	<p>- 50MA: انغراز غلاف صخري محيطي تحت غلاف صخري محيطي آخر(طمر ضمحيطي) وتشكل موشور التضخم الذي أعطى وحدة Pouebo</p> <p>- 35MA: استمرار الطمر وجذب وحدتي Diahot و Pouebo من طرف الصفيحة المنفرزة نحو العمق(تحول دينامي) مع طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي من الشرق نحو الغرب</p> <p>- 30MA: طفو الغلاف الصخري المحيطي (السديمة الأوقيوليتية) فوق القشرة القارية وصعود الوحدات: نشوء سلسلة جبال كليدونيا الجديدة.....</p>	3										