

الصفحة 1 3	<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني</p> <p>المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه</p>
<p>الإمتحان الوطني الموحد للبيكالوريا الدورة العادية 2015 - عناصر الإجابة -</p>	
NR 34	

3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال										
المكون الأول (5 نقط)												
0.5 ن	ينبغي أن يتضمن التعريف كل من الماهية والوظيفة أو الوصف. تعريف للإستناس:	I										
0.5 ن	- التخمر اللبني: ظاهرة إحيائية تعمل على هدم جزئي للكليكويز إلى حمض لبني في غياب ثنائي الأوكسجين - الساركومير: الوحدة البنوية والوظيفية المكونة للبيف العضلي (تقبل مكونات الساركومير كجواب)	II III										
2 ن (ج - 1) ، (ب - 2) ، (ب - 3) ، (ج - 4)											
1 ن	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>رقم تفاعل التنفس</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>الحرف المقابل لموقع حدوثه</td> <td>د</td> <td>أ</td> <td>ب</td> <td>ج</td> </tr> </table>	رقم تفاعل التنفس	1	2	3	4	الحرف المقابل لموقع حدوثه	د	أ	ب	ج	
رقم تفاعل التنفس	1	2	3	4								
الحرف المقابل لموقع حدوثه	د	أ	ب	ج								
1 ن	أ - خطأ ، ب - خطأ ، ج - صحيح ، د - صحيح	IV										
المكون الثاني (15 ن)												
التمرين الأول (5 نقط)												
0.5	- انخفاض كثافة البروتين cMyBP-C وارتفاع كثافة الميوزين المشوه عند القطط المريضة بالمقارنة مع القطط السليمة	1										
0.25 0.25	- حالة التحليل العادي : ARNm : CAC AAG CUC CGG CUC UGU CUC His-Lys-Leu-Arg-Leu-Cys-Leu متتالية الأحماض الأمينية	2										
0.25 0.25	- حالة التحليل الطافر : ARNm : CAC AAG CUC GGG CUC UGU CUC His-Lys-Leu-Gly-Leu-Cys-Leu متتالية الأحماض الأمينية											
1 ن	طفرة استبدال G ب C في الثلاثية رقم 31 من خييط ADN المستنسخ ← استبدال الحمض الأميني Arg ب Gly ← تركيب بروتين cMyBP-C هش يتفكك ← الإصابة بالمرض	3										
0.25 ن 0.5 ن 0.25 ن	• استثمار نتائج التزاوج الأول : - الهجونة الأحادية: دراسة انتقال صفة واحدة (لون الفرو)..... - الآباء من سلالة نقية والخلف F ₁ غير متجانس ← عدم تحقق القانون الأول لماندل ← الوراثة مرتبطة بالجنس والمورثة المدروسة محمولة على الصبغي X..... - ظهور مظهر خارجي وسيط عند الخلف الأنثوي ← تساوي السيادة.....	4										

0.25 ن

0.25 ن

0.25 ن

• استثمار نتائج التزاوج الثاني :
- الجيل الأول F_1' متجانس والآباء من سلالة نقية ← تحقق القانون الأول لماندل ←
وراثة غير مرتبطة بالجنس (التزاوج العكسي يعطي نفس النتيجة)
- الجيل F_1' يشبه أحد الأبوين ← سيادة تامة للحليل المسؤول عن الزغب القصير (L)
على الحليل المسؤول عن الزغب الطويل (l)
- المورثتان المدروستان مستقلتان
التفسير الصبغي للتزاوج الثالث :

♀

x

♂

[BN,ℓ]

$X_B X_N \ell / \ell$

$X_B \ell$ 50%

$X_N \ell$ 50%

[B,ℓ]

$X_B Y \ell / \ell$

$X_B \ell$ 50%

$Y \ell$ 50%

المظهر الخارجي:

النمط الوراثي:

الأمشاج:

إنجاز شبكة التزاوج :

	$X_B \ell$ 50%	$Y \ell$ 50%
$X_B \ell$ 50%	$X_B X_B \ell / \ell$ ♀ [B,ℓ] 25%	$X_B Y \ell / \ell$ ♂ [B,ℓ] 25%
$X_N \ell$ 50%	$X_B X_N \ell / \ell$ ♀ [BN,ℓ] 25%	$X_N Y \ell / \ell$ ♂ [N,ℓ] 25%

0.5 ن

النتائج النظرية :

- [B,ℓ] ♂ 25% ; [N,ℓ] ♂ 25%

- [BN,ℓ] ♀ 25% ; [B,ℓ] ♀ 25%

0.25 ن

التمرين الثاني (5 نقط)

0.75 ن

0.25 ن

1 نلاحظ أن نسبة ثنائي الأوكسجين المذاب في الماء (2.6mg/L) محصورة بين 1 mg/L و 3 mg/L، وأن تركيز اليخضور (13µg/L) محصور بين 8 µg/L و 25 µg/L، وأن شفافية المياه (2m) محصورة بين 1m و 2,5m. كل هذه المؤشرات تدل على أن مياه سد سمير كانت رديئة الجودة.....

0.25 ن

0.25 ن

0.25 ن

2- أ
• ثنائي الأوكسجين المذاب في الماء:
- انخفاض نسبي (طفيف) لتركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في الماء إلى حدود 5m تقريبا..
- انخفاض مهم لتركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في الماء إلى حين انعدامه في عمق يناهز 10m.....
• تركيز اليخضور : انخفاض تركيز اليخضور من 30µg/L إلى حوالي 15µg/L في عمق 2m.....
ب
التركيز المرتفع لليخضور على سطح الماء راجع لتكاثر البلاكتون النباتي ← حجب الضوء عن المياه العميقة نتج عنه تراجع ملحوظ في وتيرة التركيب الضوئي في المياه العميقة ← موت البلاكتون (ما يفسر انخفاض تركيز اليخضور) ← توقف طرح ثنائي الأوكسجين وبالتالي انخفاض تركيزه حتى ينعدم

0.75 ن

الصفحة 3	NR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2015 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية
-------------	-------	--

3	التخاسب ← انخفاض تركيز O ₂ المذاب ← تكاثر بكتيريات لاهوائية ← حدوث التخمر ← إنتاج H ₂ S السام وارتفاع تركيزه ← موت الكائنات الحية المائية ← تراجع التنوع البيولوجي.....	1 ن
4	• بعد سنة من اتخاذ هذه التدابير نلاحظ : - ارتفاع تركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في عمق 2m (الشكل أ). - انخفاض تدريجي لتركيز اليخضور (الشكل ب). - ارتفاع شفافية المياه (الشكل ج). • أدت هذه الإجراءات إلى التخفيض من نسبة النباتات اليخضورية بمياه السد ← انخفاض تركيز اليخضور في المياه ← ارتفاع شفافية المياه ← تسرب الأشعة الضوئية نحو العمق ← ارتفاع وتيرة التركيب الضوئي ← ارتفاع تركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في مياه السد ← تحسين جودة مياه سد سمير.....	0.75 ن 0.75 ن
التمرين الثالث (5 نقط)		
1- أ	• الخاصيات البنيوية : - وجود تراكبات. - وجود فوالق معكوسة. - وجود طيات. • الخاصيات الصخرية : - وجود صخور بلوتونية : الكرانوديوريت - أوفيوليت. - صخور متحولة : الشيست الأخضر والشيست الأزرق.....	0.75 ن 0.75 ن
ب	• دليلي الطمر : - وجود الأوفيوليت المتحول ← اختفاء محيط قديم. - الكرانوديوريت: صهارة أنديزيتية..... • دليلي الاصطدام : (يقبل دليلين من بين الأدلة الثلاث الآتية) - تشوهات تكتونية من النوع الانضغاطي: تراكبات، طيات، فوالق معكوسة. - تواجد سلسلة جبال زاغروس في منطقة تجابه صفيحتين (مجالين قاريين). - وجود أوفيوليت بين مجالين قاريين.....	0.5 ن 0.5 ن
2 -	• الشيست الأخضر ينتمي إلى المجال B : $0.4 \text{ GPa} < P < 1 \text{ GPa}$ $70^\circ \text{C} < T < 470^\circ \text{C}$ • الشيست الأزرق ينتمي إلى المجال C: $0.6 \text{ GPa} < P < 1.4 \text{ GPa}$ $100^\circ \text{C} < T < 390^\circ \text{C}$ هذه القيم تقريبية، تقبل كل قيمة درجة حرارة ($\pm 10^\circ \text{C}$) وضغط ($\pm 0.1 \text{ GPa}$)	0.5 ن 0.5 ن
3	تشكل كل من الشيست الأخضر والشيست الأزرق نتيجة حدوث تحول دينامي..... التعليل : التحول في ظروف ناجمة عن ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة نسبيا.....	0.25 ن 0.25 ن
4	خضوع الصفيحتين العربية والأوروأسيوية لقوى انضغاطية ← انغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة العربية ← ارتفاع مهم للضغط دون تغير ملحوظ في درجة الحرارة ← تحول دينامي ← تشكل صخور متحولة..... ملحوظة: يقبل الجواب إذا تجاوز المترشح مرحلة الطمر بتطرقه لظاهرة الاصطدام.	1 ن