

**الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2019
- الموضوع -**

+٢٣٦٨٤٤١ ٩٤٥٠٤٠
٨٣٣٤٧٤٥ ٩٣٣٣٥٨٠
٨٣٣١٢٨ ٩٣٣٣٥٥٠



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
و التعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

RS34

3 مدة الاجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

5 المعامل

شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية

الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

المكون الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

I. عَرْفُ(ي) المصطلحين الآتيين : - السماد العضوي (1ن) - الليكسفيا

II. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. أُنْقِلُ(ي) الأزواج (1، ...) و (2 ، ...) و (3،...) و (4 ، ...) على ورقة تحريرك، ثم اكتب(ي) داخل كل زوج الحرف المقابل لاقتراح الصحيح: (2 ن)

<p>2- ينتج تخاصب البحيرات على إثر:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. تكاثر الكائنات الحية بها؛ ب. اغتناء مياهها بالكلسيوم؛ ج. اغتناء مياهها بالنترات؛ د. اغتناء مياهها بالمبيدات الكيميائية. 	<p>1- ينتج الاحتباس الحراري عن تلوث الهواء بـ:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. أشعاعات نووية؛ ب. غاز الميثان CH_4؛ ج. غاز الأزوت N_2؛ د. غاز الهيدروجين H_2.
<p>4- تعتبر النفايات المشعة من الصنف B :</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. قوية النشاط الإشعاعي وقصيرة العمر؛ ب. قوية النشاط الإشعاعي وطويلة العمر؛ ج. ضعيفة النشاط الإشعاعي وقصيرة العمر؛ د. ضعيفة النشاط الإشعاعي وطويلة العمر. 	<p>3 - ينتج تلوث المياه بالنترات أساساً عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. الاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية؛ ب. تسرب الليكسفيا؛ ج. الاستعمال المفرط للمبيدات؛ د. الملوثات الصناعية.

III. أُنْقِلُ(ي) على ورقة تحريرك الرقم المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم اكتب(ي) أمامه صحيح أو خطأ. (1 ن)

- 1- ينتج البيوغاز عن أكسدة النفايات العضوية في ظروف هي لا هوانية بواسطة متاعب مجهريّة.
- 2- تنتج الأمطار الحمضية عن تفاعل مركب CFC مع بخار الماء في الغلاف الجوي.
- 3- يرجع انخفاض سمك طبقة الأوزون إلى تفاعل أوكسیدات الكبريت مع جزيئات الأوزون.
- 4- يشير عمر النصف إلى المدة الزمنية اللازمة للتفتت الكلي لعينة إشعاعية.

IV . صل(ي) كل عنصر من المجموعة 1 بالتعريف المناسب له في المجموعة 2، وذلك بنقل الأزواج (1 ، ...) و (2 ، ...) و (3 ، ...) و (4 ، ...) على ورقة تحريرك وكتابة الحرف المناسب أمام كل رقم. (1 ن)

المجموعة 2	المجموعة 1
أ - مؤشر لتقدير جودة التربة بالاعتماد على اللافقيريات الكبيرة التي تعيش فيها.	DBO5 - 1
ب - مؤشر يعبر عن كمية الأوكسجين الضرورية للأكسدة البيولوجية للمواد العضوية الموجودة في لتر من الماء خلال خمسة أيام في الظلام.	IB - 2
ج - مؤشر يعبر عن كمية الأوكسجين الضرورية للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية الموجودة في لتر من الماء.	IBQS - 3
د - مؤشر لتقدير درجة تلوث المياه بالاعتماد على اللافقيريات الكبيرة التي تعيش فيها.	DCO - 4

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقط)**التمرين الأول (5 نقط)**

تعتبر ATP جزئية استقلابية ضرورية للنشاط الخلوي، وتجدد الخلايا الحية جزيئات ATP انطلاقاً من أكسدة الجزيئات العضوية عن طريق مسلكين استقلابيين مختلفين. قصد تفسير اختلاف قد مستعمرات سلالتين P و G لخسائر الخبز *Saccharomyces cerevisiae* المعتمد في تجديد ATP، نقترح المعطيات الآتية:


مظهر مستعمرات الخمائر		
نهاية الزرع	في بداية الزرع	
		السلالة P
		السلالة G

تم زرع سلالتي الخميرة P و G في علبة بتري متماثلتين تحتويان على وسط جيلوزي تام به 5% من الكليكوز وغني بثنائي الأوكسجين، ثم وضعنا في درجة حرارة ثابتة. تبين الوثيقة 1 مظهر مستعمرات الخمائر في بداية ونهاية هذا الزرع.

الوثيقة 1

1. علماً أن مستعمرة الخميرة ناتجة عن تكاثر خلايا الخميرة:

- أ- قارن(ي) النتائج المحصل عليها في نهاية الزرع (الوثيقة 1) بالنسبة لكل من سلالتي الخميرة P و G. (0.5 ن)
- ب- اقترح(ي) فرضية لتفسير الاختلاف الملاحظ بخصوص مستعمرات السلالتين P و G في علاقته بالسلك الاستقلابي. (0.5 ن)





قصد تفسير الاختلاف الملاحظ وعلاقته بالاستقلاب الخلوي، تم زرع كل من السلالتين P و G في وسطين جيلوزيين خاليين من الكليكوز وغنيني بثنائي الأوكسجين في درجة حرارة ثابتة، ثم تم قياس تطور تركيز ثنائي الأوكسجين قبل وبعد إضافة نفس كمية الكليكوز إلى وسطي الزرع. تبين الوثيقة 2 النتائج المحصلة.

ال الخميرة G	ال الخميرة P	الوثيقة 3
15 في كل خلية	من 4 إلى 5 في كل خلية	عدد الميتوكندريات
		مظهر الميتوكندريات

مكنت ملاحظة خسائر السلالتين المدرستين بالمجهر الإلكتروني في نهاية هذه التجربة من الحصول على النتائج المبنية في الوثيقة 3.

2. باستثمارك للنتائج المبينة في الوثيقتين 2 و3، استنتج(ي) المسلك الاستقلابي المعتمد من طرف كل من السلالة P والسلالة G. (1.5 ن)

من أجل مقارنة النشاط الاستقلابي المعتمد من طرف خمائير السلالتين المدرستين، تم وضع مادة triphényl-tétralozium على مستعمرات خمائير كل من السلالة P والسلالة G، بالموازاة مع ذلك تم قياس كمية ATP المنتجة من طرف السلالتين P و G وحساب المردود الطاقي لكل منها. تقدم الوثيقة 4 النتائج المحسّلة، وتبيّن الوثيقة 5 المسلكين الاستقلابيين المعتمدين من طرف السلالتين P و G لإنتاج ATP.



3. باستعمالك لمعطيات الوثائقين 4 و 5، فسر(ي) الاختلاف الملاحظ في المردود الطاقي عند كل من السلالة P والسلالة G. (1.5 ن)

4. من خلال ربط العلاقة بين قد المستعمرات وبنية خلايا الخميرة والنশاط الاستقلابي المعتمد تحقق(ي) من فرضيتك المقترحة. (1 ن)

* استهلاك جزئية حمض بيروفيك واحدة داخلي الميتوكندرى.
- على مستوى الميتوكندرى تؤدي إعادة أكسدة $1\text{NADH}, \text{H}^+$ إلى إنتاج 1ATP وتحل محل 1FADH_2 وتحل محل 1ATP .
 2ATP


التمرين الثاني (5 نقط)

في إطار دراسة انتقال الخبر الوراثي وآلية تعبيره نقترح المعطيات الآتية:
تحكم في صفة وجود الزغب عند سلالة الكلاب المكسيكية مورثة غير مرتبطة بالجنس توجد على شكل حللين (Hr) و(hr). قصد انتقاء سلالة من الكلاب المكسيكية الملطاء (جلد بدون زغب)، قام أحد مربى الكلاب بإنجاز تزاوجات لعدة مرات بين ذكور وإناث ذات مظاهر خارجية مختلفة (وجود أو غياب الزغب). تقدم الوثيقة 1 النتائج المحسّلة.

الزواج 3:	الزواج 2:	الزواج 1:
كلبة ملطاء (بدون زغب) X كلبة عادية (بدون زغب) ↓ 6 جراء عادية لها زغب 12 جروًأ ملطاء بدون زغب	كلبة عادبة (وجود زغب) X كلبة عادبة (بدون زغب) ↓ 8 جراء عادية لها زغب 8 جراء ملطاء بدون زغب	كلب عادي (وجود زغب) X كلبة عاديَة (وجود زغب) ↓ 12 جروًأ عاديًّا (وجود زغب)
الوثيقة 1		

1. انطلاقاً من نتائج التزاوجين 1 و 2، أعط (ي) الأنماط الوراثية المحتملة بالنسبة للكلاب العادي والكلاب الملطاء، على (ي) إجابتك. (1.5 ن)
2. اعط (ي) التفسير الصبغي لنتائج التزاوج 3 مستعيناً (ة) بشبكة التزاوج. (1 ن)

قصد تفسير المأطع عند الثدييات، نقترح دراسة هذه الصفة عند الفئران. يرجع هذا المظاهر إلى عدم قدرة الجريبيات الزغبية على تجديد الزغب بشكل دوري بعد ظهوره أول مرة. يتدخل في الحفاظ على دورة الجريبيات الزغبية بروتينين بنويين ومتطرّم يدعى HR، يتموضع في النواة، وينظم تفريقي الخلايا الظهارية في الجريبيات الزغبية وتتجدددها الدوري. تقدم الوثيقة 2 مراحل دورة الزغب عند فأر عادي (الشكل أ) و فأر مأطع (الشكل ب) ونتائج دراسة قد وكمية البروتين HR عند كل من فأر العادي وأ فأر المأطع (الشكل ج).



3. قارن (ي) المعطيات المتعلقة بأ فأر العادي وأ فأر المأطع (الوثيقة 2)، ثم استنتج (ي) العلاقة ببروتين - صفة. (1.5 ن)
- يتحكم في تركيب البروتين HR مورثة بطيلين. تقدم الوثيقة 3 جزء من الخليط غير المنسوخ للحليب العادي عند فأر عادي وجزء من الخليط غير المنسوخ للحليب الطافر عند فأر مأطع. وتعطي الوثيقة 4 مستخلصاً من جدول الرمز الوراثي.

957 958 959 960 961 962 963
GCC CAC CAA GGG AAA CTC AAC
GCC CAC CAA TGG AAA CTC AAC

منحي القراءة →

الوثيقة 3

رقم الثلاثيات :

جزء من الخليط غير المنسوخ للحليب العادي:

جزء من الخليط غير المنسوخ للحليب الطافر:


الوحدة الرمزية											
GGU	CAA	AAA	CAU	UGG	CUU	AAU	GCU	UGA	CGU	الحمض الأميني	الوحدة الرمزية
GGC	CAG	AAG	CAC		CUC	AAC	GCC	UAA	CGC		
GGA					CUA		GCA		CGA		
GGG					CUG		GCG		CGG		
Gly	Gln	Lys	His	Trp	Leu	Asn	Ala	Arg			
							بدون معنى				

الوثيقة 4

4. باستعمال معطيات الوثيقتين 3 و 4، حدد(ي) متالية ARNm ومتالية الأحماض الأمينية المناسبة لجزء المورثة المحكم في تركيب البروتين HR عند كل من الفأر العادي والفأر الأملط، ثم فسر(ي) ظهور الملطف عند هذه الفئران. (1 ن)

التمرين الثالث (5 نقط)


تمتد سلسلة جبال الهيمالايا على طول 3000 كم بين الهند وآسيا، وتضم ثلات وحدات تكتونية تشكلت قبل حوالي 55 مليون سنة. لتحديد الطواهر الجيولوجية المصاحبة لتشكل هذه السلسلة الجبلية نقترح دراسة المعطيات الآتية: تقدم الوثيقة 1 خريطة جيولوجية مبسطة لجبال الهيمالايا (الشكل أ)، وقطعاً جيولوجياً لهذه السلسلة الجبلية (الشكل ب).



1. باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1 حدد(ي) الطاهرتين الجيولوجيتين المؤديتين إلى تشكيل جبال الهيمالايا، علل(ي) إجابتك. (1 ن)

مكنت الدراسة الجيوفيزائية لوحدة الهيمالايا العليا من الحصول على النتائج المبينة في الوثيقة 2.


2. صف(ي) تغير درجة حرارة الغلاف الصخري لهذه الوحدة (الوثيقة 2)، ثم فسر(ي) هذا التغير. (1ن)



تميز وحدة الهيمالايا العليا بوجود استساطحات لكتل إيكلاجيتية ناتجة عن تحول الغابرو، وصخور قارية متحولة.


تعطي الوثيقة 3 مسار PTt (الضغط - درجة الحرارة - الزمن) لتطور الصخور المنتمية للمركب الأفيوليتي لمنطقة الخليطة بالهيمالايا.

تقام الوثيقة 4 الحدود الفاصلة بين التشكيلات العيدانية في المتالية التحولية القارية المكونة لكتلة المتباعدة للهيمالايا العليا (الشكل أ)، ومبيان سحنات التحول (الشكل ب).



Chl: الكلوريت
Grt: البيرجادي
St: الستوروتيد
Dis: الدستين
Sl: السليمانيت
+ ظهور المعدن

الشكل أ



تحول دينامي
تحول دينامي حراري
تحول حراري
منحنى الدرجة السعيرية ...

- A : الأنلوسيت؛ S: السليمانيت ؛ D : الدستين
1: الشيست الأزرق (الكلوكوفان + البيجادي + الإبيدوت)
2: الشيست الأخضر (الأكتينوت + الكلوريت)
3: الأمفيوليتيات (الهرنبلاند + البلاجيوكلاز)
4: الإكلوجيتيات (الجادبيت والبيجادي)
5: الكرانيليات

الشكل ب

الوثيقة 4

3. باعتمادك على معطيات الوثائقين 3 و 4 :

أ- حدد(ي) نمط التحول المؤدي إلى تشكيل الإكلوجيت، علل(ي) إجابتك. (0.75 ن)

ب- حدد(ي) نمط التحول المؤدي إلى تشكيل الكتلة القارية المتحولة لهمالايا العليا، علل(ي) إجابتك. (0.75 ن)

4 . من خلال ما سبق، حدد(ي) مراحل تشكيل سلسلة جبال الهمالايا مبرزاً(ة) الظواهر الجيولوجية التي شهدتها المنطقة.
(1.5 ن)