

الأستاذ:
نجيب
عثمانى

مستوى الجدع مشترك أدبي
تمارين بحلول: المعادلات و المترابحات
والنظمات

أكاديمية
الجهة
الشرقية

$$\frac{4x+4-3}{6} = \frac{15x-6+2}{6} \quad \text{يعني}$$

$$4x+1=15x-4 \quad \text{يعني} \quad \frac{4x+1}{6} = \frac{15x-4}{6}$$

$$S=\left\{\frac{5}{11}\right\} \quad \text{يعني} \quad x=\frac{5}{11} \quad \text{ومنه:} \quad -11x=-5$$

$$x(x^2-1)=0 \quad \text{يعني} \quad x^3-x=0 \quad (7)$$

$$\text{يعني } x=0 \quad \text{أو } x^2-1=0 \quad \text{يعني } x=0 \quad \text{أو } x=1$$

$$S=\{-1,0,1\} \quad \text{يعني} \quad x=0 \quad \text{أو } x=\sqrt{1} \quad \text{أو } x=0 \quad \text{ومنه: } \{1\}$$

تمرين 2: حل في \mathbb{R} المعادلات التالية :

$$\frac{x+1}{2}+4=\frac{2x-5}{10}+\frac{2(x+10)}{5} \quad (1)$$

$$x^3-4x=0 \quad (2)$$

$$(5x-7)(3x-10)=0 \quad (3)$$

الجواب: (نوحد المقامات)

$$\frac{5x+5}{10}+\frac{40}{10}=\frac{2x-5}{10}+\frac{4x+40}{10} \quad \text{يعني}$$

$$\frac{5x+5+40}{10}=\frac{2x-5+4x+40}{10} \quad \text{يعني}$$

$$-x=-10 \quad \text{يعني} \quad 5x+5+40=2x-5+4x+40$$

$$S=\{10\} \quad \text{ومنه:} \quad x=10 \quad \text{يعني}$$

$$x(x^2-4)=0 \quad \text{يعني} \quad x^3-4x=0 \quad (2)$$

$$x^2=4 \quad \text{أو } x=0 \quad \text{يعني} \quad x^2-4=0 \quad \text{أو } x=0$$

$$S=\{-2,0,2\} \quad \text{يعني} \quad x=-\sqrt{4} \quad \text{أو } x=\sqrt{4} \quad \text{ومنه: } \{2\}$$

$$3x-10=0 \quad 5x-7=0 \quad \text{يعني} \quad (5x-7)(3x-10)=0 \quad (3)$$

$$S=\left\{\frac{7}{5}, \frac{10}{3}\right\} \quad \text{يعني} \quad x=\frac{7}{5} \quad \text{أو } x=\frac{10}{3} \quad \text{ومنه:} \quad x=\frac{7}{5}$$

تمرين 3: هل العدد 1- حل للمعادلة $0=3x^2+5x+2$

الجواب: نعم العدد 1- حل للمعادلة $0=3x^2+5x+2$

$$3(-1)^2+5(-1)+2=0 \quad \text{لأن: } 0$$

تمرين 4: هل العدد $\sqrt{3}$ حل

$$x^2+(1-\sqrt{3})x-\sqrt{3}=0 \quad \text{للمعادلة}$$

الجواب: نعم العدد $\sqrt{3}$ حل

$$x^2+(1-\sqrt{3})x-\sqrt{3}=0 \quad \text{للمعادلة}$$

$$(\sqrt{3})^2+(1-\sqrt{3})\sqrt{3}-\sqrt{3}=3+\sqrt{3}-3-\sqrt{3} \quad \text{لأن: } 0$$

تمرين 5: أحسب مميز المعادلة $(E): 3x^2-5x+7=0$

$$\Delta=b^2-4ac \quad \text{و } a=3 \quad \text{و } b=-5 \quad \text{و } c=7 \quad \text{بما أن:}$$

تمرين 1: حل في \mathbb{R} المعادلات التالية :

$$3(2x+5)=6x-1 \quad (2) \quad -2x+22=0 \quad (1)$$

$$9x^2-16=0 \quad (4) \quad 4(x-2)=6x-2(x+4) \quad (3)$$

$$(2x+3)(9x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0 \quad (5)$$

$$\frac{2x+2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5x-2}{2}+\frac{1}{3} \quad (6)$$

$$x^3-x=0 \quad (7)$$

الأجوبة: (1) $-2x+22=-22 \quad \text{يعني} \quad -2x=-22$

$$-2x\times\left(\frac{1}{-2}\right)=-22\times\left(\frac{1}{-2}\right) \quad \text{يعني}$$

$S=\{11\}$ وتنسى مجموعة حلول المعادلة

$$6x+15=6x-1 \quad \text{يعني} \quad 3(2x+5)=6x-1 \quad (2)$$

$$0=0 \quad \text{يعني} \quad 6x-6x=-1-15 \quad 0=x=-16 \quad \text{يعني}$$

$S=\emptyset$ وهذا غير ممكن وتنسى

$$4x-8=6x-2x-8 \quad \text{يعني} \quad 4(x-2)=6x-2(x+4) \quad (3)$$

$$0=0 \quad \text{يعني} \quad 4x-4x+8-8=0$$

ومنه كل عدد حقيقي هو حل لهذه المعادلة وبالتالي

$$S=\mathbb{R} \quad \text{أمامنا معادلة من الدرجة الثانية}$$

$$\text{طريقة 1: (التعويذ) } (3x)^2-4^2=0 \quad \text{يعني} \quad 9x^2-16=0 \quad (4)$$

$$3x-4=0 \quad 3x+4=0 \quad \text{يعني} \quad 3x-4=0 \quad \text{أو } 3x+4=0 \quad (5)$$

$$x=\frac{4}{3} \quad \text{أو } x=-\frac{4}{3} \quad \text{يعني} \quad 3x=-4 \quad \text{ومنه: } S=\left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$$

$$\text{طريقة 2: } 9x^2-16=0 \quad \text{يعني} \quad 9x^2=16 \quad (6)$$

$$x=-\frac{4}{3} \quad \text{أو } x=\frac{4}{3} \quad \text{يعني} \quad x=\sqrt{\frac{16}{9}} \quad \text{أو } x=\sqrt{-\frac{16}{9}}$$

$$(2x+3)(9x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0 \quad (5)$$

$$2x+3=0 \quad 9x-3=0 \quad \text{أو } x-\frac{1}{2}=0 \quad \text{يعني}$$

$$x=-\frac{1}{3} \quad \text{أو } x=\frac{1}{3} \quad \text{أو } x=\frac{1}{2} \quad \text{يعني}$$

$$S=\left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\} \quad \text{ومنه:}$$

$$\frac{2x+2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5x-2}{2}+\frac{1}{3} \quad (6)$$

$$\frac{4x+4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{15x-6}{6}+\frac{2}{6} \quad \text{يعني}$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-(8) - \sqrt{16}}{2 \times 4} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-(8) + \sqrt{16}}{2 \times 4}$$

$$S = \left\{ \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\} \quad x_2 = \frac{8-4}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{8+4}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$c = 2 \quad b = -4 \quad a = 1 \quad x^2 - 4x + 2 = 0 \quad (5)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 16 - 8 = 8 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-(4) - \sqrt{8}}{2 \times 1} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-(4) + \sqrt{8}}{2 \times 1}$$

$$x_1 = \frac{4+2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(2+\sqrt{2})}{2} = 2+\sqrt{2}$$

$$S = \{2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2}\} \quad \text{ومنه:} \quad x_2 = \frac{4-2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(2-\sqrt{2})}{2} = 2-\sqrt{2}$$

$$c = 7 \quad b = 5 \quad a = 1 \quad x^2 + 5x + 7 = 0 \quad (6)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4 \times 1 \times 7 = 25 - 28 = -3 < 0$$

بما أن $\Delta < 0$ فان المعادلة ليس لها حل في \mathbb{R} ومنه:

$$c = 6 \quad b = -4 \quad a = 2 \quad 2x^2 - 4x + 6 = 0 \quad (7)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16 - 48 = -32 < 0$$

بما أن $\Delta < 0$ فان المعادلة ليس لها حل في \mathbb{R} ومنه:

$$c = -21 \quad b = -4 \quad a = 1 \quad x^2 - 4x - 21 = 0 \quad (8)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-21) = 16 + 84 = 100 = (10)^2 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-(4) - \sqrt{100}}{2 \times 1} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-(4) + \sqrt{100}}{2 \times 1}$$

$$S = \{-3, 7\} \quad \text{ومنه:} \quad x_2 = \frac{4-10}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{4+10}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

$$c = 3 \quad b = -6 \quad a = 3 \quad 3x^2 - 6x + 3 = 0 \quad (9)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 36 - 36 = 0$$

بما أن $\Delta = 0$ فان هذه المعادلة تقبل حل واحداً مزدوجاً هو:

$$S = \{1\} \quad \text{ومنه:} \quad x = \frac{-(6)}{2 \times 3} = \frac{6}{6} = 1 \quad \text{يعني} \quad x = \frac{-b}{2a}$$

تمرين 8: عمل ثلاثيات الحدود التالية :

$$3x^2 + x + 2 \quad (3 \quad x^2 - 3x + 2 \quad (2 \quad x^2 - 10x + 25 \quad (1)$$

$$c = 25 \quad \text{و} \quad b = -10 \quad \text{و} \quad a = 1 : \quad x^2 - 10x + 25 \quad (1)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-10)^2 - 4 \times 1 \times (25) = 100 - 100 = 0$$

بما أن $\Delta = 0$ فان هذه الحدوية لها جذر وحيد هو:

$$x_1 = \frac{-(10)}{2 \times 1} = \frac{10}{2} = 5$$

$$x^2 - 10x + 25 = a(x - x_1)^2 = 1(x - 5)^2$$

$$c = 2 \quad \text{و} \quad b = -3 \quad \text{و} \quad a = 1 \quad x^2 - 3x + 2 \quad (2)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 = (1)^2 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه الحدوية لها جذريين هما:

$$x_2 = 1 \quad \text{و} \quad x_1 = 2 \quad \text{يعني} \quad x_2 = \frac{3-\sqrt{1}}{2 \times 1} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{3+\sqrt{1}}{2 \times 1}$$

الجواب: $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 7 \times 3 = 25 - 84 = -59$

ملاحظة: الرمز Δ يقرأ: دلتا

تمرين 6: حل في \mathbb{R} المعادلات التالية :

$$3x^2 + x + 2 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 - 10x + 25 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (3)$$

الأجوبة: (1) المعادلة $3x^2 + x + 2 = 0$ ليس لها حل في \mathbb{R}

لأن $\Delta < 0$ $\Delta = 1 - 4 \times 3 \times 2 = -23$

$S = \emptyset$

(2) المعادلة $x^2 - 10x + 25 = 0$ لها حل وحيد مزدوج

لأن $\Delta = 10^2 - 4 \times 25 = 0$

حل هذه المعادلة هو: $x = \frac{-b}{2a} = 5$

و بالتالي مجموعة حلولها هي $S = \{5\}$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (3)$$

لدينا $\Delta = 9 - 4 \times 2 = 1$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$S = \{1; 2\} \quad \text{ومنه:} \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$$

تمرين 7: حل في \mathbb{R} المعادلات التالية :

$$\Delta = 0 \quad 2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0 \quad (2 \quad \Delta > 0 \quad 6x^2 - 7x - 5 = 0 \quad (1)$$

$$4x^2 - 8x + 3 = 0 \quad (4 \quad \Delta < 0 \quad 3x^2 + x + 2 = 0 \quad (3)$$

$$x^2 + 5x + 7 = 0 \quad (6 \quad x^2 - 4x + 2 = 0 \quad (5)$$

$$x^2 - 4x - 21 = 0 \quad (8 \quad 2x^2 - 4x + 6 = 0 \quad (7)$$

$$3x^2 - 6x + 3 = 0 \quad (9)$$

الأجوبة: $6x^2 - 7x - 5 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 6 \times (-5) = 49 + 120 = 169 = (13)^2 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(7) + \sqrt{169}}{2 \times 6} = \frac{7+13}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

$$S = \left\{ \frac{5}{3}, -\frac{1}{2} \right\} \quad \text{ومنه:} \quad x_2 = \frac{7-13}{12} = \frac{6}{12} = -\frac{1}{2}$$

$$c = 1 \quad \text{و} \quad b = -2\sqrt{2} \quad \text{و} \quad a = 2 \quad 2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0 \quad (2)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2\sqrt{2})^2 - 4 \times 2 \times 1 = 8 - 8 = 0$$

بما أن $\Delta = 0$ فان هذه المعادلة تقبل حل واحداً مزدوجاً هو:

$$S = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \quad \text{ومنه:} \quad x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(2\sqrt{2})}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$c = 2 \quad \text{و} \quad b = 1 \quad \text{و} \quad a = 3 \quad 3x^2 + x + 2 = 0 \quad (3)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 1 - 24 = -23 < 0$$

بما أن $\Delta < 0$ فان المعادلة ليس لها حل في \mathbb{R} ومنه:

$$c = 3 \quad \text{و} \quad b = -8 \quad \text{و} \quad a = 4 \quad 4x^2 - 8x + 3 = 0 \quad (4)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 3 \times 4 = 64 - 48 = 16 = (4)^2 > 0$$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$-3x+9$	+	0	-

$$S = [3; +\infty]$$

تمرين 14: حل في مجموعة الأعداد الحقيقة المتراجحت التالية:

$$5x - 15 \leq 0 \quad (1)$$

$$-2x + 12 > 0 \quad (2)$$

أجوبة: (1) $5x - 15 = 0 \Rightarrow x = 3$ يكافيء 6
و بما أن: $-2 < a < 0$ فان جدول الإشارة هو كالتالي:

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$-2x + 12$	+	0	-

$$S =]-\infty; 6]$$

$$5x - 15 = 0 \Rightarrow x = 3 \quad (2)$$

و بما أن: $5 = a < 0$ فان جدول الإشارة هو كالتالي:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$5x - 15 = 0$	-	0	+

$$S =]-\infty; 3]$$

تمرين 15: حل في \mathbb{R} المتراجحت التالية:

$$(1-x)(2x+4) > 0 \quad (1)$$

$$4x^2 - 9 \geq 0 \quad (2)$$

$$(2x-3)(2x+3) = 0 \quad \text{يعني } 4x^2 - 9 = 0$$

$$x = \frac{3}{2} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{3}{2} \quad \text{يعني } 2x+3=0 \quad \text{أو} \quad 2x-3=0$$

الطريقة: في جدول نعطي إشارة كل عامل على الشكل $ax+b$ ثم استنتاج إشارة

الجاء أو الخارج مع ترتيب تزادي للقيم التي ينعدم فيها كل عامل.

x	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
			$-\infty$
$2x+3$	-	0	+
$2x-3$	-	-	0
$(2x-3)(2x+3)$	+	0	-
			0
			+

$$S = \left] -\infty; -\frac{3}{2} \right] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty \right[$$

$$(1-x)(2x+4) > 0 \quad (2)$$

$$2x+4=0 \quad \text{يعني } x=-2 \quad \text{أو} \quad 1-x=0 \quad \text{يعني } x=1$$

$$x=1 \quad \text{أو} \quad x=-2$$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$2x+4$	-	0	+	+
$1-x$	+	-	0	-
$(1-x)(2x+4)$	-	0	+	-

$$S = [-2; 1]$$

تمرين 16: حل في \mathbb{R} المتراجحة: $0 < 9x^2 - 25 < 0$

$$\text{الجواب: } 9x^2 - 25 = 0 \quad \text{يعني } (3x)^2 - 5^2 = 0$$

$$(3x-5)(3x+5) = 0$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{5}{3} \quad \text{يعني } 3x+5=0 \quad \text{أو} \quad 3x-5=0$$

و منه التعميل :

$$x^2 - 3x - 2 = a(x - x_1)(x - x_2) = 1(x - 2)(x - 1)$$

$$3x^2 + x + 2 \quad \text{لدينا: } (3)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 1 - 24 = -23 < 0$$

و منه فان هذه الحدوية لا يمكن تعميلها

تمرين 9: عمل ثلاثيات الحدود التالية :

$$3x^2 - 6x + 3 \quad (3) \quad 4x^2 - 8x + 3 \quad (2) \quad 2x^2 - 4x + 6 \quad (1)$$

$$c = 6 \quad b = -4 \quad a = 2 \quad : \quad 2x^2 - 4x + 6 = 0 \quad (1)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16 - 48 = -32 < 0$$

و منه فان هذه الحدوية لا يمكن تعميلها

$$c = 3 \quad b = -8 \quad a = 4 \quad : \quad 4x^2 - 8x + 3 = 0 \quad (2)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 4 \times 3 = 64 - 48 = 16 = (4)^2 > 0$$

بما أن $0 < \Delta$ فان هذه الحدوية لها جذرين هما:

$$x_2 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{8+4}{2 \times 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

و منه التعميل :

$$4x^2 - 8x + 3 = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(x - \frac{3}{2} \right) = (4x - 2) \left(x - \frac{3}{2} \right)$$

$$\Delta = 3x^2 - 6x + 3 \quad \text{بما أن } 0 = \Delta \quad \text{فان هذه الحدوية لها جذر وحيد}$$

$$x_1 = \frac{-(-8)}{2 \times 4} = 1$$

$$\text{و منه التعميل: } 3x^2 - 6x + 3 = a(x - x_1)^2 = 3(x - 1)^2$$

تمرين 10: حدد إشارة $2x+1$

$$\text{الجواب: } x = -\frac{1}{2} \quad \text{يكافيء } 2x+1 = 0$$

و بما أن $2 < a = 0$ فان جدول إشارة $2x+1$ هو كالتالي:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x+1$	-	0	+

تمرين 11: حدد إشارة $-x+2$

الجواب:

$$x = 2 \quad \text{يكافيء } -x+2 = 0$$

و بما أن: $-1 < a = 0 < 0$ فان جدول إشارة $-x+2$ هو كالتالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-x+2$	-	0	+

تمرين 12: حل في \mathbb{R} المتراجحة التالية :

$$3x + 6 \geq 0 \quad \text{يكافيء } x = -2$$

$$x = 0 \quad \text{يكافيء } 3x + 6 = 0$$

و بما أن: $0 < a = 3 > 0$ فان جدول الإشارة هو كالتالي:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$3x+6$	-	0	+

$$\text{و منه فان: } S = [-2; +\infty[$$

تمرين 13: حدد إشارة: $-3x+9$

و حل في \mathbb{R} المتراجحة:

$$-3x+9 = 0 \quad \text{يكافيء } x = 3$$

$$x = 0 \quad \text{يكافيء } -3x+9 = 0$$

و بما أن: $0 < a = -3 < 0$ فان جدول الإشارة هو كالتالي:

$$a = 3 > 0 \quad 2x^2 - 4x + 6 \geq 0 \quad (1) \quad \text{أجوبة: } \Delta = b^2 - 4ac = 16 - 48 = -32 < 0$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$P(x) = 3x^2 - 4x + 6$		+

ومنه: $S = \mathbb{R}$

$$a = 4 \quad 4x^2 - 8x + 3 \leq 0 \quad (2)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 4 \times 3 = 64 - 48 = 16 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان للحودية جذرين هما:

$$x_1 = \frac{8+4}{2 \times 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \quad x_2 = \frac{8-4}{2 \times 4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \text{ومنه:}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$4x^2 - 8x + 3$	+	0	-	0

$$S = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

$$a = 4 \quad x^2 - 3x - 10 < 0 \quad (3)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان للحودية جذرين هما:

$$x_1 = 5 \quad x_2 = -2 \quad \text{ومنه:}$$

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$
$x^2 - 3x - 10$	+	0	-	0

$$S =]-2, 5[$$

تمرين 21: \mathbb{R}^2 هي مجموعة الأزواج (x, y) حيث

$$y \in \mathbb{R}$$

نعتبر في المجموعة \mathbb{R}^2 المعادلة: $2x + 3y = 2$

$$2x + 3y = 2 \quad (1) \quad \text{تأكد أن الزوج } \left(0, \frac{2}{3}\right) \text{ حل للمعادلة:}$$

(2) اعط ثلاث أزواج حلول للمعادلة: $2x + 3y = 2$

(3) حل في \mathbb{R}^2 المعادلة: $2x + 3y = 2$

$$\text{أجوبة: } (1) \quad \text{حل للمعادلة: } 2 \times 0 + 3 \times \frac{2}{3} = 2 \quad \text{اذن: } \left(0, \frac{2}{3}\right)$$

$$(2) \quad \text{اذن: } x = 2 \quad \text{اذن: } y = -\frac{2}{3} \quad \text{يعني: } 2 \times 2 + 3 \times y = 2$$

$$(3) \quad \text{اذن: } x = 3 \quad \text{اذن: } y = -\frac{4}{3} \quad \text{يعني: } 2 \times 3 + 3 \times y = 2$$

$$(4) \quad \text{اذن: } x = 4 \quad \text{اذن: } y = -2 \quad \text{يعني: } 2 \times 4 + 3 \times y = 2$$

$$y = \frac{-2x+2}{3} \quad \text{يعني: } 3y = -2x+2 \quad 2x+3y=2 \quad (3)$$

$$S = \left\{ \left(x; \frac{-2}{3}x + \frac{2}{3} \right) / x \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{يعني: } y = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

تمرين 22: حل في \mathbb{R}^2 المعادلات التالية:

$$-3x + 12y - 2 = 0 \quad (2) \quad 2x - 8y + 10 = 0 \quad (1)$$

$$7x - 14y + 1 = 0 \quad (3)$$

$$\text{أجوبة: } (1) \quad y = 8x - 10 \quad \text{يعني: } 2y = 8x - 10 \quad 2y = 8x - 8y + 10 = 0$$

$$S = \{(x; 4x - 5) / x \in \mathbb{R}\} \quad \text{اذن: } y = 4x - 5$$

الطريقة: في جدول نعطي إشارة كل عامل على الشكل $ax + b$ ثم استنتاج إشارة الجداء أو الخارج مع ترتيب تزايدی للقيم التي ينعدم فيها كل عامل.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$3x + 5$	-	0	+	+
$3x - 5$	-	-	0	+
$(2x-3)(2x+3)$	+	0	-	0

$$S = \left] -\infty; -\frac{5}{3} \right] \cup \left[\frac{5}{3}; +\infty \right[$$

تمرين 17:

1. أدرس إشارة الحودية $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$

2. حل في \mathbb{R} المتراجحة: $2x^2 - 3x + 1 \geq 0$

$$a = 2 \quad P(x) = 2x^2 - 3x + 1 \quad (1) \quad \text{أجوبة: }$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان للحودية جذرين هما:

$$x_1 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2} \quad x_2 = \frac{-(-3)+\sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{3+1}{4} = 1 \quad \text{ومنه:}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$P(x)$	+	0	-	0

$$S = \left] -\infty, \frac{1}{2} \right] \cup [1, +\infty[\quad (2) \quad \text{حل المتراجحة:}$$

تمرين 18:

1. أدرس إشارة الحودية $P(x) = -2x^2 + 4x - 2$

2. حل في \mathbb{R} المتراجحة: $-2x^2 + 4x - 2 > 0$

$$a = -2 \quad P(x) = -2x^2 + 4x - 2 \quad (1) \quad \text{أجوبة: }$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (4)^2 - 4 \times (-2) \times (-2) = 16 - 16 = 0$$

بما أن $\Delta = 0$ فان هذه الحودية لها جذر وحيد هو: $x_1 = \frac{-(4)}{2 \times (-2)} = 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$P(x) = -2x^2 + 4x - 2$	-	0	-

$$S = \mathbb{R} \quad (2) \quad \text{حل المتراجحة:}$$

تمرين 19:

1. أدرس إشارة الحودية $P(x) = 3x^2 + 6x + 5$

2. حل في \mathbb{R} المتراجحة: $3x^2 + 6x + 5 < 0$

$$a = 3 > 0 \quad P(x) = 3x^2 + 6x + 5 \quad (1) \quad \text{أجوبة: }$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (6)^2 - 4 \times 3 \times 5 = 36 - 60 = -24 < 0$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$P(x) = 3x^2 + 6x + 5$	+	

$$S = \emptyset \quad (2) \quad \text{حل المتراجحة:}$$

تمرين 20: حل في \mathbb{R} المتراجحات التالية:

$$(3) \quad 4x^2 - 8x + 3 \leq 0 \quad (2) \quad 2x^2 - 4x + 6 \geq 0 \quad (1)$$

$$x^2 - 3x - 10 < 0$$

$$\begin{aligned} y &= 2x + 1 \quad \text{يعني } 2x - y = -1 \\ \text{ونعرض } y &\text{ بقيمتها في المعادلة الثانية} \\ 3x + 2(2x + 1) &= 9 \quad \text{يعني } 5x + 2y = -19 \\ x = 1 &\quad \text{يعني } 7x + 2 = 9 \quad \text{يعني } 7x = 7 \\ \text{ونعرض } x &\text{ بـ 1 في المعادلة } y = 2x + 1 \quad \text{فنجد } y = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \{(1, 3)\} \\ \text{و منه: } &\begin{cases} x - 2y = -4 \\ -2x + 3y = 5 \end{cases} \quad (2) \end{aligned}$$

نضرب المعادلة الأولى في العدد (2) فنحصل على :

$$\begin{cases} 2x - 4y = -8 \\ -2x + 3y = 5 \end{cases} \quad \text{وبجمع المعادلتين طرف لطرف نجد:}$$

$$\begin{aligned} y = 3 &\quad \text{يعني } 2x - 4y = -8 + 5 \\ x = 2 &\quad \text{ونعرض } y \text{ بـ 3 في المعادلة } x - 2y = -4 \quad \text{فنجد} \\ S &= \{(2, 3)\} \end{aligned}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -35 + 12 = -23 \neq 0 \quad \text{هي: } (3)$$

و منه النظمة تقبل حلاً وحيداً:

$$S = \left\{ \left(\frac{-14}{23}, \frac{2}{23} \right) \right\} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} -7 & 4 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{2}{23} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{14}{23}$$

تمرين 27: باستعمال طريقة مناسبة حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمات التالية :

$$\begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ -x + \frac{4}{3}y = -\frac{1}{3} \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ x^2 - y^2 = 44 \end{cases} \quad (4) \quad \begin{cases} (\sqrt{5} - \sqrt{3})x + (\sqrt{2} - 1)y = 0 \\ (\sqrt{2} + 1)x + (\sqrt{5} + \sqrt{3})y = 1 \end{cases} \quad (3)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{محددة النظمة هي: } (1)$$

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2(x - 2y) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 1 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x - 2y = 1 \Leftrightarrow -2y = 1 - x \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$$

و منه النظمة (S) لها عدد لا متناهٍ من الحلولاذن :

$$S = \left\{ \left(x; \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \right) / x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ -x + \frac{4}{3}y = -\frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{بضرب المعادلة الثانية في } -3 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases} \quad (2)$$

وهذا غير ممكن و منه $S = \emptyset$

$$\begin{cases} (\sqrt{5} - \sqrt{3})x + (\sqrt{2} - 1)y = 0 \\ (\sqrt{2} + 1)x + (\sqrt{5} + \sqrt{3})y = 1 \end{cases} \quad (3)$$

محددة النظمة هي :

$$\Delta = \begin{vmatrix} \sqrt{5} - \sqrt{3} & \sqrt{2} - 1 \\ \sqrt{2} + 1 & \sqrt{5} + \sqrt{3} \end{vmatrix} = (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x + 2}{12} \quad \text{يعني } 12y = 3x + 2 \\ S &= \left\{ \left(x; \frac{1}{4}x + \frac{1}{6} \right) / x \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{يعني } y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{6} \\ x &= \frac{14y - 1}{7} \quad \text{يعني } 7x = 14y - 1 \quad 7x - 14y + 1 = 0 \quad (3) \end{aligned}$$

$$S = \left\{ \left(2y - \frac{1}{7}; y \right) / y \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{يعني } x = 2y - \frac{1}{7}$$

تمرين 23: حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمة التالية:

$$\begin{cases} 4x + y = 10 \\ -5x + 2y = -19 \end{cases}$$

باستعمال طريقة التعويض

الجواب: نبحث عن y في المعادلة الأولى مثلاً

$$y = 10 - 4x \quad \text{يعني } 4x + y = 10$$

ونعرض y بقيمتها في المعادلة الثانية

$$-5x + 2(10 - 4x) = -19 \quad \text{يعني } -5x + 2y = -19$$

$$x = 3 \quad \text{يعني } -13x = -39 \quad \text{يعني } x = 3$$

ونعرض x بـ 3 في المعادلة y = 10 - 4x فنجد

$$y = -2 \quad \text{و منه: } S = \{(3, -2)\}$$

تمرين 24: حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمة التالية:

$$\begin{cases} 4x + y = 10 \\ -5x + 2y = -19 \end{cases}$$

باستعمال طريقة التأليفة الخطية

الجواب: الجواب: نضرب المعادلة الأولى في العدد (-2) فنحصل على :

$$\begin{cases} -8x - 2y = -20 \\ -5x + 2y = -19 \end{cases}$$

$$x = 3 \quad \text{يعني } -13x = -39 \quad \text{يعني } x = 3$$

ونعرض x بـ 3 في المعادلة 4x + y = 10 فنجد

$$y = -2 \quad \text{و منه: } S = \{(3, -2)\}$$

تمرين 25: حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمة التالية :

$$(1) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ -x + 4y = 2 \end{cases}$$

باستعمال طريقة المحددة

الجواب: طريقة المحددة:

$$\text{محددة النظمة (1) هي: } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \quad \text{و منه النظمة تقبل حلاً وحيداً:}$$

$$S = \{(2, 1)\} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{6}{6} = 1 \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{12}{6} = 2$$

تمرين 26: حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمات التالية :

$$(1) \begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x + 2y = 9 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -7x - 3y = 4 \\ 4x + 5y = -2 \end{cases} \quad (3) \quad \begin{cases} x - 2y = -4 \\ -2x + 3y = 5 \end{cases}$$

أجوبة:

$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x + 2y = 9 \end{cases} \quad \text{نبحث عن y في المعادلة الأولى مثلاً}$$

تمرين 29: حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمة التالية :

$$\begin{cases} \frac{5}{x-1} + \frac{3}{y-2} = 4 \\ \frac{-2}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 1 \end{cases}$$

$$Y = \frac{1}{y-2} \quad \text{و} \quad X = \frac{1}{x-1}$$

$$y \neq 1 \quad x \neq 1$$

$$\begin{cases} 5X + 3Y = 4 \\ -2X + Y = 1 \end{cases}$$

$$Y = \frac{13}{11} \quad \text{و} \quad X = \frac{1}{11}$$


$$\frac{1}{y-2} = \frac{13}{11} \quad \text{و} \quad \frac{1}{x-1} = \frac{1}{11}$$

$$y = \frac{37}{13} \quad \text{و} \quad x = 12 \quad \text{يعني: } y-2 = \frac{11}{13} \quad \text{و} \quad x-1 = 11$$

$$S = \left\{ \left(12, \frac{37}{13} \right) \right\}$$

تمرين 30: أحسب طول عرض مستطيل اذا علمت أن طوله يزيد

$$\begin{aligned} &\text{عن عرضه ب } 2\text{ cm} \\ &\text{وأن مساحته تساوي } 15\text{ cm}^2 \\ &\text{الجواب} \end{aligned}$$



ليكن x وعرض مستطيل اذن طوله هو : $x+2$ ومنه مساحته هي :

$$S = x(x+2) = 15$$

ومنه نحصل عن معادلة من الدرجة الثانية :

$$b=2 \quad \text{و} \quad c=-15 \quad \text{و} \quad a=1 \quad \therefore x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 64 > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-2 - 8}{2 \times 1} = -5 < 0 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-2 + 8}{2 \times 1} = 3$$

ومنه: بما أن عرض مستطيل لا يمكن أن يكون سالبا :

$$x = 3$$

وبالتالي طوله هو :

$$5\text{ cm}$$

$$\Delta = (5-3) - (2-1) = 1 \neq 0 \quad \text{اذن} \quad \Delta = (\sqrt{5}^2 - (\sqrt{3})^2) - ((\sqrt{2})^2 - (1)^2)$$

و منه النظمة تقبل حلان وحيدا:

$$x = \frac{0 \quad \sqrt{2}-1}{\Delta} = \frac{-(\sqrt{2}-1)}{1} = -\sqrt{2} + 1 = 1 - \sqrt{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3} \quad 0}{\Delta} = \frac{-(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{1} = -\sqrt{5} + \sqrt{3} = \sqrt{3} - \sqrt{5}$$

و منه: $S = \{(1 - \sqrt{2}, \sqrt{3} - \sqrt{5})\}$

$$\begin{cases} x+y=11 \\ (x+y)(x-y)=44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=11 \\ x^2-y^2=44 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} x+y=11 \\ x-y=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=11 \\ 11(x-y)=44 \end{cases} \Leftrightarrow$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نجد:

$$x = \frac{15}{2} \quad \text{يعني: } 2x = 15 \quad \text{يعني: } x + y + x - y = 11 + 4$$

ونعوض x ب $\frac{15}{2}$ في المعادلة $x + y = 11$ فنجد

$$S = \left\{ \left(\frac{15}{2}, \frac{7}{2} \right) \right\} \quad \text{أي: } y = \frac{7}{2} \quad \text{و منه: } \frac{15}{2} + y = 11$$

تمرين 28: (1) حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظمة التالية :

$$\begin{cases} -7x - 3y = 4 \\ 4x + 5y = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{-7}{x} - \frac{3}{y} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{5}{y} = -2 \end{cases} \quad (2) \quad \text{استنتج حلول النظمة التالية:}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -35 + 12 = -23 \neq 0 \quad \text{هي: } 0$$

و منه النظمة تقبل حلان وحيدا:

$$S = \left\{ \left(\frac{14}{23}, \frac{2}{23} \right) \right\} \quad \text{و منه: } y = \frac{2}{23} \quad \text{و} \quad x = \frac{-2}{23} = \frac{14}{23}$$

(2) لكي تكون للنظمة معنى يجب أن يكون لدينا : $y \neq 0$ و $x \neq 0$

$$Y = \frac{1}{y} \quad \text{و} \quad X = \frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -7 \frac{1}{x} - 3 \frac{1}{y} = 4 \\ 4 \frac{1}{x} + 5 \frac{1}{y} = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{-7}{x} - \frac{3}{y} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{5}{y} = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -7X - 3Y = 4 \\ 4X + 5Y = -2 \end{cases} \quad \text{فنحصل على النظمة التالية: } y \neq 0 \quad x \neq 0$$

وسق أن قمنا بحل هذه النظمة : $Y = -\frac{2}{23}$ و $X = -\frac{14}{23}$

$$y = -\frac{23}{2} \quad \text{و} \quad x = -\frac{23}{14} \quad \text{يعني: } \frac{1}{y} = -\frac{2}{23} \quad \text{و} \quad \frac{1}{x} = -\frac{14}{23}$$

و بالتالي: $S = \left\{ \left(-\frac{23}{14}, -\frac{23}{2} \right) \right\}$

تمارين للبحث**تمرين 1 :** حل في \mathbb{R} المعادلات التالية :

$$4x^2 - 8x + 3 = 0 \quad (2) \quad 2x^2 - 4x + 6 = 0 \quad (1)$$

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0 \quad (4) \quad 3x^2 - 6x + 3 = 0 \quad (3)$$

$$x^2 + 5x + 7 = 0 \quad (6) \quad x^2 - 4x + 2 = 0 \quad (5)$$

تمرين 2 : حل جبريا النظمة التالية :

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ 5x + 3y = 50 \end{cases}$$

(2) ملأ شخص أربع عشرة قنينة بخمس لترات من عصير فواكه .
إذا علمت أن القنينات نوعان : قنينات سعة كل واحدة منها 0,5 لتر و قنينات سعة كل واحدة منها 0,3 لتراء، حدد عدد القنينات من كل نوع .

تمرين 3 :

(1) حل المعادلة : $(2x - 3)(4 - 3x) = 0$

(2) حل المترابحة : $5x - 2 < 2(x + 5)$

(3) اشتري شخص محاسبة و كتابا بثمن 153 درهما .
إذا علمت أن نصف ثمن المحاسبة ينفقه بثمانية عشر درهما عن ثلثي ثمن الكتاب، أحسب ثمن المحاسبة .

تمرين 4 :

(1) حل النظمة : $\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5y = 61 \end{cases}$

(2) يتوفى أحمد على 61 درهما موزعة على 20 قطعة نقدية بعضها من فئة درهمين ، والبعض الآخر من فئة خمسة دراهم . أحسب عدد القطع النقدية من كل فئة .

تمرين 5 :

(1) أ) حل المعادلة التالية : $\frac{2x}{3} - \frac{5}{6} = x - \frac{3}{2}$

ب) حل المترابحة التالية : $2 - 3x > x + 7$

(2) أ) حل النظمة : $\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$

ب) واجب زيارة أحد المتاحف هو 3 دراهم للأطفال و 5 دراهم للكبار .

أدى فوج من 20 زائرا مبلغ 72 درهما لزيارة هذا المتحف .
حدد عدد الأطفال و عدد الكبار في هذا الفوج .

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} 2x - 5y = -13 \\ 3x + 2y = 9 \end{cases} \quad (1)$$

« c'est en forgeant que l'on devient forgeron » dit un proverbe.
c'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien

