



## الجبر

### مذكرة رقم 7 : المعدوديات مع تمارين وأمثلة مطلوبة

#### الأهداف القدرات المنتظرة من الدرس :

توجيهات تربوية	القدرات المنتظرة	محتوى البرنامج
<p>- ينبعي تحجب إعطاء أي بناء نظري لمفهوم الحدوية ويمكن تقديمها، مع الإشارة إلى العناصر المميزة لها (الحد، الدرجة، المعامل)، من خلال أمثلة بسيطة؛</p> <p>- إذا كانت تقنية القسمة لحدودية على <math>x-a</math> تلعب دوراً في تعليم حدوية أحد جذورها هو <math>a</math> فإنه ينبغي الاهتمام بباقي التقنيات التي تؤدي إلى هذا التعليم.</p>	<p>- التمكن من تقنية القسمة الإقليدية على <math>x-a</math> وإدراك قابلية القسمة على <math>x-a</math>.</p>	<p>- تقديم حدوية، تساوي حدوديتين؛</p> <p>- جمع وضرب حدوديتين؛</p> <p>- جذر حدوية، القسمة على <math>x-a</math>؛</p> <p>- تعليم حدوية.</p>
<p><b>الحالة 1 :</b> <math>d^{\circ}P = 2</math> <math>a=1</math> يعني <math>a \neq 1</math></p> $d^{\circ}P = 4$ <p><b>تعريف:</b> الحدوية المنعدمة هي الحدوية التي جميع معاملاتها تساوي صفرًا.</p> <p>أي <math>P(x) = 0</math> لكل <math>x \in \mathbb{R}</math>.</p> <p><b>ملحوظة:</b> الحدوية المنعدمة ليست لها درجة.</p> <p><b>نشاط :</b> نعتبر الحدوبيتين التاليتين :</p> $Q(x) = 2x^2(x-2) + (x-1)(2x+3)$ $P(x) = 2x^3 - 2x^2 + x - 3$ <p>1. حدد درجة الحدوبيتين <math>P(x)</math> و <math>Q(x)</math></p> <p>2. ماذا تلاحظ ؟</p> <p><b>الجواب على النشاط (1):</b> لا يمكن تحديد درجة الحدوية <math>Q(x)</math> الا بعد النشر والتبسيط</p> $Q(x) = 2x^2(x-2) + (x-1)(2x+3) = 2x^3 - 4x^2 + 2x^2 + 3x - 2x - 3$ $d^{\circ}Q = 3$ <p>و منه <math>Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + x - 3</math></p> <p><b>(2) نلاحظ</b> أيضاً أن معاملات الحدود من نفس الدرجة متتساوية</p> <p>نقول ان : <math>Q(x) = P(x)</math></p> <p><b>خاصية:</b> تكون حدوبيتان متتساويتين اذا و فقط اذا كانت لهما نفس الدرجة و كانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متتساوية.</p> <p><b>تمرين 2 :</b> نعتبر الحدوبيتين <math>P(x)</math> و <math>Q(x)</math> بحيث :</p> $P(x) = (a-1)x^3 + 2ax^2 + 5x + 6$ $Q(x) = 2x^3 + 4x^2 + (3+a)x + 3a$ <p>حيث <math>a</math> عدد حقيقي يخالف 1. لنحدد قيمة العدد الحقيقي <math>a</math> بحيث تكون <math>P(x)</math> و <math>Q(x)</math> متتساويتين.</p> <p><b>الجواب :</b></p> <p>اذن : <math>a \neq 1</math> و منه : <math>d^{\circ}P = 3</math> ولینا أيضًا <math>d^{\circ}Q = 3</math></p> $d^{\circ}P = d^{\circ}Q$ <p>اذن:</p> $a = \begin{cases} a-1 = 1 \\ 2a = 4 \\ 3+a = 5 \\ 3a = 6 \end{cases}$ <p>يعني أن :</p> $Q(x) = P(x)$ <p><b>تمرين 3 :</b> أدرس تساوي الحدوبيتين في الحالات التالية:</p> $Q(x) = x^2(3x-2) + x$ $P(x) = x^3 + 2x^2(x-1) + x . 1$ $Q(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 1$ $P(x) = (x-1)^3 . 2$	<p><b>I-تقدير حدوية و تساوي حدوديتين:</b></p> <p><b>(1) تقديم حدوية : أمثلة و تعاريف: مثال 1:</b></p> <p>التعبير <math>P(x) = \frac{1}{2}x^3 - \sqrt{2}x^2 + x - \frac{1}{3}</math> يسمى حدوية <math>\frac{1}{2}x^3 - \sqrt{2}x^2 + x - \frac{1}{3}</math> يسمى حد الحدوية من الدرجة 3.</p> <p>مثال 2: كل حدوية من الدرجة الأولى تسمى حدانية و تكتب على شكل: <math>ax + b</math> حيث <math>a \in \mathbb{R}</math>.</p> <p>مثال 3: التعبير <math>x^2 + 2\sqrt{x} + 5</math> ليس بحدوية لأنها تحتوي على <math>\sqrt{x}</math>.</p> <p>مثال 4: الحدوية <math>P(x) = 3x^4 + x^3 - 7x + \sqrt{3}</math> درجتها 4.</p> <p>3 هو معامل الحد من الدرجة 4 . 1 هو معامل الحد من الدرجة 3 ، 0 هو معامل الحد من الدرجة 2.</p> <p>7 هو معامل الحد من الدرجة 1 ، <math>\sqrt{3}</math> هو معامل الحد من الدرجة 0.</p> <p>نرمز عادة لحدودية بأحد الرموز: <math>P(x)</math> أو <math>Q(x)</math> أو <math>R(x)</math> أو <math>S(x)</math> ..... نعتبر الحدوية: <math>P(x) = 4x^2 - x^3 + x^4 + 3 + x</math> يمكن كتابة الحدوية <math>P(x)</math> على شكل: <math>P(x) = x^4 - x^3 + 4x^2 + x + 3</math> نقول إننا رتبنا <math>P(x)</math> تبعاً للقوى التزايدية.</p> <p><b>تمرين 1 :</b> حدد من بين التعبيرات التالية الحدوبيات و درجتها ان أمكن: حيث <math>a \in \mathbb{R}</math></p> $Q(x) = 2x^2 - x - \sqrt{x}$ $P(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{\sqrt{2}}{2}x^2 - \sqrt{3}$ $M(x) = \frac{5}{3}x^2 + x + 2 - 7x^4$ $R(x) = 5 x^2  + 4 x  - 5$ $E(x) = (a-1)x^4 + x^2 + x + 1$ $O(x) = 4$ $N(x) = x^2 + \frac{1}{x} + 3$ <p><b>الجواب :</b> <math>P(x)</math> حدوية و <math>d^{\circ}P = 3</math> و <math>Q(x)</math> ليست بحدوية. <math>M(x)</math> ليست بحدوية. <math>E(x)</math> ليس بحدوية. <math>O(x)</math> ليس بحدوية. <math>N(x)</math> حدوية. <math>d^{\circ}M(x) = 4</math></p>	

نقول 1 جذر للحدودية  $P(x)$  (نفس الجواب بالنسبة ل 3 و -2)  
**(1) جذر حدودية:**

**تعريف:** لتكن  $P(x)$  حدودية و  $\alpha$  عدداً حقيقياً.

نقول أن  $\alpha$  جذر للحدودية  $P(x)$  إذا كان:  $P(\alpha) = 0$   
 $\alpha$  يسمى أيضاً صفراللحدودية  $(x)$ .

**نشاط:** نعتبر الحدودية  $P(x)$  بحيث:  $P(x) = 2x^2 - x - 1$

1. بين أن 1 جذر للحدودية  $(x)$

2. تأكيد أن:  $P(x) = (x-1)(2x+1)$

**الجواب (1):** إذن 1 جذر للحدودية  $(x)$

$(x-1)(2x+1) = 2x \times x + x - 2x - 1 = 2x^2 - x - 1 = P(x)$  (2)

إذن  $P(x) = (x-1)(2x+1)$

نقول  $P(x)$  تقبل القسمة على  $-1$

**(2) قابلية القسمة على  $x - \alpha$ :**

**تعريف:** لتكن  $P(x)$  حدودية درجة  $n$  حيث  $n \geq 1$  و  $\alpha$  عدداً حقيقياً.

$n-1$  تقبل القسمة على  $x - \alpha$  إذا وجدت حدودية  $Q(x)$  درجة  $n-1$

بحيث:  $P(x) = (x-\alpha)Q(x)$

**خاصية:** لتكن  $P(x)$  حدودية درجة  $n$  حيث  $n \geq 1$  و  $\alpha$  عدداً حقيقياً.

.  $P(x)$  تقبل القسمة على  $x - \alpha$  إذا وفقط إذا كان  $\alpha$  جذراً للحدودية  $(x)$

**مثال:** نعتبر الحدودية  $P(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 6$  بحيث:

1. بين أن -3 جذر للحدودية  $(x)$

2. حدد حدودية  $Q(x)$  بحيث:  $P(x) = (x+3)Q(x)$

**الجواب (1):** -3 جذر للحدودية لأن  $P(-3) = 0$

(2) إذن  $P(x)$  تقبل القسمة على  $-3$ , و منه توجد حدودية  $Q(x)$  بحيث:

$P(x) = (x+3)Q(x)$  لدينا  $P(x) = (x+3)Q(x)$  درجة 3 و  $R(x)$  درجة 0

إذن  $Q(x)$  درجة 2 وبالتالي  $Q(x)$  تكتب على شكل:

$$(a \neq 0) \quad Q(x) = ax^2 + bx + c$$

**: تحديد  $Q(x)$**

$$P(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 6$$

$$P(x) = (x+3)(ax^2 + bx + c)$$

$$x^3 + 3x^2 - 2x - 6 = (x+3)(ax^2 + bx + c)$$

$$= ax^3 + (b+3a)x^2 + (c+3b)x + 3c$$

$$= ax^3 + bx^2 + cx + 3ax^2 + 3bx + 3c$$

حسب خاصية تساوي حدوديتين لدينا:  $a = 1$  و  $b + 3a = 3$  و  $c + 3b = -2$

$$3c = -6 \quad c + 3b = -2$$

يعني أن:  $a = 1$  و  $b = 0$  و  $c = -2$

$$Q(x) = x^2 - 2$$

$$P(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 6 = x^2(x+3) - 2(x+3)$$

$$Q(x) = x^2 - 2$$

**الطريقة 3: إنجاز القسمة الأقلبية**

**الجواب :** (1)

$$P(x) = x^3 + 2x^2(x-1) + x = x^3 + 2x^3 - 2x^2 + x = 3x^3 - 2x^2 + x$$

$$Q(x) = x^2(3x-2) + x = 3x^3 - 2x^2 + x = P(x)$$

$$P(x) = (x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \quad (2)$$

إذن:  $(3 \neq -3)$  لأن معاملات الحد من الدرجة 1 غير متساوية  $(Q(x) \neq P(x))$

## II. جمع و ضرب حدوديتين:

**نشاط 1:** أحسب مجموع الحدوديتين  $P(x)$  و  $Q(x)$  حيث:

$$Q(x) = x^3 - x^2 + 2 \quad P(x) = x^2 + x + 1$$

$$d^0(P+Q) \dots d^0P + d^0Q$$

$$P(x) + Q(x) = (x^2 + x + 1) + (x^3 - x^2 + 2) = x^3 + x + 3$$

$$d^0(P+Q) \leq d^0P + d^0Q$$

**الجواب :** لدينا:  $P(x)$  و  $Q(x)$  هو حدودية نرمز لها

$$\cdot P(x) + Q(x)$$

**خاصية 2:** لتكن  $P(x)$  و  $Q(x)$  حدوديتين غير منعدمتين. لدينا:

$$d^0(P+Q) \leq d^0P + d^0Q \quad \text{في حالة } P(x) + Q(x) \text{ حدودية غير منعدمة.}$$

**تمرين 4:** نعتبر الحدوديتين التاليتين :

$$Q(x) = -2x^3 + 5x^2 - 2x - 1 \quad P(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x + 1$$

$$P(x) - Q(x) \quad \text{و} \quad P(x) + Q(x)$$

$$P(x) + Q(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x + 1 - 2x^3 + 5x^2 - 2x - 1 = 3x^3 + 3x^2 + x$$

$$P(x) - Q(x) = (5x^3 - 2x^2 + 3x + 1) - (-2x^3 + 5x^2 - 2x - 1) = 7x^3 - 7x^2 + 5x + 2$$

**نشاط 2:** أحسب جداء الحدوديتين  $P(x)$  و  $Q(x)$  حيث:

$$Q(x) = x^3 - x^2 + 2 \quad P(x) = x^2 + x + 1$$

$$d^0(P \times Q) \dots d^0P + d^0Q$$

$$P(x) \times Q(x) = (x^2 + x + 1) \times (x^3 - x^2 + 2)$$

$$= x^5 - x^4 + 2x^2 + x^4 - x^3 + 2x + x^3 - x^2 + 2$$

$$= x^5 + x^2 + 2x + 2$$

$$d^0(P(x) \times Q(x)) = d^0P(x) + d^0Q(x)$$

إذن:  $P(x) \times Q(x)$  هو حدودية نرمز لها

$$\cdot P(x) \times Q(x)$$

**خاصية 4:** لتكن  $P(x)$  و  $Q(x)$  حدوديتين غير منعدمتين. لدينا:

$$d^0(P(x) \times Q(x)) = d^0P(x) + d^0Q(x)$$

## III. القسمة الأقلبية لحدودية على $x - \alpha$

**نشاط:** نعتبر الحدودية  $P(x)$  بحيث:  $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

$$\text{أحسب: } P(-2) \text{ و } P(2) \text{ و } P(1)$$

$$P(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 - 5 \times 1 + 6 = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$$

$$P(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 - 5 \times 2 + 6 = 8 - 8 - 10 + 6 = -4 \neq 0$$

$$P(3) = 3^3 - 2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 6 = 27 - 18 - 15 + 6 = 0$$

$$P(2) = (-2)^3 - 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 6 = -8 - 8 + 10 + 6 = 0$$

مراحل انجاز القسمة  
الاقليدية:

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 2x - 6 \\ -x^3 - 3x^2 \\ \hline -2x - 6 \\ -2x - 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 3 \\ \hline x^2 - 2 \end{array}$$

(2) 3 جذر للحدودية  $(x) Q$  لأن  $Q(3) = 0$  ومنه  $(x) Q$  تقبل القسمة على  $x-3$

(3) وجدنا حسب السؤال  $P(x) = (x+2) \times (x^2 - 4x + 3)$

ووجدنا حسب السؤال  $Q(x)$  تقبل القسمة على  $x-3$

نجز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) Q$  على  $x-3$

فجذ :  $Q(x) = (x-3) \times (x-1)$

ومنه:  $P(x) = (x+2) \times (x-3) \times (x-1)$

**تمرين 2:** نعتبر الحودية  $(x) P$  المعرفة بما يلي:

$$P(x) = 2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2$$

1. تتحقق من أن 0 ليس جذراً للحدودية  $(x) P$ .

2. بين أنه إذا كانت  $\alpha$  جذراً للحدودية  $(x) P$  فان  $\frac{1}{\alpha}$  هو أيضاً جذر للحدودية  $(x) P$ .

3. بين أن العدد 2 جذر للحدودية  $(x) P$ .

4. بانجاز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) Q$  على  $x-2$ , حدد الحودية  $(x) Q$

حيث:  $P(x) = (x-2)Q(x)$

$$Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

6. حدد الأعداد الحقيقة  $a$  و  $b$  و  $c$  بحيث يكون:  $Q(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(ax^2 + bx + c)$

7. استنتج تعديلاً للحدودية  $(x) P$  إلى جذاء حدويات من الدرجة الأولى.

**الجواب 1:**  $P(0) = 2 \neq 0$  ومنه 0 ليس جذراً للحدودية  $(x) P$ .

**تمرين 2:** جذر للحدودية  $(x) P$  يعني  $P(\alpha) = 0$  يعني :

$$2\alpha^4 - 9\alpha^3 + 14\alpha^2 - 9\alpha + 2 = 0$$

$$P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\frac{1}{\alpha}\right)^4 - 9\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 + 14\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 - 9\left(\frac{1}{\alpha}\right) + 2$$

$$P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\frac{1}{\alpha^4}\right) - 9\left(\frac{1}{\alpha^3}\right) + 14\left(\frac{1}{\alpha^2}\right) - 9\left(\frac{1}{\alpha}\right) + 2$$

$$P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \left(\frac{2}{\alpha^4}\right) + \left(\frac{-9\alpha}{\alpha^4}\right) + \left(\frac{14\alpha^2}{\alpha^4}\right) + \left(\frac{-9\alpha^3}{\alpha^4}\right) + 2\frac{\alpha^4}{\alpha^4}$$

$$P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{2 - 9\alpha + 14\alpha^2 - 9\alpha^3 + 2\alpha^4}{\alpha^4}$$

وبما أنه لدينا:  $2\alpha^4 - 9\alpha^3 + 14\alpha^2 - 9\alpha + 2 = 0$

$$P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{0}{\alpha^4} = 0$$

ومعه  $\frac{1}{\alpha}$  هو أيضاً جذر للحدودية  $(x) P$ .

**تمرين 3:**  $P(2) = 2 \times 2^4 - 9 \times 2^3 + 14 \times 2^2 - 9 \times 2 + 2 = 32 - 72 + 56 - 18 + 2 = 3$

**تمرين 4:**  $P(2) = 2 \times 2^4 - 9 \times 2^3 + 14 \times 2^2 - 9 \times 2 + 2 = 32 - 72 + 56 - 18 + 2 = 0$

ومعه العدد 2 جذر للحدودية  $(x) P$ .

**تمرين 5:** نجز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) P$  بحيث:  $P(x) = (x-2)Q(x)$

1. بين أن  $(x) P$  تقبل القسمة على  $x-3$

2. حدد حدودية  $(x) Q$  بحيث:  $P(x) = (x-3)Q(x)$

**الجواب 1:** 3 جذر للحدودية: لأن  $Q(3) = 0$  ومنه  $(x) P$  تقبل القسمة على  $x-3$

**تمرين 6:** نجز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) P$  على  $x-3$  فجذ :

$$P(x) = (x-3) \times (2x^2 + x - 1)$$

**تمرين 7:** نعتبر الحودية  $(x) P$  بحيث:  $P(x) = (x-1)Q(x)$

1. بين أن  $(x) P$  تقبل القسمة على  $x-1$

عمل الحودية  $(x) P$

**الجواب :**

1. 1 جذر للحدودية: لأن  $P(1) = 0$  ومنه  $(x) P$  تقبل القسمة على  $x-1$

2. نجز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) P$  على  $x-1$  فجذ :

$$P(x) = (x-1) \times (2x+3)$$

**تمرين 7:** نعتبر الحوديتيين  $(x) P$  و  $(x) Q$  بحيث:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

$$Q(x) = x^2 - 4x + 3$$

1. أجز القسمة الاقليدية للحدودية  $(x) P$  على  $x+2$ .

2. وبين أن  $(x) Q$  تقبل القسمة على  $x-3$ .

3. استنتاج تعديلاً للحدودية  $(x) P$  إلى جذاء حدويات من الدرجة الأولى.

**الجواب 1:**

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \\ -x^3 - 2x^2 \\ \hline -4x^2 - 5x + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -4x^2 - 5x + 6 \\ 4x^2 + 8x \\ \hline 3x + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x + 6 \\ -3x - 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

5) وجدنا حسب سؤال سابق أن 2 جذر للحدودية  $(x) P$ . اذن حسب السؤال السؤال

فإن  $\frac{1}{2}$  هو أيضاً جذر للحدودية  $(x) P$ . يعني :

يعني :  $P(x) = (x-2)Q(x)$  وحيث أنه لدينا :  $P\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

فإن :  $\left(\frac{1}{2}-2\right) \neq 0$  لأن  $Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0$  أي  $\left(\frac{1}{2}-2\right) \times Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

(6) نتج القسمة الأقلبية للحدودية  $Q(x)$  على  $x - \frac{1}{2}$  فجده :

$$c = 2 \text{ و } b = -4 \text{ و } a = 2 \text{ أي } Q(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(2x^2 - 4x + 2)$$

$$Q(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(2x^2 - 4x + 2) \text{ و } P(x) = (x-2)Q(x) \text{ لدينا (7)}$$

اذن :  $P(x) = (x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(2x^2 - 4x + 2)$

يجب أيضاً تعميل :  $2x^2 - 4x + 2$  بـ 1 جذر للحدودية

وبقسمة 2  $2x^2 - 4x + 2$  على  $(x-1)$  نجد

أن :  $(x-2)(2x^2 - 4x + 2) = (x-1)(2x-2)$  وبالتالي :

$$P(x) = (x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-1)(2x-2) = 2(x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-1)(x-1)$$