

الهندسة

مذكرة رقم 11 : ملخص لدروس: الحساب المثلثي 2 مع تمارين وأمثلة محلولة

الأهداف والقدرات المنتظرة من الدرس :



الجزء الثاني:

- التمثيل المبياني للدالتين sin و cos

- المعادلات والمتراجحات المثلثية الأساسية:

$$\tan x = a \quad \cos x = a \quad \sin x = a$$

$$\tan x \geq a \quad \cos x \geq a \quad \sin x \geq a$$

$$\tan x \leq a \quad \cos x \leq a \quad \sin x \leq a$$

- الزوايا المحيطية، الرباعيات الدائرية؛


$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$s = pr \quad s = \frac{1}{2} ab \sin C$$

- يمكن بمناسبة إنشاء التمثيل المبياني للدالتين sin و cos، التعرض إلى مفهوم الدالة الدورية (تعريفه وإعطاء بعض العلاقات المميزة له).
- يعتبر حل المعادلات والمتراجحات المثلثية المحددة في البرنامج مناسبة لتعميق التعامل مع الدائرة المثلثية.
- تعتبر دراسة الزوايا المحيطية والرباعيات الدائرية مناسبة لتثبيت وتقوية مكتسبات التلاميذ في جل مفاهيم الهندسة المسطوية وإثبات بعض العلاقات في المثلث.

- التمكن من رسم منحني كل من الدالتين sin و cos واستثماره في إدراك وتثبيت مفاهيم الدورية والزوجية والرتابة ...
- التمكن من تمثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلثية على الدائرة المثلثية؛

التالي و رسم التمثيل المبياني على المجال $[0; 2\pi]$



ماذا تلاحظ بالنسبة لمنحني الدالة cos ؟ أصغر قيمة ؟ أكبر قيمة ؟
بنفس الطريقة نرسم التمثيل المبياني على: \mathbb{R}
نلاحظ أن التمثيل المبياني يكرر نفسه على كل مجال سعته 2π
لذلك نقول ان الدالة دورية ودورها $T = 2\pi$

II. المعادلات المثلثية الأساسية:

خاصية 1: $a \in \mathbb{R}$ و نعتبر المعادلة: $\cos x = a$: (E)

- اذا كان: $a > 1$ أو $a < -1$ فان المعادلة: $\cos x = a$ ليس لها حلول في \mathbb{R} .
- اذا كان: $-1 \leq a \leq 1$ فانه يوجد $x_0 \in \mathbb{R}$ بحيث

$$\cos x = \cos x_0$$

وحلول المعادلة $\cos x = a$: (E) في \mathbb{R} هي الأعداد الحقيقية :

$$x_0 + 2k\pi \quad \text{أو} \quad -x_0 + 2k\pi \quad \text{حيث} \quad k \in \mathbb{Z}$$

مثال 1: (1) حل في \mathbb{R} المعادلة: $\cos x = \frac{1}{2}$

(2) حل في المجال $[-\pi, \pi]$: المعادلة: $\cos x = \frac{1}{2}$

(الجواب: 1) $\cos x = \frac{1}{2}$ يعني $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$

وحلول المعادلة هي: $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ أو $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

ومنه: $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$


(2) نقوم بالتأطير: (أ) $-\pi < -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ يعني $-1 < \frac{1}{3} + 2k \leq 1$

يعني $1 - \frac{1}{3} < \frac{1}{3} + 2k - \frac{1}{3} \leq 1 - \frac{1}{3}$ يعني $-\frac{4}{3} < 2k \leq \frac{2}{3}$

I. التمثيل المبياني للدالتين cos و sin

دراسة وتمثيل الدالة sin :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
y	0	0.5	1	0.5	0	-0.5	-1	-0.5	0




رسم منحني الجيب: $y = \sin x$

كنشاط يقوم التلاميذ بملا الجدول التالي و رسم التمثيل المبياني على المجال $[0; 2\pi]$

ماذا تلاحظ بالنسبة لمنحني الدالة sin ؟ أصغر قيمة ؟ أكبر قيمة ؟

بنفس الطريقة نرسم التمثيل المبياني على المجال \mathbb{R}



نلاحظ أن التمثيل المبياني يكرر نفسه على كل مجال سعته 2π

لذلك نقول ان الدالة دورية ودورها $T = 2\pi$

دراسة وتمثيل الدالة cos :

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π
y	1	0.5	0	-0.5	-1	-0.5	0	0.5	1

رسم منحني الجيب: $y = \cos x$ و كنشاط يقوم التلاميذ بملا الجدول

ومنه: نعوض k ب 0 في $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ فنجد:

$$x_1 = \frac{2\pi}{3} + 2 \times 0 \times \pi$$

أي: $x_1 = \frac{2\pi}{3}$ وبالتالي: $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}$

خاصية 3: $a \in \mathbb{R}$ ونعتبر المعادلة: $\tan x = a$ (E)

يوجد $x_0 \in \mathbb{R}$ بحيث $\tan x = \tan x_0$; وحلول المعادلة (E) في

\mathbb{R} . هي الأعداد الحقيقية: $x_0 + k\pi$ أو $x_0 + k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

هي الأعداد الحقيقية: $x_0 + k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

مثال: حل في \mathbb{R} المعادلة: $\tan x = 1$
الجواب:

$\tan x = 1$ يعني $\tan x = \tan \frac{\pi}{4}$ يعني $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

ومنه: $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

ملخص: من أجل كل عددين حقيقيين x و y .

$k \in \mathbb{Z}$	$\cos x = \cos y$ تكافئ أو $\begin{cases} x = y + 2k\pi \\ x = -y + 2k\pi \end{cases}$
$k \in \mathbb{Z}$	$\sin x = \sin y$ تكافئ أو $\begin{cases} x = y + 2k\pi \\ x = (\pi - y) + 2k\pi \end{cases}$
$k \in \mathbb{Z}$	$\tan x = \tan y$ تكافئ $x = y + k\pi$

تمرين 1: حل في \mathbb{R} المعادلة $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(الجواب: 1) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ يعني $\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$

وحلول المعادلة هي: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ أو $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$

ومنه: $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

تمرين 2: (1) حل في $[0, 2\pi[$ المعادلة: $\cos x = -\frac{1}{2}$

(2) حل في $[0, 2\pi[$ المعادلة: $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(الجواب: 1) $\cos x = -\frac{1}{2}$ يعني $\cos x = -\cos \frac{\pi}{3}$ يعني $\cos x = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right)$

لأن: $\cos(\pi - x) = -\cos x$

يعني $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ يعني $\cos x = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right)$

$x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ أو $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

نقوم بالتأطير: (أ) $0 \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < 2\pi$ يعني $0 \leq \frac{2\pi}{3} + 2k < 2$

يعني $-\frac{2}{3} \leq 2k < 2 - \frac{2}{3}$ يعني $-\frac{1}{3} \leq k < \frac{2}{3}$

يعني $-\frac{1}{3} < k \leq \frac{2}{3} = 0.66$ إذن: $k = 0$

ومنه: نعوض k ب 0 في $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ فنجد: $x_1 = \frac{2\pi}{3}$

أي: $x_1 = \frac{2\pi}{3}$

(ب) نقوم بنفس عملية التأطير: $0 \leq -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi < 2\pi$

$0 \leq -\frac{2}{3} + 2k < 2$ يعني $\frac{2}{3} \leq 2k < 2 + \frac{2}{3}$ يعني $\frac{1}{3} \leq k < \frac{4}{3}$

يعني $\frac{1}{3} < k \leq \frac{4}{3} = 1.33$ إذن: $k = 1$

يعني $-\frac{2}{3} < k \leq \frac{1}{3}$ يعني $-\frac{4}{3} \times \frac{1}{2} < 2k \times \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$

إذن: $0 = k$ $-\frac{2}{3} < k \leq \frac{1}{3} = 0.33$

ومنه: نعوض k ب 0 في $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ فنجد: $x_1 = \frac{\pi}{3}$

أي: $x_1 = \frac{\pi}{3}$

(ب) نقوم بنفس عملية التأطير: $-\pi < \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ يعني

$-1 < -\frac{1}{3} + 2k \leq 1$ يعني $-\frac{1}{3} < -\frac{1}{3} + 2k + \frac{1}{3} \leq 1 + \frac{1}{3}$

$-\frac{2}{3} < 2k \leq \frac{4}{3}$

يعني $-\frac{1}{3} < k \leq \frac{2}{3}$ يعني $-\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} < 2k \times \frac{1}{2} \leq \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}$

إذن: $0 = k$ $-\frac{1}{3} < k \leq \frac{2}{3} = 0.66$

ومنه: نعوض k ب 0 في $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ فنجد:

$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2 \times 0 \times \pi$

أي: $x_1 = -\frac{\pi}{3}$ وبالتالي: $S = \left\{ -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\}$

مثال 2: حل في \mathbb{R} المعادلة: $\cos x = 2$

الجواب: لدينا: $a = 2 > 1$ ومنه: فإن المعادلة: $\cos x = 2$

ليس لها حلولاً في \mathbb{R} أي: $S = \emptyset$

خاصية 2: $a \in \mathbb{R}$ ونعتبر المعادلة: $\sin x = a$ (E)

إذا كان: $a > 1$ أو $a < -1$ فإن المعادلة (E) ليس لها حلولاً في \mathbb{R} .

إذا كان: $-1 \leq a \leq 1$ فإنه يوجد $x_0 \in \mathbb{R}$ بحيث $\sin x = \sin x_0$

وحلول المعادلة (E) في \mathbb{R} . هي الأعداد الحقيقية: $x_0 + 2k\pi$ أو

$\pi - x_0 + 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

مثال: (1) حل في \mathbb{R} المعادلة: $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) حل في المجال: $]-\pi, \pi]$ المعادلة: $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(الجواب: 1) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ يعني $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$

وحلول المعادلة هي: $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ أو $x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

ومنه: $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

(2) نقوم بالتأطير: (أ) $-\pi < \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ يعني $-1 < \frac{1}{3} + 2k \leq 1$

يعني $-\frac{4}{3} < 2k \leq \frac{2}{3}$ يعني $1 - \frac{1}{3} < \frac{1}{3} + 2k - \frac{1}{3} \leq 1 - \frac{1}{3}$

يعني $-\frac{2}{3} < k \leq \frac{1}{3}$ يعني $-\frac{4}{3} \times \frac{1}{2} < 2k \times \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$

إذن: $0 = k$ $-\frac{2}{3} < k \leq \frac{1}{3} = 0.33$

ومنه: نعوض k ب 0 في $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ فنجد: $x_1 = \frac{\pi}{3}$ أي: $x_1 = \frac{\pi}{3}$

(ب) نقوم بنفس عملية التأطير: $-\pi < \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ يعني

$-1 < \frac{2}{3} + 2k \leq 1$ يعني $-1 + \frac{2}{3} < 2k \leq 1 + \frac{2}{3}$ يعني $-\frac{1}{3} < 2k \leq \frac{5}{3}$

يعني $-\frac{1}{6} < k \leq \frac{5}{6}$ يعني $-\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} < 2k \times \frac{1}{2} \leq \frac{5}{3} \times \frac{1}{2}$

إذن: $0 = k$

ومنه: نعوض k بهذه القيم فنجد:

$$x_1 = \frac{\pi}{2} + 0 \times \pi \text{ أو } x_2 = \frac{\pi}{2} + 1 \times \pi \text{ أو } x_3 = \frac{\pi}{2} - 1 \times \pi$$

$$\text{أي: } x_1 = \frac{\pi}{2} \text{ أو } x_2 = \frac{3\pi}{2} \text{ أو } x_3 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{التأطير (ب): } -1 \leq \frac{1}{4} + 2k < 2 \text{ يعني } -\pi \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi$$

$$\text{يعني } -1 - \frac{1}{4} \leq 2k < 2 - \frac{1}{4} \text{ يعني } -\frac{5}{4} \leq 2k < \frac{7}{4} \text{ يعني } -\frac{5}{8} \leq k < \frac{7}{8}$$

$$\text{اذن: } k=0 \text{ ومنه: نعوض } k \text{ ب } 0 \text{ فنجد: } x_4 = \frac{\pi}{4}$$


$$\text{(ج) نقوم بعملية التأطير: } -\pi \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi$$

$$\text{يعني } -1 - \frac{3}{4} \leq 2k < 2 - \frac{3}{4} \text{ يعني } -1 - \frac{3}{4} \leq 2k < 2 - \frac{3}{4} \text{ يعني } -\frac{7}{4} \leq k < \frac{5}{4}$$

$$\text{اذن: } k=0 \text{ ومنه: نعوض } k \text{ ب } 0 \text{ فنجد: } x_5 = \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{وبالتالي: } S = \left\{ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\}$$

أنظر الدائرة المثلثية:




IV. متراجحات مثلثية:

حل هذه المتراجحات اعتمادا على الدائرة المثلثية و مثل على الدائرة المثلثية حلول المتراجحة:

مثال 1: حل في المجال $[0, 2\pi[$ المتراجحة: $\sin x \geq \frac{1}{2}$

$$\text{الجواب: } \sin x \geq \frac{1}{2} \text{ يعني } \sin x \geq \sin \frac{\pi}{6}$$


$$S = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$$



تمرين 4: حل في المجال $]-\pi, \pi[$ المتراجحة:

$$\sin x \leq -\frac{1}{2}$$


$$\text{الجواب: } S = \left[-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right]$$



مثال 2: حل في المجال $]-\pi, \pi[$ المتراجحة:

الجواب:

$$S = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$$



$$\text{ومنه: نعوض } k \text{ ب } 1 \text{ في } -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ فنجد: } x_1 = -\frac{2\pi}{3} + 2 \times 1 \times \pi$$

$$\text{أي: } x_2 = \frac{4\pi}{3} \text{ وبالتالي: } S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}$$

$$\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ يعني } \sin x = -\sin \frac{\pi}{4} \text{ يعني } \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2)$$

$$\text{لأن: } \sin(-x) = -\sin x$$

$$\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \text{ يعني } x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ أو } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\text{نقوم بالتأطير (أ): } 0 \leq -\frac{\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi \text{ يعني } 0 \leq -\frac{1}{4} + 2k < 2$$

$$\text{يعني } \frac{1}{4} \leq 2k < 2 + \frac{1}{4} \text{ يعني } \frac{1}{8} \leq k < \frac{9}{8} \text{ اذن: } k=1$$

$$\text{ومنه: نعوض } k \text{ ب } 1 \text{ فنجد: } x_1 = \frac{7\pi}{4} \text{ أي } x_1 = -\frac{\pi}{4} + 2 \times 1 \times \pi$$

$$\text{(ب) نقوم بنفس عملية التأطير: } 0 \leq \frac{5\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi \text{ يعني } 0 \leq \frac{5}{4} + 2k < 2$$

$$\text{يعني } 0 \leq \frac{5}{4} + 2k < 2 \text{ يعني } -\frac{5}{4} \leq 2k < 2 - \frac{5}{4} \text{ يعني } -\frac{5}{8} \leq k < \frac{3}{8}$$

$$\text{اذن: } k=0 \text{ ومنه: نعوض } k \text{ ب } 0 \text{ فنجد: } x_2 = \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{وبالتالي: } S = \left\{ \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}$$

III. معادلات خاصة:

$x = 2k\pi$	تكافئ	$\cos x = 1$	
$k \in \mathbb{Z}$	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$	تكافئ	$\cos x = 0$
$x = (2k+1)\pi$	تكافئ	$\cos x = -1$	
$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	تكافئ	$\sin x = 1$	
$(k \in \mathbb{Z})$	$x = k\pi$	تكافئ	$\sin x = 0$
$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$	تكافئ	$\sin x = -1$	

مثال: حل في $[0, 3\pi]$ معادلة $\sin x = 0$

الجواب: $\sin x = 0$ يعني $x = k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

نقوم بالتأطير: $0 \leq k\pi \leq 3\pi$ يعني $0 \leq k \leq 3$

اذن: $k=0$ أو $k=1$ أو $k=2$ أو $k=3$

ومنه: نعوض k بهذه القيم فنجد:

$$x_0 = 0 \times \pi \text{ أو } x_1 = 1 \times \pi \text{ أو } x_2 = 2 \times \pi \text{ أو } x_3 = 3 \times \pi$$

$$\text{أي: } x_0 = 0 \text{ أو } x_1 = \pi \text{ أو } x_2 = 2\pi \text{ أو } x_3 = 3\pi$$

$$\text{وبالتالي: } S = \{0; \pi; 2\pi; 3\pi\}$$

تمرين 3: حل في ال $]-\pi, 2\pi[$ معادلة $\cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0$

ومثل الحلول على الدائرة المثلثية

$$\text{الجواب: } \sqrt{2} \sin x - 1 = 0 \text{ أو } \cos x = 0 \text{ يعني } \cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0$$

$$\text{يعني } \cos x = 0 \text{ أو } \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{يعني } x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ أو } \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{يعني } x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ أو } x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \text{ أو } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \text{ أو } x = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\text{نقوم بالتأطير (أ): } -\pi \leq \frac{\pi}{4} + k\pi < 2\pi \text{ يعني } -\pi \leq \frac{1}{4} + k < 2$$

$$\text{يعني } -1 - \frac{1}{4} \leq k < 2 - \frac{1}{4} \text{ يعني } -\frac{5}{4} \leq k < \frac{7}{4}$$

$$\text{اذن: } k=0 \text{ أو } k=1 \text{ أو } k=-1$$

تمرين 7: مثلث بحيث: $\hat{A} = \frac{\pi}{4}$ و $\hat{B} = \frac{\pi}{3}$ و $BC = 4cm$

أحسب: \hat{C} و $AC = b$ و AC

أجوبة: (1) حساب \hat{C} لدينا: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi$ يعني $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + \hat{C} = \pi$

يعني $\hat{C} = \pi - \frac{3\pi}{12} - \frac{4\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$ يعني $\hat{C} = \frac{5\pi}{12}$

(1) حساب AC

لدينا: $\frac{4}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{b}{\sin \frac{\pi}{3}}$ يعني $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}}$

يعني $4 \times \sin \frac{\pi}{3} = AC \times \sin \frac{\pi}{4}$ يعني $AC = \frac{4 \times \sin \frac{\pi}{3}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{6}$

تمرين 8: حل في المجال $[-\pi, \pi]$ معادلة: $2 \sin 2x - 1 = 0$

الجواب: $2 \sin 2x - 1 = 0$ يعني $\sin 2x = \frac{1}{2}$ يعني

$\sin 2x = \sin \frac{\pi}{6}$ يعني $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ أو $2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

يعني $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ أو $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ ونقوم بالتأطير ونجد:

$$S = \left\{ -\frac{11\pi}{12}; -\frac{7\pi}{12}; \frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12} \right\}$$

تمرين 9: حل في المجال \mathbb{R} معادلة: $(\sin x)^2 + \sin x - 2 = 0$

الجواب: نضع: $X = \sin x$ والمعادلة تصبح: $X^2 + X - 2 = 0$

نحسب المميز: $\Delta = 1 + 4 = 5$ و $a = 1$ و $b = 1$ و $c = -2$

$\Delta > 0$ فان هذه المعادلة لها حلين هما: $X_1 = \frac{-1+3}{2 \times 1} = 1$ أو $X_2 = \frac{-1-3}{2 \times 1} = -2$ ومنه

بالرجوع للمتغير الأصلي نجد:

$\sin x = 1$ أو $\sin x = -2$


نلاحظ أن المعادلة الثانية ليس لها حل في $[-\pi, \pi]$

اذن فقط نحل المعادلة: $\sin x = 1$ (معادلة خاصة)

$\sin x = 1$ يعني: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ومنه: $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

تمرين 5: حل في المجال: $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ المتراجحة: $\cos x \leq \frac{1}{2}$

الجواب: $S = \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right]$



تمرين 6: حل في المجال: $[-\pi, \pi]$ المتراجحات: (1) $\cos x \leq 0$

(2) $\sin x \geq 0$ (الأجوبة: $S = [0, \pi]$)

مثال 3: حل في المجال: $S = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ المتراجحة: $\tan x \geq 1$

الجواب: $S = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$

V. علاقات sin في مثلث:

مثلث بحيث: $BC = a$ و $AC = b$ و $AB = c$

نفترض أن ABC قائم الزاوية في A اذن: $\sin \hat{A} = 1$ ومنه:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = a$$

ولدينا كذلك: $\sin \hat{B} = \frac{b}{a} \Leftrightarrow a = \frac{b}{\sin \hat{B}}$

ولدينا كذلك: $\sin \hat{C} = \frac{c}{a} \Leftrightarrow a = \frac{c}{\sin \hat{C}}$

وبالتالي نجد: $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$

وهذه النتيجة تبقى صحيحة بالنسبة لمثلث عادي:

خاصية: إذا كان ABC مثلث بحيث: $BC = a$ و $AC = b$ و $AB = c$

فان: $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$