


1.5 ن

0.5 ن

1 ن

1.5 ن

1 ن



1.5 ن

1 ن

1.5 ن

### التمرين الأول: (5.5 نقط)

نعتبر المثلث  $ABC$  (انظر الشكل جانبه)  $ABC$

1) احسب  $\cos \hat{BAC}$  ثم  $\sin \hat{BAC}$

2) بين أن:  $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 1$

3) نقطة  $D$  من المستوى بحيث:  $\overline{AD} = \frac{1}{3}\overline{AB} + \frac{1}{6}\overline{AC}$

أ) احسب:  $\overline{AD} \cdot \overline{AC}$

ب) بين أن:  $(AC) \perp (DB)$

4) لتكن  $I$  منتصف القطعة  $[BC]$ . احسب المسافة:  $AI$

### التمرين الثاني: (4 نقط)

$ABC$  مثلث . ننشئ خارجه مربعين (انظر الشكل)

1) بين أن:  $\overline{CA} \cdot \overline{CB} = -\overline{CD} \cdot \overline{CE}$

2) بين أن:  $(EB) \perp (AD)$

3) بين أن:  $AD = EB$

### التمرين الثالث: (7 نقط)

نعتبر الدالتين:  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  و  $g(x) = \frac{-x-7}{x+1}$

1) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة:  $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$  (لاحظ أن 1 حل خاص للمعادلة)

2) بين أنه لكل  $x \neq -1$  لدينا:  $f(x) = g(x)$  تكافئ:  $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$

3) أنشئ منحنى كل من  $f$  و  $g$  في نفس المعلم المتعامد الممنظم  $(0; \vec{i}; \vec{j})$

4) حل مبيانيا المتراجحة:  $f(x) \leq g(x)$

1.5 ن

1 ن

3 ن

1.5 ن

### التمرين الرابع: (3.5 نقط)

نعتبر الدالة المعرفة بمايلي:  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

1) تحقق من أن الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$

2) أ- بين أن الدالة  $f$  تزايدية على المجال  $]-\infty; 0]$

ب- بين أن الدالة  $f$  تناقصية على المجال  $[0; +\infty[$

3) ضع جدول تغيرات  $f$  على  $\mathbb{R}$

4) بين أن الدالة  $f$  تقبل قيمة قصوى على  $\mathbb{R}$  حددها.

0.5 ن

0.75 ن

0.75 ن

0.5 ن

1 ن