

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة : العلوم الفيزيائية	المستوى : جذع مشترك علمي
رقم المقرر : 1	الدورة : الثانية
المؤسسة : ثانوية بلال بن رباح التأهيلية - تمارة	أستاذ المادة : مصطفى قشيش

فيزياء (6 نقط)نعتبر رموز الذرات التالية: O_{16}^{35} و H_1^{17} و Cl_{17}^{35} .

- 1) حدد، مع التعليل، عدد الكترونات كل ذرة.
 2) اكتب البنية الإلكترونية لكل ذرة، ثم استنتج القاعدة (الثانية أو الثمانية) التي تطبق على كل ذرة لتحقيق الاستقرار.
 3) جد مع التعليل، رقم المجموعة التي يتبعها عنصر الكلور في الجدول الدوري البسيط ، ثم أعط اسمها.
 4) مثل حسب نموذج لويس الجزيئين التاليين : H_2O (للماء) و Cl_2 (لثاني الكلور).
 5) ارسم تمثيل كرام لجزيئ ثائي كلورو ميثان CH_2Cl_2 .

فيزياء 1 (7 نقط)

يمثل الشكل جانبه عارضة متGANة AB مركز ثقلها G وكتلتها $m = 0,6 \text{ kg}$ وطولها L ، قابلة للدوران حول محور (Δ) أفقي وثابت وعمودي على العارضة، يمر من النقطة O بحيث $OG = \frac{L}{4}$. ثبت عند الطرف A نابضا ذي لفات غير متصلة وثابتة صلابته هي k . عندما تكون العارضة في توازن، فإنها تكون الزاوية $\alpha = 45^\circ$ مع الخط الشاقولي المار من الطرف B ، ويكون محور النابض أفقيا وإطاليه هي $\Delta l = 10 \text{ cm}$.


$$\text{نأخذ } g = 10 \text{ N.kg}^{-1}.$$

(1) أذكر الشرطين العاميين للتوازن جسم صلب.


(2) اجرد القوى المطبقة على العارضة AB .

(3) بتطبيق مبرهنة العزوم، أثبت أن تعبر شدة القوة التي يطبقها النابض

$$\text{على العارضة هو } T = \frac{mg}{3} \tan(\alpha).$$

(4) احسب الشدة T ، ثم استنتاج k قيمة صلابة النابض.(5) اعتمادا على الخط المضلعى، حدد مميزات القوة \vec{R} المطبقة من طرف المحور (Δ) على العارضة AB .**فيزياء 2 (7 نقط)**

نغم إلكترودين من الغرافيت في كأس تحتوي على محلول مائي للكلورور الحديد II $Fe^{2+} + 2Cl^-$ ، ثم نربطهما بقطبي مولد للتيار المستمر مع إضافة جهاز أمبير متر في الدارة الكهربائية.



(1) صف طبيعة التيار الكهربائي في الفلازات، ثم في الإلكترونات.

(2) أنشئ على ورقة الإجابة، الدارة الكهربائية المحصل عليها، مبرزا عليها منحى الإلكترونات في أسلاك التوصيل ومنحى انتقال الأيونات في محلول المائي.

(3) باعتماد الشكل جانبه، عين شدة التيار الكهربائي الذي يمر في الدارة، ثم أطر شدة التيار المقاسة. نعطي فئة الجهاز هي $X = 1,5$.

(4) احسب قيمة الارتباط النسبي لشدة التيار.

(5) تشتعل الدارة خلال المدة الزمنية $\Delta t = 2 \text{ mn} 40 \text{ s}$ ، جد N عدد أيوناتالحديد II Fe^{2+} ، التي تنتقل في محلول خلال هذه المدة.

$$\text{نعطي : الشحة الابتدائية } C = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ e.}$$

وبالله التوفيق