


مبدأ القصور ومركز القصور**Le principe d'inertie et le centre d'inertie****I - القوة والحركة**

من خلال النشاط 1 يتبين أنه يمكن أن تكون حركة في غياب القوة (مجموع المتجهي للقوى منعدم) وهذا ما توصل إليه غاليليو غاليلي (1564م - 1642م) حيث أثبت أنه بإمكان جسم أن تكون له حركة مستقيمة منتظمة على مستوى أفقي أملس (في غياب الاحتكاكات).

II - إبراز مركز قصور جسم صلب**تجربة 1**


نرسل حامل ذاتي فوق منضدة أفقية ونسجل بواسطة المغبرين كل من حركة A و M .
تحصل على التسجيل التالي :



ملاحظة : حركة النقطة A حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمعلم مرتبط بالأرض .
حركة النقطة M حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمعلم مرتبط بالأرض .

تجربة 2

نرسل الحامل الذاتي بطريقة عشوائية فوق المنضدة ونسجل كل من حركتي النقطتين A و M .
تحصل على التسجيل التالي



ملاحظة : حركة النقطة M حركة منحنية .

حركة النقطة A حركة مستقيمة منتظمة .

* إذا قمنا بإرسال الحامل الذاتي على الوجه الآخر نحصل على نفس النتائج .

استنتاج : هناك نقطة وحيدة تتميز عن باقي النقط الأخرى التي تنتمي إلى الحامل الذاتي تسمى بمركز قصور الحامل الذاتي .

خلاصة :

كل جسم صلب له نقطة واحدة خاصة تسمى مركز القصور ونرمز لها بالحرف G

III - مبدأ القصور**1 - تعريف**

يكون جسم صلب شبه معزول ميكانيكيًا إذا كانت القوى المطبقة عليه متوازنة فيما بينها و في غياب أية قوة نقول أن الجسم معزولاً ميكانيكيًا .

نستنتج من خلال التجربتين 1و 2 أنه عندما يكون الحامل الذاتي شبه معزول ميكانيكيًا فإن حركة مركز قصوره حركة مستقيمية منتظمة .

2 - تعليم : مبدأ القصور (القانون الأول لنيوتن)

عندما يكون الجسم الصلب معزولاً ميكانيكياً (أو شبه معزول) في معلم مرتبط بالأرض فإن متجهة سرعة مركز قصوره G تكون ثابتة $\vec{V}_G = \vec{Cte}$ أي أن الجسم الصلب يكون في إحدى الحالتين :

- إذا كان في حالة سكون فإنه يبقى ساكناً . $\vec{V}_G = \vec{0}$
- إذا كان في حالة حركة فإن حركة مركز قصوره حركة مستقيمية منتظمة .

ملحوظة : لا يتحقق مبدأ القصور إلا بالنسبة للمعلم الغاليلية (عملياً المعلم المرتبطة بالأرض تعتبر معلم غاليلية) نسمى معلمًا غاليليا كل معلم يتحقق فيه مبدأ القصور .

IV - الحركة الإجمالية لجسم صلب

الحركة الإجمالية لجسم صلب هي حركة مركز قصوره G . أما حركة باقي النقط الأخرى التي تنتمي إلى الجسم الصلب فحركة كل نقطة تسمى الحركة الخاصة للجسم .

مثال في التجربة 2 : نرسل الحامل الذاتي فوق منضدة أفقية بطريقة ما : كيف هي الحركة الإجمالية للحامل الذاتي ؟

كيف هي الحركة الخاصة للحامل الذاتي أو الحركة الذاتية للحامل الذاتي ؟

مسار النقطة M دائري مركزه A بما أن الأقواس بين نقطتين متتاليتين متقابلة فيما بينها فإن الحركة منتظمة .

توافق الحركة الإجمالية لجسم صلب معزول (أو شبه معزول) ميكانيكياً حركة مركز قصوره G ، وتكون حركته الخاصة حركة دوران منتظم حول النقطة G .

V - مركز الكتلة

1 - مفهوم مركز الكتلة

مركز الكتلة لمجموعة مادية مكونة من نقاط ذات كتل m_i هي نقطة متميزة G ، يتعلّق موضعها بتوزيع الكتل داخل هذه

$$(1) \quad \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^n \overrightarrow{OA_i}}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

2 - موضع مركز كتلة بعض الأجسام الصلبة

الجسم الصلب المتتجانس هو الذي تتوزع فيه المادة المكونة له بانتظام ، أي أن الكتلة الحجمية ρ لها القيمة نفسها في كل نقطة من نقطه (الكتلة الحجمية ، الكتلة النوعية masse superficielle الكتلة الطولية).

إذا كان للجسم الصلب المتتجانس مركز تمايز ، فإن هذا المركز يتطابق مع مركز كتلته .

أمثلة لحساب مركز الكتلة لمجموعة مادية

نربط اسطوانتين (1) و (2) على التوالي كتلتها $m_1 = 100g$ و $m_2 = 200g$ برابطة متينة ، كتلتها مهملة طولها $\ell = 12cm$ نعتبر أن طرفي الرابطة متطابقين مع G_1 و G_2 مركز قصور الأسطوانتين .


الحل :

نطبق علاقة المرجحية على المجموعة ونعتبر أن C هو مركز الكتلة للمجموعة :

$$\overrightarrow{OC} = \frac{m_1 \overrightarrow{OG_1} + m_2 \overrightarrow{OG_2}}{m_1 + m_2}$$

ما أن $m_2 = 2m_1$ و أن O و G_2 متطابقين فإن العلاقة (2) تصبح

$$G_1 C = \frac{1}{3} \ell \quad \overrightarrow{G_2 C} = \frac{m_1 \overrightarrow{G_2 G_1}}{3m_1}$$



VI - مركز الكتلة ومركز القصور

نستنتج من خلال النشاط 4 أن حركة النقطة G حركة مستقيمية منتظمة وبالتالي فإن مركز الكتلة G يتطابق مع مركز القصور سواء كانت المجموعة غير قابلة للتشويه أو قابلة للتشويه .