

ملخصي وقواعدى فى الرياضيات لمستوى الأولى باك علوم تجريبية
من إنجاز الأستاذ نجيب عثمانى أستاذ مادة الرياضيات فى الثانوى تأهيلى

ملخص درس المنطق

p	\bar{p}
1	0
0	1

الجدول 1

p	q	$q \wedge p$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

الجدول 2

p	q	$q \vee p$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

الجدول 3

P	q	$(p \Rightarrow q)$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

الجدول 4

p	q	$(p \Leftrightarrow q)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

الجدول 5

5) **تكافؤ عبارتين:** تكافؤ عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت العبارتان p و q صحيحتين معاً أو خاطئتين معاً. جدول حقيقة الاستلزم المنطقي هو: **الجدول 5**

العبارة : $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$ تكافئ " $q \Leftrightarrow p$ ".

جدول 5 هو حقيقة التكافؤ المنطقي

خاصية : العبارتان $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$ متكافئتان

الدالة العارية: تسمى دالة عارية كل نص رياضي يحتوي على متغير (أو عدة متغيرات) ينتهي إلى مجموعة معلومة E حيث تصبح عبارة كلما عوضنا المتغير بعنصر من E ونرمز عادة دالة عارية بالرمز $A(x)$ أو

$A(x; y)$ أو $B(x)$

العبارات المكممة: اطلاقاً من الدالة العارية

" $\exists x \in E, A(x)$ " نكون العبارة " $\exists x \in E, A(x)$ ".

ونقرأ : " يوجد على الأقل x من E يحقق الخاصية $A(x)$ " ونكون العبارة

" $\exists x \in E, A(x)$ " صحيحة إذا وجد على الأقل x من E يحقق الخاصية $A(x)$.

انطلاقاً من الدالة العارية $A(x)$ نكون العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ ".

ونقرأ : " مهما يكن x من E يتحقق الخاصية $A(x)$ " لدينا E

وتحتاج العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ " صحيحة إذا كانت جميع عناصر E تحقق الخاصية $A(x)$.

خاصية : نفي العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ " هو

" $\exists x \in E, \neg A(x)$ " لدينا E

وتحتاج العبارة " $\forall x \in E, \neg A(x)$ " صحيحة إذا كان x هو العبرة

" $\exists x \in E, A(x)$ " نفي العبارة " $\exists x \in E, A(x)$ " هو العبرة

" $\forall x \in E, \neg A(x)$ ".

العبارات: نسمى عبارة كل نص رياضي يحمل معنى يكون إما صحيحاً وإما خاطئاً ونرمز عادة لعبارة بأحد الرموز p أو q أو r غالباً ما نعبر عن حقيقة عبارة بجدول يسمى جدول حقيقة عبارة: الرمز 1 يعني أن العبارة p صحيحة و الرمز 0 يعني أن العبارة p خاطئة

العمليات على العبارات:

1) **نفي عبارة:** نرمز لنفي العبارة p بالرمز $\neg p$ ونكون صحيحة إذا كانت p خاطئة و تكون خاطئة إذا كانت p صحيحة

و جدول حقيقة عملية النفي هو: **الجدول 1**

2) **عطف عبارتين:** عطف عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \wedge q)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت العبارتان p و q صحيحتين معاً

و جدول حقيقة العطف المنطقي هو: **الجدول 2**

3) **فصل عبارتين:** فصل عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \vee q)$ والتي تكون خاطئة فقط إذا كانت العبارتان p و q خاطئتين معاً

و جدول حقيقة الفصل المنطقي هو: **الجدول 3**

4) **استلزم عبارتين:** استلزم عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \Rightarrow q)$ والتي تكون خاطئة فقط إذا كانت p صحيحة و q خاطئة

و جدول حقيقة الاستلزم المنطقي هو: **الجدول 4**

ملاحظات: العبارة: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ تتنزّل q أو " اذا كانت p فان q ".

العبارة: $(q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg q \vee p)$ تسمى الاستلزم العكسي

للاستلزم $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ للبرهان أن العبارة: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ صحيحة ففترض

أن العبارة p صحيحة و نبين أن العبارة q صحيحة

نتيجة: العبارتان $(q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg q \vee p)$ و $(\neg p \vee q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q)$

2) الاستدلال بالمثال المضاد :

مثال: بين العبارة التالية خاطئة مع تعليم الجواب:

$$x = -2 \quad \text{الجواب: } p \quad \text{نعتبر: } x + \frac{1}{x} \geq 2$$

$$\text{لدينا: } 2 < 2 \quad \text{اذن: } p \text{ خاطئة}$$

3) الاستدلال بالاستلزم المضاد للعكس

لكي نبرهن أن الاستلزم $(p \Rightarrow q)$ صحيح يكفي أن نبرهن أن

الاستلزم المضاد للعكس $(\neg q \Rightarrow \neg p)$ صحيح

الاستدلالات الرياضية.

1) الاستدلال الاستنتاجي :

$$2 < x < 4 \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1 \quad \text{مثلاً: } \text{ليكن } x \in \mathbb{R} \text{ بين أن: } 2 < x < 4$$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1 \quad \text{الأوجية: } \text{نفترض أن: } 2 < x < 4 \quad \text{و نبين أن: } \frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1$$

$$2 - 1 < x - 1 < 4 - 1 \quad \text{لدينا: } 1 < x - 1 < 3$$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1 \quad \text{اذن: } 1 < x - 1 < 3$$

$$2 < x < 4 \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1 \quad \text{و منه: } 2 < x < 4$$

المراحلة 2: نفترض أن: $3^n \geq 1 + 2n$ صحيحة

المراحلة 3: نبين أن:

$$\text{؟؟} 3^{n+1} \geq 2n + 3 \quad \text{أي نبين أن: } 3^{n+1} \geq 1 + 2(n+1)$$

لدينا حسب افتراض الترجمة :

$$3^n \times 3 \geq 3 \times (1 + 2n) \quad \text{اذن: } 3^n \geq 1 + 2n$$

يعني : $3^{n+1} \geq 6n + 3$ اذن لم نجد بعد النتيجة

نلاحظ أن : $6n + 3 \geq 2n + 1$ (يمكن حساب الفرق)

$$(6n + 3) - (2n + 1) = 6n + 3 - 2n - 1 = 4n + 2 \geq 0$$

لدينا اذن : $6n + 3 \geq 2n + 1$ و منه : $3^{n+1} \geq 6n + 3$

مثال 2: بين بالترجم أن: $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$

الجواب : نمر بثلاث مراحل : **المراحلة 1:** تتحقق أن العبارة صحيحة

بالنسبة ل $n = 1$

$$\text{لدينا } n = 1 \quad \text{و منه العبارة صحيحة بالنسبة ل } n = 1$$

المراحلة 2: نفترض أن: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$ صحيحة

المراحلة 3: نبين أن: $1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1) \times (n+2)}{2}$

$$\text{لدينا: } 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (n+1)$$

ولدينا حسب افتراض الترجم : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n \times (n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right)$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

لدينا اذن : $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$

مثال 3: (1) نبين أن: $11^{n+1} - 1 = 10 \times 11^n + 11^n$

(2) بين باستعمال الاستدلال بالترجم أن: $11^n - 1$ مضاعف للعدد 10

الجواب : (1): $11^{n+1} - 1 = 11 \times 11^n - 1 = 10 \times 11^n + 11^n - 1 = (10+1) \times 11^n - 1 = 10 \times 11^n + 11^n - 1$

(2) يعني نبين : $\exists k \in \mathbb{N} / 11^n - 1 = 10k$

نستعمل الاستدلال بالترجم و نمر بثلاث مراحل :

المراحلة 1: تتحقق أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$

لدينا $1 - 1 = 0$ مضاعف للعدد 10

و منه العبارة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$

المراحلة 2: نفترض أن: $\exists k \in \mathbb{N} / 11^n - 1 = 10k$ صحيحة

المراحلة 3: نبين أن: $\exists k' \in \mathbb{N} / 11^{n+1} - 1 = 10k'$

نعلم حسب (1) $11^{n+1} - 1 = 10 \times 11^n + 11^n - 1$

ولدينا حسب افتراض الترجم : $11^{n+1} - 1 = 10k$

اذن: $11^{n+1} - 1 = 10 \times 11^n + 10k$

اذن: $11^{n+1} - 1 = 10(11^n + k)$ مع $k' = 11^n + k$

و منه: $11^{n+1} - 1 = 10 \times 11^n + 10k$ مضاعف للعدد 10

وبالتالي: $11^{n+1} - 1 = 10 \times 11^n + 10k$ مضاعف للعدد 10

مثال: لتكن $x \in \mathbb{R}$ و $y \in \mathbb{R}$ بين أن: $x + y > 1 \Rightarrow y > \frac{1}{2} - x$

الجواب : نستعمل الاستدلال بالاستلزم المضاد للعكس

اذن يكفي أن نبين أن: $x + y \leq 1 \Rightarrow y \leq \frac{1}{2} - x$

لدينا: $x + y \leq 1 \Rightarrow x \leq 1 - y$ اذن: $y \leq \frac{1}{2} - x$

و منه: $x + y > 1 \Rightarrow y > \frac{1}{2} - x \Rightarrow y > \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x$ وبالتالي: $y > \frac{1}{2}$

(4) الاستدلال بالتكافؤ:

\Leftrightarrow يعتمد الاستدلال بالتكافؤ على القانون المنطقي التالي : إذا كان : $(q) \Leftrightarrow (p)$

مثال: بين أن: $\forall (a;b) \in (\mathbb{R}^{++})^2 : a+b \geq 2\sqrt{ab}$

الجواب : نستعمل الاستدلال بالتكافؤ:

$a+b \geq 2\sqrt{ab} \Leftrightarrow a+b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{ab} \geq 0$

$\Leftrightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$

وهذا صحيح لأن المربع دائمًا موجب

$\forall (a;b) \in (\mathbb{R}^{++})^2 : a+b \geq 2\sqrt{ab}$ وبالتالي :

(5) الاستدلال بفصل الحالات :

مثال: باستعمال الاستدلال بفصل الحالات: حل في \mathbb{R} المعادلة : $|3x - 6| = 1$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$ 3x - 6 $	-	0	+

الجواب : ندرس اشاره : $3x - 6$

(E): إذا كانت: $2 \geq x$ فان: $3x - 6 \geq 0$ و منه: $3x - 6 = 1 \Leftrightarrow$

$$x = \frac{7}{3} \in S \Leftrightarrow 3x = 7 \Leftrightarrow 3x - 6 = 1 \Leftrightarrow$$

(E): إذا كانت: $2 \leq x$ فان: $3x - 6 \leq 0$ و منه: $3x - 6 = 1 \Leftrightarrow$

$$x = \frac{5}{3} \in S \Leftrightarrow -3x = -5 \Leftrightarrow -3x + 6 = 1 \Leftrightarrow -(3x - 6) = 1 \Leftrightarrow$$

و منه مجموعة الحلول هي : $S = \left\{ \frac{5}{3}; \frac{7}{3} \right\}$

(6) الاستدلال بالخلف :

لكي نبرهن أن عبارة صحيحة نفترض أن العبارة خاطئة ونحاول الحصول على تناقض مع المعطيات

مثال: بين باستعمال الاستدلال بالخلف أن: $\forall x \in \mathbb{R} / \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \neq 1$

الجواب : نفترض أن: $\exists x \in \mathbb{R} / \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$

يعني $x^2 - 1 = x^2 + 1 \Rightarrow 0 = 2$ وهذا غير صحيح

و منه ما افترضناه كان خطأنا أي: $\forall x \in \mathbb{R} / \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \neq 1$

(7) الاستدلال بالترجم :

لتكن $p(n)$ عبارة مرتبطة بعدد صحيح طبيعي n

لكي نبرهن أن العبارة $p(n)$ صحيحة :

نمر بثلاث مراحل :

• تتحقق أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$

• نفترض أن العبارة صحيحة بالنسبة ل n

• نبين أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $n + 1$

مثال 1: بين باستعمال الاستدلال بالترجم أن: $\forall n \in \mathbb{N}; 3^n \geq 1 + 2n$

الجواب : نمر بثلاث مراحل :

المراحلة 1: تتحقق أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $0 = 1$

لدينا $0 = 1 \geq 1 + 2 \times 0 = 0$ أي: $1 \geq 1 + 2 \times 0 = 0$ ومنه العبارة صحيحة بالنسبة ل $0 = 1$