

التمرين الأول: (10 نقط)

- 0.5 ن -1 هل العبارة: $(\exists x \in \mathbb{R}): x > x^2$ صحيحة أم خاطئة؟ علل جوابك.
- 0.5 ن -2 أعط نفي العبارة: $(\forall A > 0)(\exists \alpha > 0): x > \alpha \Rightarrow x^2 \in]A; +\infty[$
- 1 ن -3 بين أن: $\sqrt{x^2 - 3x + 5} \neq \sqrt{y^2 - 3y + 5} \Rightarrow (y \neq x \text{ و } y \neq 3 - x)$. حيث x و y عددين من \mathbb{R}
- 1 ن -4 حل في \mathbb{R} المعادلة: $2(E(x))^2 - 3E(x) = -1$
- 1 ن -5 أثبت أن: $(\forall a \geq 0)(\forall b \geq 0): \sqrt{a} + \sqrt{b} - 1 = \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow a = b = 1$
- 1 ن -6 بين أن: 6 يقسم العدد $5n^3 + n$ لكل n من \mathbb{N}^*
- 1.5 ن -7 بين أنه لكل n من \mathbb{N}^* لدينا: $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
- 1.5 ن -8 حل في \mathbb{R} المتراجحة: $3x - 1 \leq \sqrt{x+3}$
- 1 ن -9 بين أن: $(\forall (a; b; c) \in \mathbb{R}^3): \left| \frac{a+b}{2} \right| + \left| \frac{a-b}{2} \right| < c \Rightarrow (|a| < c \text{ و } |b| < c)$
- 1 ن -10 برهن أن: $(\forall x \geq 1)(\forall y \geq 1): \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} \leq \sqrt{xy}$

التمرين الثاني: (2.5 نقط)

- 0.5 ن -1 بين أن: $\forall a \in \mathbb{R}^+; \forall b \in \mathbb{R}^+: a + b \geq 2\sqrt{ab}$
- 0.5 ن -2 بين أن: $(\forall a > 1): \frac{a^2}{a-1} \geq 4$
- 1.5 ن -3 استنتج أن: $(\forall x > 1)(\forall y > 1): \frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 8$

التمرين الثالث: (7.5 نقط)

لتكن f و g الدالتين العدديتين للمتغير الحقيقي x المعرفتين بما يلي:

$$g(x) = \frac{2x-1}{x+1} \quad \text{و} \quad f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$$

- 2 ن -1 ضع جدول تغيرات كل من f و g .
- 1 ن -2 بين أن الدالة f مكبورة بالعدد 1.
- 0.5 ن -3 حدد صورة المجال $[-1; 0]$ بالدالة f .

4 ن -4 لتكن h الدالة العددية المعرفة بما يلي: $h(x) = \frac{2x^2 - 8x + 6}{x^2 - 4x}$

1 ن أ- حدد مجموعة تعريف الدالة h .

1 ن ب- تحقق من أن: $(\forall x \in D_h): h(x) = g \circ f(x)$

2 ن ج- ادرس تغيرات الدالة h على كل من المجالات: $]-\infty; 0[$ و $]0; 2[$ و $]2; 4[$ و $]4; +\infty[$.