Talamidi.com تم تحميل هذا الملف من موقع

المحاليل الإلكتروليتية و التراكيز
Les solutions électrolytiques et les concentrations

1- الجسم الصلب الأيوني : solide ionique

✹ تتكون بلورات كلورور الصوديوم NaCl من ايونات الصوديوم Na^+ و ايونات الكلورور Cl^-
✹ كل ايون سالب (-) محاط بستة ايونات موجبة (-) و كل اليون (+) موجب محاط بستة ايونات سالبة (-)
✹ بفعل قوى التجاذب الكهربائي المتكافئة بين (-) و (+) يكون الجسم الصلب الأيوني متعادلا كهربائيا و مُتماسكا.



2- الجزيئة القطبية Molécule polaire

بفعل الروابط التساهمية بين الذرات تتشكل الجزيئات ، حيث تشرك كل ذرة إلكترونا واحدا من إلكترونات التكافؤ (من طبقاتها الخارجية)

الذرتان المرتبطتان متشابهتان	الزوج الإلكتروني يتموضع على نفس المسافة بينهما : جزيئة غير قطبية
الذرتان المرتبطتان غير متشابهتان	إحداهما تجذب الزوج الإلكتروني أكثر من الآخر : الجزيئة قطبية



قدرة جذب عنصرللزوج الإلكتروني للرابطة التي يشارك فيها تسمى الكهرسلبية L'électronégativité
في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية ،
تتزايد الكهرسلبية من اليسار إلى اليمين في كل دورة من الجدول الدوري
تتزايد الكهرسلبية من الأسفل إلى الأعلى في كل عمود من الجدول الدوري



3- المحاليل المائية الإلكتروليتية – Solutions aqueuses électrolytiques

✹عندما نذيب جسما أيونيا في الماء ، نحصل على محلول أيوني يحتوي على أيونات (كاتيونات (+) و أنيونات (-)) و يكون دائما متعادلا كهربائيا
⬅ نسمي هذا المحلول الأيوني محلولا إلكتروليتيا لانه يسمح بمرور التيار الكهربائي
⬅نسمي الجسم الأيوني المذاب إلكتروليتا مثل $NaCl$
✹مراحل ذوبان الكتروليت

مرحلة التفكك	مرحلة التمييه	مرحلة التشتت
		

✹ معادلة ذوبان الكتروليت

بصفة عامة

$$AB \xrightarrow{\text{ماء}} A^+_{(aq)} + B^-_{(aq)}$$

الكتروليت صلب او سائل او غاز

- معادلة ذوبان HCl في الماء : $HCl_{(g)} \xrightarrow{\text{ماء}} H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$
- معادلة ذوبان NaCl في الماء : $NaCl \xrightarrow{\text{ماء}} N_a^+ + Cl^-$
- معادلة ذوبان H_2SO_4 في الماء: $H_2SO_{4(aq)} \xrightarrow{\text{ماء}} 2H^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$

4- التراكيز المولية – Les concentrations molaires

التركيز المولي للمذاب المستعمل	التركيز المولي للأيونات المتواجدة بالمحلول
يساوي التركيز المولي C لمذاب X ، نسبة كمية مادته n(X) لهذا المذاب على الجسم V للمحلول . نكتب : $C = \frac{n(X)}{V}$	يساوي التركيز المولي الفعلي $[X]$ لأيون X في محلول ، نسبة كمية المادة n(X) لهذا الأيون في المحلول على الحجم V للمحلول . نكتب : $[X] = \frac{n(X)}{V}$ مثال : $X_\alpha Y_\beta \rightarrow \alpha\, X^{\beta+}_{(aq)} + \beta\, Y^{\alpha-}_{(aq)}$ $[X] = \frac{\alpha . x_{max}}{V}$; $[Y] = \frac{\beta . x_{max}}{V}$

العلاقة بين التركيز المولي C(X) و التركيز الكتلي $C_m(X)$ حيث M(X) الكتلة المولية

$$C(X) = \frac{C_m(X)}{M(X)}$$

انتهى