


تم تحميل هذا الملف من موقع Talamidi.com
الوحدة الثانية، الفصل الثاني: تعبير الخبر الوراثي

الوثيقة 1: التحول البكتيري عند Escherichia coli

يعطي الشكل أسفله ملاحظة الكترولوغرافية لبكتيريا E.coli مع رسم تخطيطي توضيحي لبنية هذه البكتيريا



نقوم بتجربة عند إحدى الكائنات الحية التي لها بنية بسيطة ودورة نمو قصيرة زمنيا مثل بكتيريا Echerichia-Coli (الشكل أمامه).


E.coli هي بكتيريا تكون عادة حساسة للمضاد الحيوي سترپتومييسين Streptomycine Antibiotique، ويصطلح على تسميتها Strep S.

التجربة الأولى:

◀ نزرع بكتيريا حساسة للسترپتومييسين (Strep S) في وسط أدنى (أملاح معدنية + غراء + سكر) = (Mm) بدون سترپتومييسين (علبة بيتري 1).

◀ نحضن هذه البكتيريات في حرارة 37°C لعدة ساعات، فنلاحظ ظهور مستعمرات بكتيرية (colonie) = (لمات بكتيرية clone).

◀ بعد ذلك، تم تشتيلها (نقلها) إلى أوساط مختلفة كما هو مبين على الوثيقة أسفله:



- 1) انطلاقا من معطيات هذه التجربة، أعط تعريفا للمة.
- 2) صف هذه التجربة، ثم حدد ما هو المشكل الذي تطرحه هذه النتائج؟
- 3) اقترح تفسيرا لنتائج هذه التجربة.

التجربة الثانية:

نضع بكتيريا Strep S غير قادرة على العيش في وسط لا يحتوي على اللاكتوز (Lactose). وتتطلب هذه البكتيريا هذا الأخير للعيش ولهذا يرمز إليها ب (Lac⁻)، اذن هذه البكتيريا سيرمز إليها ب (Strep s , Lac⁻). إذا تتبعنا هذه التجارب فإننا نحصل بالإضافة للبكتيريا المذكورة سابقا على أنواع أخرى والتي هي: (Strep r , Lac⁻) ، (Strep r , Lac⁺) ، (Strep s , Lac⁺).

- 4) ماذا تستنتج من تحليل معطيات التجربة الثانية؟
- 5) اربط بين نتائج التجربتين وبنية جزيئة ADN ثم استخلص مفهوم المورثة Le gène ومفهوم الحليل.

الوثيقة 2: تجربة Beadle و Tatum 1941.

قصد الكشاف عن العلاقة صفة - بروتين - مورثة، تعمل على استثمار معطيات تجربة Beadle و Tatum: النوروسبورا *Neurospora* عفن مجهري على شكل غزل فطري، ينمو عادة على الخبز. يمكن للسلسلة المتوحشة أن تعيش في وسط أدنى يحتوي على سكر + ماء + أملاح الأمونيوم. بينما توجد سلالة طافرة غير قادرة على العيش في هذا الوسط.

نقوم بزرع السلالة الطافرة في وسط أدنى + الحمض الأميني التريبتوفان *L'acide aminé Tryptophane* فنلاحظ أن هذه السلالة قادرة على العيش والتكاثر في هذا الوسط وحده.

(1) ماذا تستنتج من هذه التجربة؟




يتم تركيب التريبتوفان عبر سلسلة من التفاعلات الأنزيمية، يمكن تلخيصها فيما يلي:




(2) ماذا تستخلص إذا علمت أن بعض السلالات الطافرة يكتفيها وجود حمض أنترانيليك في الوسط لكي تعيش وتتكاثر؟

الوثيقة 3: فقر الدم المنجلي *L'anémie falciforme*.

الخضاب الدموي *L'hémoglobine*، بروتين يوجد داخل الكريات الحمراء وله دورين: دور وظيفي يتجلى في نقل الغازات التنفسية، ودور بنيوي يتجلى في إعطاء الشكل الكروي المقعر للكريات الحمراء. فقر الدم المنجلي مرض استقلابي ناتج عن تركيب خضاب دموي غير عادي (تشوه الكريات الحمراء تصبح منجلية الشكل) يرمز له ب (HbS)، بينما يرمز لخضاب الدم العادي ب (HbA). أنظر الشكل أ. عند تحرير (HbS) للأوكسيجين يصبح الخضاب غير دوام ويترسب على شكل ابر تشوه مظهر الكريات الحمراء التي تفقد ليونتها وتسد الشعيرات الدموية، مما ينتج عنه فقر في إمداد الخلايا بالأوكسيجين. (الشكل ب والشكل ج)




يعطي الشكل د تسلسل الأحماض الأمينية المكونة لجزء من جزيئة الخضاب الدموي مع جزء من المورثتين المتحكمتين في تركيبهما.



(1) قارن سلسلتي HbA و HbS من جهة ومورثة HbA و HbS من جهة أخرى.
(2) ماذا تستنتج؟

الوثيقة 4: الكشف عن الوسيط بين النواة والسيتوبلازم.



الشكل أ

أزرق

وردي


تضم الخلايا جزئيات يقارب تركيبها الكيميائي تركيب ADN، وتسمى ARN. نكشف عن تموضع الجزئيتين معا في خلايا البنكرياس التي تنتج كمية كبيرة من البروتينات، باستعمال خليط من ملونين: أخضر الميتيل الذي يلون ADN بالأزرق المخضر، والبيرونين الذي يلون ARN بالوردي. أنظر الشكل أ من الوثيقة.

كما يمكن أن يضاف إلى وسط زرع الخلايا مكون نوعي لجزئية ARN مشع، ثم نلاحظ تطور الإشعاع داخل الخلية، فنحصل على النتائج المبينة على الشكل ب من الوثيقة:

a: صورة إشعاعية ذاتية لخلية زرعت مدة 15min بشير مشع نوعي لـ ARN.

b: صورة إشعاعية ذاتية لخلية مماثلة عرضت مدة 15min لنفس البشير المشع، ثم زرعت مدة 1h 30min في وسط يحتوي على بشائر أخرى عادية (غير مشعة).

تمثل النقطة السوداء في الصور أمكنة وجود ARN المشع.




الشكل ب

ماذا تستنتج من هذه المعطيات التجريبية؟ حدد الخاصية المميزة لـ ARN معللا نعتة بـ ARN الرسول.

الوثيقة 5: تجربة تركيب البروتينات في الزجاج.

انطلاقا من عصيات كولونية نعد مستخلصا يحتوي على جميع المكونات السيتوبلازمية اللازمة لتركيب البروتينات، ماعدا ADN. بعد ذلك نضيف لهذا المستخلص كميتين من ARNm وأحماض أمينية، خلال فترتين مختلفتين.



يعطي المبيان أمامه، تطور كمية ARNm والأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات بعد كل حقن لـ ARNm وأحماض أمينية. ماذا تستنتج من تحليل معطيات هذه التجربة؟

الوثيقة 6: مقارنة جزيئة ADN وجزيئة ARN.

تعطي الرسوم التخطيطية أسفله جزء المورثة المسؤولة عن تركيب الخضاب الدموي HbA و جزيئة ARNm المناسب له. انطلاقا من مقارنة الجزئيتين وبالاعتماد على معطيات الوثيقة 7، استنتج بنية جزيئة ARN.

GUGCACCUUACUCCAGAGGAG

ARNm المناسب لـ ADN المسؤول عن تركيب HbA

U = قاعدة ازوتية هي الأوراسيل (Uracile)


GTGCACCTTACTCCAGAGGAG

CACGTGGAATGAGGTCTCCTC

جزء من ADN المسؤول عن تركيب HbA

الوثيقة 10: تجارب Matthaei و Nirenberg (1962):

في بداية الستينات تمكن الباحثون من عزل أنزيم قادر على بلمرنة النيكلوتيدات وتركيب جزيئة مشابهة لجزيئة ARNm (عديد نيكلوتيد اصطناعي)، الشيء الذي مكن Matthaei و Nirenberg من انجاز التجارب التالية: عزل مستخلص خلوي من بكتيريا E. coli يتوفر على كل العناصر السيتوبلازمية اللازمة لتركيب البروتينات (أنزيمات، ريبوزومات، ATP، GTP، و Mg^{2+}) لكن بدون ADN وبدون ARNm.



وضع المحتوى الخلوي تحت حرارة $37^{\circ}C$ في 20 أنبوب اختبار، ثم أضيف لكل أنبوب اختبار 20 حمض أميني. حيث أن كل أنبوب يتميز بكون حمض أميني واحد موسوم بالكربون المشع ^{14}C . بعد ذلك تضاف إلى كل وسط جزيئات ARNm اصطناعية، ذات متتالية نيكلوتيدية معروفة، مثلا متتالية مكونة من نيكلوتيدات لا تحتوي إلا على قاعدة ازوتية واحدة هي الأوراسيل-U- وبذلك يرمز له بـ ARNm Poly U.

في آخر التجربة وسط واحد من هذه الأوساط يظهر سلسلة عديد الببتيد مشعة، هذا الوسط يتميز بتوفره على الحمض الأميني الفينيلالانين.

1) ماذا تستنتج من هذه المعطيات ؟

عندما نستعمل ARNm Poly C نحصل على متتالية من البرولين Pro.

عندما نستعمل ARNm Poly A نحصل على متتالية من الليزين Lys.

عندما نستعمل ARNm Poly GU نحصل على متتالية من حمضين أميين السيسيتين-الفالين Val-Cys.

2) حدد الوحدة الرمزية التي تطابق كل حمض أميني من الأحماض الأمينية التي تكشف عنها هذه التجارب.

الوثيقة 11: جدول الرمز الوراثي Code génétique:

يسمى نظام التطابق بين الوحدات الرمزية التي يحملها ARNm، وبين الأحماض الأمينية التي ترمز لها، بالرمز الوراثي، ويلخص الجدول أسفله، الأحماض الأمينية المقابلة لكل وحدة رمزية.

		الحرف الثاني																			
		U			C			A			G										
الرمز الأول	U	UUU	الفينيلالانين Phe			UCU	Ser سيرين	UAU	تيروزين Tyr		UGU	سيسيتين Cys		U							
		UUC				UCC				UAC			UGC	C							
		UUA	لوسين Leu			UCA				UAA	بدون معنى STOP		UGA	بدون معنى STOP		A					
		UUG				UCG				UAG			UGG	تريبتوفان Trp		G					
	C	CUU	لوسين Leu			CCU	برولين Pro			CAU	هستيدين His		CGU	أرجينين Arg		U					
		CUC								CCC			CAC					CGC	C		
		CUA								CCA			CAA			غلوتامين Gln		CGA	A		
		CUG								CCG			CAG					CGG	G		
	A	AUU	ازولوسين Ileu			ACU	ثريونين Thr			AAU	أسبارجين Asn		AGU	سيرين Ser		U					
		AUC								ACC			AAC			AGC	C				
		AUA								ACA			AAA	ليزين Lys		AGA	أرجينين Arg		A		
		AUG				ميثيونين Met				ACG			AAG			AGG	G				
G	GUU	فالين Val			GCU	ألانين ala			GAU	حمض أسبارتيك Asp		GGU	غليسين Gly		U						
	GUC								GCC			GAC					GGC	C			
	GUA								GCA			GAA					GGA	A			
	GUG								GCG			GAG			حمض الغلوتاميك Glu		GGG	G			

الوثيقة 12: العناصر المتدخلة في تركيب البروتينات:

شكل أ عديد بيتيد
شكل ب ريبوزوم
شكل ج مضاد الوحدة الرمزية

تتم عملية تركيب البروتينات بتواجد ARNm، لكن هناك عدة عناصر أخرى تتدخل خلال هذه العملية، لتُحول الرسالة المحمولة على ARNm، إلى سلسلة أحماض أمينية. توضح الوثائق أمامه أهم هذه العناصر:

- ★ الشكل أ: ملاحظة الكرونوغرافية تظهر ارتباط الريبوزومات ب ARNm.
- ★ الشكل ب: رسم تخطيطي يوضح بنية الريبوزوم.
- ★ الشكل ج: جزيئة ARNt

الوثيقة 13: مراحل الترجمة La traduction:

مرحلة البداية

موقعان لتثبيت ARNt: P الموقع، A الموقع

حمض أميني PHE
 ثاني ARNt AAA

مرحلة الاستطالة

1 **2**

3 **4**

مرحلة البداية

1 **2**