



الصفحة
1
5

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية ٢٠١٢

الموضوع

المملكة الغربية



وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للنقويم والامتحانات

| | | | | |
|---|------------|------|--|-------------------|
| 5 | المعامل | RS35 | علوم الحياة والأرض | المادة |
| 3 | مدة الاجاز | | شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية | الشعبية أو المسلك |

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

التمرين الأول (4 نقط)

تُمْكِّن مضاعفة ADN من الحفاظ على ثبات الخبر الوراثي من خلية أم إلى خلتين بنتيًّا. في عرض واضح ومنظم:

- عرِّف مضاعفة ADN؛
 - بيِّن آلية مضاعفة ADN مُحدّداً فتره حدوثها؛
 - أبرز العلاقة بين مضاعفة ADN ومضاعفة الصبغي؛ ثم بيِّن دور مضاعفة الصبغي في نقل الخبر الوراثي بشكل مطابق.
- عزِّز عرضك برسمين تخطيطيين توضيحيين: الأول لمضاعفة ADN والثاني لمضاعفة الصبغي.

التمرين الثاني (5 نقط)

لدراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية عند نبات التفاح والحصول على سلالة مرغوب فيها، تم إنجاز التزاوجين الآتيين:

- * التزاوج الأول: بين نباتات التفاح ذات فاكهة سمراء ومذاق حلو ونباتات التفاح ذات فاكهة وردية وبدون مذاق. أعطى هذا التزاوج في الجيل F_1 نباتات ذات فاكهة وردية وبدون مذاق.
- * التزاوج الثاني: بين أفراد الجيل F_1 ; أعطى هذا التزاوج جيلاً F_2 مكوناً من:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| نباتات ذات فاكهة وردية وبدون مذاق | 689 |
| نباتات ذات فاكهة سمراء وبدون مذاق | 220 |
| نباتات ذات فاكهة سمراء ومذاق حلو | 76 |
| نباتات ذات فاكهة وردية ومذاق حلو | 215 |

- 1 - معتمداً على تحليل النتائج المحصلة عند نبات التفاح، بيِّن كيفية انتقال الصفتين المدرستين وفسِّر نتائج التزاوجين الأول والثاني مستعيناً في ذلك بشبكة التزاوج. (4 ن)
- استعمل (R , r) لتمثيل الحليفين المسؤولين عن صفة لون فاكهة التفاح، و (g , G) لتمثيل الحليفين المسؤولين عن مذاق فاكهة التفاح.

• يرغُب مزارع في عزل صنف من التفاح من سلالة نقية يعطي فاكهة وردية ومذاق حلو.

- 2 - حدَّ الأنماط الوراثية للمظهر الخارجي المرغوب فيه المحصلة في F_2 ، ثم بيِّن بواسطة تزاوج اختباري كيف يمكن عزل السلالة النقية من هذا الصنف. (1 ن)

(التمرين الثالث 5 نقط)



لإبراز بعض مظاهر تلوث المياه السطحية وكيفية معالجتها نقترح دراسة المعطيات الآتية

- تعرض المياه السطحية للتلوث من مصادر متعددة، وتعتمد عدة معايير لتحديد درجة تلوث هذه المياه من أهمها معيار D.B.O.5 (الطلب البيولوجي من الأوكسجين اللازم لتحليل المواد العضوية من طرف البكتيريات خلال 5 أيام). تتراوح القيمة المرجعية لـ D.B.O.5 بالنسبة لمياه متوسطة الجودة بين 5mg/l و 10mg/l . تعطي الوثيقة 1 قيمة 1 D.B.O.5 في مياه مطروحة من مصادر مختلفة.

| مصدر المياه | mg/l بـ D.B.O.5 | الوثيقة 1 |
|--|-----------------|-----------|
| مياه عادمة مطروحة من مصدر منزلي | 300 إلى 150 | |
| مياه مطروحة من مصنع عجين الورق | 1500 إلى 100 | |
| مياه مطروحة من معمل للحليب | 5000 إلى 1000 | |
| مياه مطروحة من مجزرة او من مصنع لتصبير السمك | 5000 إلى 1000 | |

1 - بالاعتماد على معيار D.B.O.5، قارن درجة تلوث المياه من مصادر مختلفة مستغلًا معطيات الوثيقة 1 (0.75 ن).

يتعرض أحد المجاري المائية للتلوث بفعل طرح مياه مستعملة من معمل للحليب (الوثيقة 2)، وقد أنجزت دراسة همت قياس بعض الثوابت المائية في محطات مختلفة P_1 ؛ و P_2 ؛ و P_3 ؛ و P_4 توجد على طول هذا المجرى المائي وأعطت النتائج المبينة في الوثائقين 3 و 4.




| المحطة P_4 | المحطة P_3 | المحطة P_2 | المحطة P_1 | الثوابت المائية | الوثيقة 4 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 2 | 7.8 | 78 | 3 | mg/l بـ D.B.O.5 | |
| 12.4 | 7.4 | 3.4 | 12.2 | أوكسجين مذاب بـ mg/l | |
| 0.00 | 0.35 | 0.75 | 0.00 | أملاح النشادر NH_4^+ بـ mg/l | |
| 0.030 | 0.113 | 0.304 | 0.015 | النيتریت NO_2^- بـ mg/l | |
| فاتح | عكر | مسود | فاتح | لون الماء | |
| بدون رائحة | رائحة كريهة | بدون رائحة | بدون رائحة | رائحة الماء | |

2- انتلاقاً من استغلال معطيات الوثائق 2 و 3 و 4 و معارفك، بين تأثير طرح مياه معمل الحليب على المجرى المائي في المحطة P_2 و فسر التغيرات الملاحظة بعد هذه المحطة (2 ن).

- بينت نتائج دراسات مرتبطة بتلوث المياه محدودية المجرى المائي في التخلص من المواد الملوثة خصوصاً إذا كانت حمولة التلوث مرتفعة. لتجاوز هذا المشكل يتم اعتماد عدة تقنيات لمعالجة المياه المستعملة المطروحة؛ في هذا الإطار يتم استعمال نبات القصب. تقدم الوثيقة 5 تقنية معالجة المياه الملوثة باستعمال حوض القصب.

يعيش نبات القصب بالقرب من الماء وتلعب جذوره دوراً هاماً في تهوية الوسط وهو ما يسمح بتكاثر البكتيريات التي تعمل على تنقية المياه الملوثة.



3 - بين كيف تتم معالجة المياه في حوض القصب معتمداً على الوثيقة 5. (1 ن)

يقدم جدول الوثيقة 6 نتائج معايرة بعض الثوابت المائية باستعمال هذا الحوض.

| المياه الخارجة من حوض القصب | المياه الواردة إلى حوض القصب | الثوابت المائية بـ mg/l |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 40 | 921 | D.C.O (الطلب الكيميائي من الأوكسجين) |
| 6 | 504 | D.B.O.5 |
| 7 | 402 | MES (مواد عالقة) |
| 5 | 74 | N (الأزوت الكلي) |

الوثيقة 6

4 - باستغلال الوثيقة 6:

أ - أحسب مردودية التقنية لـ D.B.O.5 داخل حوض القصب باستعمال الصيغة R. (0.25 ن)

$$R = \frac{\text{قيمة D.B.O.5 في المياه الخارجة من الحوض} - \text{قيمة D.B.O.5 في المياه الواردة إلى الحوض}}{\text{قيمة D.B.O.5 في المياه الواردة إلى الحوض}} \times 100$$

ب - بین فعالية هذا النمط من المعالجة علماً أن المردودية في محطة تنقية باستعمال تقنية البرك الماء نظيفة (Lagunage aéré) تقدر بـ $R' = 83\%$ ، ثم اذكر مثالين للاستغلال الممكن لهذه المياه المعالجة. (1 ن)

التمرين الرابع (6 نقاط)

لإبراز بعض مزايا وعواقب تحسين المردود الزراعي نقترح استغلال المعطيات الآتية:

- تتعرض الكثير من المزروعات لعدد كبير من الطفيليات والأعشاب الضارة والحشرات، مما يتحقق خسائر بالمحصول الزراعي؛ ويعتبر استعمال المبيدات الكيميائية من التقنيات الحديثة المعتمدة للتغلب على هذا المشكل.

تمثل الوثيقة 1 انعكاس عدم استعمال مبيدات الفطريات على مردودية بعض المزروعات.

| الصوجا | الذرة | الأرز | الخس | الخيار | البطاطس | الحوامض | العنب | التفاح | نوع المزروع |
|--------|-------|-------|------|--------|---------|---------|-------|--------|-----------------|
| 26 % | 20 % | 53 % | 47 % | 70 % | 44 % | 49 % | 95 % | 86 % | ترابع المردودية |

الوثيقة 1

- 1 - من خلال معطيات الوثيقة 1 استنتج ضرورة استعمال مبيدات الفطريات. (0.5 ن)


* تختلف ظروف استعمال المبيدات في الحقول الزراعية لرفع من المردودية كما تبيّن الوثيقة 2 .

| المردودية في حقول القمح بـ (q/ha) | | توقيت المعالجة بالمبيدات |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| حقول مسقى | حقول غير مسقى | |
| 62.5 | 56.5 | مبكرة |
| 55.7 | 52.8 | نصف مبكرة |
| 48.6 | 44.9 | متاخرة |
| 35.5 | 36.7 | شاهد (بدون معالجة) |

الوثيقة 2

- 2 - حدد معيلاً إجابتك الظروف المناسبة لرفع من مردودية القمح مستعيناً بمعطيات الوثيقة 2. (1.25 ن).

- تتنوع المبيدات الكيميائية المستعملة في الميدان الزراعي بشكل كبير. لإبراز أهمية هذا التنوع نقترح المعطيات الآتية: تمثل الوثيقان 3 و 4 كيفية تأثير بعض المبيدات على التوالي على الأعشاب الضارة والطفيلية وعلى فطر *Fusarium oxysporum* الذي يتغذى على بعض أنواع الأشجار المثمرة ويتكاثر بلبنات خلايا خاصة تسمى الأبواغ.



| المبيدات الكيميائية | كيفية التأثير على الأعشاب الضارة |
|---------------------|----------------------------------|
| Triazine | كبح التركيب الضوئي |
| Phenoxy | كبح نمو الأنسجة |
| Acidamine | كبح إنبات البذور |
| Dinitroaniline | كبح إنبات البذور ونمو الجذور |
| Thiocarbamate | كبح الإنبات |

الوثيقة 3


الوثيقة 4

- 3 - استخرج من الوثيقتين 3 و 4 دور المبيدات الكيميائية في الميدان الزراعي.(1.25 ن)

- بالرغم من أن المبيدات الكيميائية تمكن من تحسين المردود الزراعي؛ إلا أن استعمالها يطرح عدة مشاكل بيئية وصحية. لإظهار بعض عواقب استعمال المبيدات الكيميائية نقترح الوثائق الآتية:
- تقدم الوثيقة 5 تأثير بعض المبيدات الكيميائية على الماشية التي تتغذى أساساً على العشب في المراجع.

| الوثيقة 5 | المبيد الكيميائي | مدة البقاء في الأنسجة | درجة التسمم عند الماشية |
|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Parathion | أسابيع | قوي | قوي |
| Carbaryl | أيام | متوسط | متوسط |
| D.D.T | سنوات | متواضع | متواضع |
| Permethrin | أيام | ضعيف | ضعيف |

يؤدي استعمال المبيدات الكيميائية إلى ارتفاع تركيزها في التربة. تعيش بكتيريا *Rhizobium* في التربة وتثبت الأزوت الهوائي N_2 وتحوله بواسطة الإنزيم Nitrogénase إلى آزوت معدني NH_4^+ المخضب للتربة، كما تلعب ديدان الأرض دوراً مهماً في الرفع من جودة التربة. يقدم شكلان الوثيقتين 6 و 7 تأثير استعمال المبيد الكيميائي كليوكوفوزات Glycophosate على التربة.



4 - يستغل لك النتائج المقدمة في الوثائقين 5 و 6، استخرج الآثار السلبية الناتجة عن استعمال المبيدات على الصحة والبيئة واقتراح بدائل لحد من هذه الآثار.(2 ن)

- بينت الدراسات والملاحظات الميدانية عدم جدوی استعمال بعض المبيدات الكيميائية للقضاء على بعض أنواع الأعشاب الضارة إثر ظهور المقاومة. كمثال على ذلك، يوجد صنفان من أحد الأعشاب الضارة من نوع *Solanum nigrum*:
- صنف حساس يتتوفر على مورثة psbA عاديّة ترمز لبروتين غشائي ضروري للنمو . يثبت المبيد على هذا البروتين مما يعيق نمو هذا الصنف من العشب.
- صنف مقاوم يتتوفر على مورثة psbA طافرة.

تخدم الوثيقة 7 جزءاً من الخطط المستنسخ للمورثة psbA عند الصنف الحساس وعند الصنف مقاوم من العشب الضار.

| الحمض الأميني | الوحدة الرمزية |
|-------------------|----------------|
| أسبارجين: Asn | AAC |
| ألانين: Ala | GCU |
| فينيلalanine: Phe | UUC |
| غليسين: Gly | GGU |
| سيرين: Ser | AGU |
| تيروزين: Tyr | UAU |
| غلوتامين: Gln | CAA |

| | |
|---|-----|
| العشب الحساس ...GTT ATA CGA TCA AAG TTG TTG ... | ADN |
| العشب مقاوم ...GTT ATA CGA CCA AAG TTG TTG ... | ADN |
| منحي القراءة | |

الوثيقة 7

5 - يستغل لك معطيات الوثيقة 7 ومستعيناً بمقططف جدول الرمز الوراثي في الوثيقة 8، أبرز العلاقة مورثة - بروتين وفسّر كيفية ظهور المقاومة عند العشب الضار *Solanum nigrum*. (ان)

الوثيقة 8 : مقططف جدول الرمز الوراثي