

التمرين الأول

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x}, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^3 (\ln x)^4, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + 3\sqrt{x})}{\ln(1 + 2x^2)}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x \ln(x+1)}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{2x+1}{2x+3}\right), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^3}{x^2}$$

التمرين الثاني

حل في \mathbb{R} ما يلي :

$$(\ln x)^3 - \ln x = 0, \quad (\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0, \quad 2\ln(x-2) - \ln(x+3) = 0 \quad (1)$$

$$\ln x > -1 + \ln 2, \quad \ln x - 2 \geq \frac{4}{\ln x}, \quad \ln(x^2 - x) + \ln\left(\frac{1}{3x+4}\right) < 0 \quad (2)$$

التمرين الثالث

$$(1) \text{ بيه أه } (\forall x \in]0, +\infty[) \ln(1+x) \leq x \leq (x+1)\ln(1+x)$$

$$\prod_{k=1}^{k=n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \leq e^n \leq \prod_{k=1}^{k=n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1} \quad (2) \text{ أ- بيه أه}$$

$$\text{ب- استنتاج } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n!}$$

التمرين الرابع

$$(1) \text{ أ- بيه أه } (\forall t \in]0, +\infty[) \ln t \leq t - 1$$

$$\text{ب- استنتاج أه } (\forall x \in \mathbb{R}^{+*}) x \ln x \geq x - 1$$

$$(2) \text{ بيه أه } (\forall x \in [1, +\infty[) x \ln x \leq \frac{1}{2}(x^2 - 1)$$

(3) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0, +\infty[$ بما يلي :

أ- أدرس منحي تغيرات الدالة f و منها جدول تغيراتها

$$\text{ب- ليك } n \text{ عدد من } \mathbb{N}. \text{ بيه أه المعادلة } f(x) = \frac{1}{n} \text{ تقبل حلاً وحيداً } a_n \text{ و أه}$$

ج- أدرس رتبة المتتالية $(a_n)_{n \geq 1}$ و استنتاج أنها متقاربة

$$\text{د- بيه أه } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \text{ نـ استنتاج } \left(\forall n \in \mathbb{N}^*\right) \sqrt{1 + \frac{2}{n}} \leq a_n \leq 1 + \frac{1}{n}$$

التمرين الخامس

لنك n عدداً طبيعياً و بحيث $3 \geq n$. نعتبر الدالة العددية f_n المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي :

$$(1) \text{ أ- حسب النهايتين } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \text{ و } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f_n(x)$$

ب- أدرس منحي تغيرات الدالة f_n و أنجز جدول التغيرات

$$(2) \text{ بيه أه المعادلة } u_n < \sqrt{n} < v_n \text{ تقبل حلية مختلفتين } u_n \text{ و } v_n \text{ بحيث}$$

$$(3) \text{ أحسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(v_n)}{\ln(2n)} = \frac{1}{2} \text{ و بيه أه } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

$$(4) \text{ أ- بيه أه } (\forall n \geq 3) u_n \geq 1$$

ب- تحقق أه $f_{n+1}(u_n) = -\ln u_n$ و استنتاج أه المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تناقصية

ج - ينبع أن $(u_n)_n$ متقاربة و استنتاج أن $\forall n \geq 3 \quad u_n \leq e^{\frac{3}{2n}}$

التمرين السادس

$$(\forall x \in \mathbb{R}^{+*}) \quad \ln x \leq x - 1 \quad (1)$$

أعداد حقيقة موجبة $\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n$ و بحسب $n \in \mathbb{N}$ لـ $n \geq 2$.

$$y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \quad \text{و نلاحظ} \quad \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \quad \text{بحسب}$$

$$\alpha_k \ln\left(\frac{x_k}{y}\right) \leq \frac{\alpha_k x_k}{y} - \alpha_k : \text{لدينا } \{1; 2; \dots; n\} \text{ مع } k \text{ لك ذلك}$$

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k \ln(x_k) \leq \ln\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right) \quad \text{ج - استنتاج أن}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(x_k) \leq \ln\left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}\right) : \text{ينبع أن} \quad \text{ج}$$

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k : \text{أثبت أن} \quad \text{د}$$

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \quad \text{ينبع أن} \quad \text{د}$$

\mathbb{R}^{+*} مع $x_1; x_2; \dots; x_n$ كل $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_1} \geq n$ أو $\frac{x_1}{x_n} + \frac{x_2}{x_{n-1}} + \dots + \frac{x_n}{x_1} \geq n$. استنتاج أن

التمرين السابع

$$(\forall x > 0) \quad x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x \quad (1)$$

$$n \quad \text{لـ كل عدد طبيعي غير منعدم} \quad U_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \quad (2) \quad \text{نلاحظ}$$

أ - أحسب U_2 ; U_1

$$(\quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{متقاربة} \quad) \quad \text{ينبع أن المتالية } (U_n)_n \text{ متقاربة}$$

$$n \quad \text{لـ كل عدد طبيعي غير منعدم} \quad V_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \quad (3) \quad \text{نلاحظ}$$

التمرين الثامن

لـ x عددا مع $[0, +\infty]$ و نعتبر الدالة φ المعرفة بما يلي :

1) ينبع أن الدالة φ تحقق شروط خاصية دول على المجال $[0, x]$

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \frac{-1}{2(1+c)} : \quad (2) \quad \text{استنتاج أن يوجد عنده } c \text{ بحسب}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2} \quad (3) \quad \text{استنتاج أن}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \quad (4) \quad \text{حدد}$$