

الثانوية التأهيلية ابن الياسمين	فرض محروس 4 13-01-2011	2 ب ع ر	ذ هدار
تمرين 1			14,5 ن
<p>نعتبر الدالة العددية f_n المعرفة على IR بمايلي : $f_n(x) = 3x^n e^{-x^2} - 1 ; n \in IN^*$</p>			
<p>(A) نفترض في هذا الجزء أن: $n = 1$ (1) احسب النهايتين : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x)$ واعط تأويلا هندسيا للنتيجتين .</p>	1 ن		
<p>(2) أ- احسب $f_1'(x)$ لكل x من IR .</p>	1 ن		
<p>ب- أنشئ جدول تغيرات الدالة f_1 على IR .</p>	1 ن		
<p>(3) احسب $f_1''(x)$ لكل x من IR، ثم ادرس تقعر منحنى الدالة f_1.</p>	1 ن		
<p>(4) حدد معادلة المماس (Δ) لمنحنى الدالة f_1 في النقطة $A(0, -1)$</p>	0,5 ن		
<p>(5) ادرس الوضع النسبي للمستقيم (Δ) ومنحنى الدالة f_1</p>	1 ن		
<p>(6) أنشئ منحنى الدالة f_1 في معلم متعامد وممنظم .</p>	1 ن		
<p>(B) نفترض في كل ما يلي أن $n \geq 2$.</p>			
<p>ليكن C_n منحنى الدالة f_n في معلم متعامد وممنظم</p>			
<p>(1) احسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$.</p>	0,5 ن		
<p>(2) أنشئ جدول تغيرات الدالة f_n على IR^+ .</p>	1 ن		
<p>(3) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين C_n و C_{n+1} في IR^+ .</p>	0,5 ن		
<p>(4) استنتج أن جميع المنحنيات C_n تمر من نقطتين ثابتتين يجب تحديدهما.</p>	1 ن		
<p>(5) أ- بين أن المعادلة $f_n(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين u_n و v_n في IR^+ بحيث : $0 < u_n < 1 < v_n$.</p>	1 ن		
<p>ب- احسب النهاية : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.</p>	0,5 ن		
<p>ج - بين أن : $f_{n+1}(u_n) = u_n - 1 ; \forall n \in IN^*$ ثم استنتج أن : $f_{n+1}(u_n) \leq 0 ; \forall n \in IN^*$.</p>	1 ن		
<p>ت- بين أن المتتالية (u_n) متقاربة .</p>	1 ن		
<p>و - نعتبر الدالة العددية g_n المعرفة على $]0; +\infty[$ بمايلي : $g_n(x) = \ln 3 + n \ln x - x^2$</p>			
<p>i . بين أن : $g_n(x) = 0 \Leftrightarrow f_n(x) = 0 ; \forall x > 0$</p>	0,5 ن		
<p>ii . استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.</p>	1 ن		
التمرين الثاني :			5,5 ن
<p>نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0; +\infty[$ بما يلي : $f(x) = \ln x - \arctan x$</p>			
<p>(1) بين أن المعادلة $f(x) = n\pi ; n \in IN$ تقبل حلا وحيدا x_n في المجال $]0; +\infty[$.</p>	1,5 ن		
<p>(2) أ- تحقق من أن : $e^{n\pi} < x_n ; \forall n \in IN$</p>	0,5 ن		
<p>ب- استنتج أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$</p>	0,5 ن		
<p>(3) تحقق أن : $\ln \frac{x_n}{e^{n\pi}} = \arctan x_n ; \forall n \in IN$ و استنتج أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{e^{n\pi}} = \sqrt{e^\pi}$</p>	1,5 ن		
<p>(4) تحقق أن : $\ln \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right) = \arctan x_n - \arctan x_{n+1} - \pi ; \forall n \in IN$ و استنتج : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)$</p>	1,5 ن		