


المجموعات الميكانيكية المتذبذبة

المجموعات الميكانيكية \uparrow خمود الذبذبات \uparrow ظاهرة الرنين

- المجموعة الميكانيكية المتذبذبة الحرة كل مجموعة ميكانيكية تنجز حركة تذبذبية من زهاب وإياب حول موضع توازنها المستقر من تلقاء ذاتها
- وسع الحركة x_{\max} أو θ_{\max} هو القيمة القصوى التي يأخذها المقدار الذي يعبر عن مدى ابتعاد المتذبذب عن موضع توازنه المستقر
- الدور الخاص T_0 لمتذبذب ميكانيكي هو المدة الزمنية التي تفصل بين مرورين متتاليين للمتذبذب أو المدة اللازمة لإنجاز ذبذبة واحدة
- الخمود نواعان : خمود صلب وخمود مائع
 - الخمود الصلب : يحدث بفعل تماس المتذبذب وجسم صلب حيث يتناقص الوسع خطيا
 - الخمود المائع : يحدث بفعل تماس بين المتذبذب وجسم مائع
- تنجز مجموعة ميكانيكية ذبذبات قسرية عندما يفرض مثير دوره على المجموعة المتذبذبة ، وعند $T = T_0$ تحدث ظاهرة الرنين .

قوانين نيوتن

السقوط الراسي
لجسم صلبالحركات
المستويةالأقمار
الصناعية
والكواكبحركة دوران
جسم صلب حول
محور ثابتالمجموعات
الميكانيكية
المتذبذبة

المظاهر الحاقية

الذرة و
ميكانيك نيوتن

النواس البسيط

النواس الوازن

نواس اللي

النواس المرن

المتذبذب الميكانيكي

الأفصول الزاوي
(حالة الذبذبات الصغيرة)الأفصول الزاوي
(حالة الذبذبات الصغيرة)

الأفصول الزاوي

الأفصول x

المقدار المستعمل لمعلمة
موضع المتذبذب

عزم وزن الجسم الصلب :

عزم وزن النواس :

عزم مزدوجة اللي :

القوة المطبقة من طرف
النايوس : $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$

فعل الارتداد

$$M_{\Delta}(\vec{P}) = -mg \cdot l \cdot \theta$$

$$M_{\Delta}(\vec{P}) = -mg \cdot d \cdot \theta$$

$$M_c = -C\theta$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

المعادلة التفاضلية للحركة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{mg l}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{mg d}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{C}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

الدور الخاص