

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2016

- عناصر الإجابة -

NR 36

٤٥٠٤٢ | ٤٥٠٤٣ | ٤٥٠٤٤

٤٥٠٤٥ | ٤٥٠٤٦ | ٤٥٠٤٧

٤٥٠٤٨ | ٤٥٠٤٩ | ٤٥٠٤١

٤٥٠٤٢ | ٤٥٠٤٣ | ٤٥٠٤٤



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم  
والامتحانات والتوجيه



2 مدة الإنجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

3 المعامل

شعبة العلوم الرياضية "أ"

الشعبة أو المسارك

## المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

رقم السؤال	عنصر الإجابة	سلم التنقيط
I	أ- تعريف صحيح من قبيل: - الساكنة: مجموعة أفراد من نفس النوع، تعيش في وسط جغرافي محدد يسمح لجميع أفراد الساكنة بالتزواج فيما بينهم.....(0.50) - تعريف صحيح من قبيل: الانحراف الجيني: تغير بالصدفة لتردد الحليلات داخل ساكنة من جيل لآخر ينتج عنه انخفاض تعدد الأشكال الوراثية داخل الساكنة.....(0.50) ب- ذكر شرطين من بين ما يلي: ..... - توالي جنسي وصيغة صبغية ثنائية. - عدم تراكب الأجيال (غياب التزاوج بين أفراد الأجيال المختلفة). - عدد لا نهائي لأفراد الساكنة والمتزاوج يتم بالصدفة. - غياب الهجرة من وإلى الساكنة. - لكل فرد وكيفما كان نمطه الوراثي نفس القدرة والحظوظ للتزاوج وإعطاء خلف قادر على العيش (غياب الانتقاء). - غياب الطفرات والاختلافات التي قد تحدث أثناء الانقسام الاختزالي.	1.5 ن
II	(أ؛ خطأ) - (ب؛ صحيح) - (ج؛ صحيح) - (د؛ خطأ)	2 ن
III	(1؛ أ) - (2؛ أ) - (3؛ ب)	1.5 ن

## المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)


### التمرين الأول: (6 نقط)

رقم السؤال	عنصر الإجابة	سلم التنقيط
I	- على مستوى الكيس البوغي A <sub>1</sub> : الانقسام الاختزالي.....(0.25) - على مستوى الكيس البوغي A <sub>2</sub> : الانقسام الاختزالي.....(0.25) - التعليل: خلايا أم ثنائية الصيغة الصبغية تعطي خلايا أحادية الصيغة الصبغية.....(0.25) - على مستوى المشيرة B <sub>2</sub> : الإخصاب.....(0.25) - التعليل : يتم على مستواها التحام المشيجين الذكري والأنثوي.....(0.25)	1.25 ن
2	إنجاز دورة صبغية صحيحة.....(0.75) يتعلق الأمر بدورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية	1 ن
II	- هجونة ثنائية.....(0.25) - الأبوان من سلالتين نقيتين، والجيل الأول F <sub>1</sub> متجانس. تحقق القانون الأول لماندل؛.....(0.25)	
3		

1 ن

نستنتج أن هناك سيادة تامة لزوجين من الحليلات:

- الحليل المسؤول عن اللون الأرجواني للأزهار سائد ونرمز له (R)، بالنسبة للحيل المسؤول عن اللون الأحمر للأزهار ونرمز له (r). ..... (0.25 ن)
- الحليل المسؤول عن الشكل الطويل لحبوب اللقاح سائد ونرمز له (L)، بالنسبة للحيل المسؤول عن الشكل المستدير لحبوب اللقاح ونرمز له (ℓ) ..... (0.25 ن)

(النتائج النظرية الممكن الحصول عليها عند أفراد الجيل  $F_2$  ..... (0.5 ن)

9/16 [R,L]

3/16 [r,L]

3/16 [R,ℓ]

1/16 [r,ℓ]

2 ن

0.75 ن

المقارنة: عدم تطابق النتائج المنتظرة حسب القانون الثالث لماندل مع النتائج المحصلة من طرف Bateson و Punett  
الاستنتاج: المورثتان مرتبطتان ..... (0.5 ن)  
..... (0.25 ن)

4

## التمرير الثاني: (4 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقريب
1 - أ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الآبوان السليمان ينجبان ابنا مصاباً : المرض متاحي</li> <li>المرض محمول على الصبغى الجنسى X.</li> <li>- قبول تعليل من قبل:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ظهور المرض عند الذكور من أب سليم.</li> <li>• إصابة الأنثى III ..... (0.5 ن)</li> </ul> </ul>	
1 ن	(0.5 ن)	

1.5 ن

1 - ب

- النمط الوراثي للأم  $X_M X_m$ : II<sub>6</sub> ..... X<sub>M</sub>Y II<sub>7</sub>: ..... (0.5 ن)  
 - المرض متاحي ومحمول على X، لكي تكون البنت مصابة ينبغي أن تكون متشابهة الاقتران بالنسبة للحيل الطافر، وهذا ما يستلزم أن يكون أبوها مصاباً . في هذه الحالة، وبما أن الأب سليم فلا يمكن للبنت III أن تصاب ..... (1ن)

1.5 ن

2

- البنت مصابة بمرض Turner : تتوفّر على صبغة جنسية X واحدة ..... (0.25 ن)  
 سبب الإصابة بالمرض:  
 - البنت ورثت الحيل المسبب للمرض من الأم ..... (0.25 ن)  
 - البنت لم ترث الصبغة الجنسية من الأب نتيجة شذوذ في الانقسام الاختزالي ..... (0.5 ن)  
 - غياب الحيل السائد غير المسبب للمرض عند البنت أدى إلى تعثير الحيل المسبب للمرض وبالتالي إصابتها بالمرض ..... (0.5 ن)

## التمرين الثالث (5 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقييم																																																																																																						
1 - أ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تغير متواصل ..... (0.25 ن)</li> <li>- التعليق: لأن طول الأنابيب التويجية يمكن أن يأخذ جميع القيم ..... (0.25 ن)</li> </ul>	0.5 ن																																																																																																						
1 - ب	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يظهر مضلع الترددات منوالين عند القيمتين 70mm و 64mm ..... (0.5 ن)</li> <li>- هناك تباعد كبير بين قيم طول الأنابيب التويجية والمعدل الحسابي ..... (0.25 ن)</li> <li>- الاستنتاج: ساكنة غير متجانسة ..... (0.25 ن)</li> </ul>	1 ن																																																																																																						
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">تمنح 0.25 ن لكل عمود صحيح</th> </tr> <tr> <th><math>fi(xi - \bar{X})^2</math></th><th><math>(xi - \bar{X})^2</math></th><th><math>xi - \bar{X}</math></th><th><math>fixi</math></th><th><math>fi</math></th><th>وسط الفئة</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>626,88</td><td>-25,04</td><td>0</td><td>0</td><td>52</td></tr> <tr><td>0</td><td>485,66</td><td>-22,04</td><td>0</td><td>0</td><td>55</td></tr> <tr><td>0</td><td>362,43</td><td>-19,04</td><td>0</td><td>0</td><td>58</td></tr> <tr><td>257,20442</td><td>257,20</td><td>-16,04</td><td>61</td><td>1</td><td>61</td></tr> <tr><td>169,97886</td><td>169,98</td><td>-13,04</td><td>64</td><td>1</td><td>64</td></tr> <tr><td>100,75329</td><td>100,75</td><td>-10,04</td><td>67</td><td>1</td><td>67</td></tr> <tr><td>742,91594</td><td>49,53</td><td>-7,04</td><td>1050</td><td>15</td><td>70</td></tr> <tr><td>326,0433</td><td>16,30</td><td>-4,04</td><td>1460</td><td>20</td><td>73</td></tr> <tr><td>30,144836</td><td>1,08</td><td>-1,04</td><td>2128</td><td>28</td><td>76</td></tr> <tr><td>157,89253</td><td>3,85</td><td>1,96</td><td>3239</td><td>41</td><td>79</td></tr> <tr><td>443,25852</td><td>24,63</td><td>4,96</td><td>1476</td><td>18</td><td>82</td></tr> <tr><td>190,19973</td><td>63,40</td><td>7,96</td><td>255</td><td>3</td><td>85</td></tr> <tr><td>360,52304</td><td>120,17</td><td>10,96</td><td>264</td><td>3</td><td>88</td></tr> <tr><td>389,89756</td><td>194,95</td><td>13,96</td><td>182</td><td>2</td><td>91</td></tr> <tr><td><b>3168,81</b></td><td></td><td></td><td><b>10246</b></td><td><b>133</b></td><td><b>المجموع</b></td></tr> </tbody> </table> <p>المعدل الحسابي: <math>\bar{X} = 10246/133 = 77,04 \text{ mm}</math> ..... (0.5 ن)    الانحراف النمطي المعياري <math>\sigma = \sqrt{3168,81/133} = 4,88</math> ..... (0.5 ن)</p>	تمنح 0.25 ن لكل عمود صحيح						$fi(xi - \bar{X})^2$	$(xi - \bar{X})^2$	$xi - \bar{X}$	$fixi$	$fi$	وسط الفئة	0	626,88	-25,04	0	0	52	0	485,66	-22,04	0	0	55	0	362,43	-19,04	0	0	58	257,20442	257,20	-16,04	61	1	61	169,97886	169,98	-13,04	64	1	64	100,75329	100,75	-10,04	67	1	67	742,91594	49,53	-7,04	1050	15	70	326,0433	16,30	-4,04	1460	20	73	30,144836	1,08	-1,04	2128	28	76	157,89253	3,85	1,96	3239	41	79	443,25852	24,63	4,96	1476	18	82	190,19973	63,40	7,96	255	3	85	360,52304	120,17	10,96	264	3	88	389,89756	194,95	13,96	182	2	91	<b>3168,81</b>			<b>10246</b>	<b>133</b>	<b>المجموع</b>	2 ن
تمنح 0.25 ن لكل عمود صحيح																																																																																																								
$fi(xi - \bar{X})^2$	$(xi - \bar{X})^2$	$xi - \bar{X}$	$fixi$	$fi$	وسط الفئة																																																																																																			
0	626,88	-25,04	0	0	52																																																																																																			
0	485,66	-22,04	0	0	55																																																																																																			
0	362,43	-19,04	0	0	58																																																																																																			
257,20442	257,20	-16,04	61	1	61																																																																																																			
169,97886	169,98	-13,04	64	1	64																																																																																																			
100,75329	100,75	-10,04	67	1	67																																																																																																			
742,91594	49,53	-7,04	1050	15	70																																																																																																			
326,0433	16,30	-4,04	1460	20	73																																																																																																			
30,144836	1,08	-1,04	2128	28	76																																																																																																			
157,89253	3,85	1,96	3239	41	79																																																																																																			
443,25852	24,63	4,96	1476	18	82																																																																																																			
190,19973	63,40	7,96	255	3	85																																																																																																			
360,52304	120,17	10,96	264	3	88																																																																																																			
389,89756	194,95	13,96	182	2	91																																																																																																			
<b>3168,81</b>			<b>10246</b>	<b>133</b>	<b>المجموع</b>																																																																																																			
3	<p>المقارنة: يجب أن تتضمن المقارنة العناصر الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المعدل الحسابي للساكنة البنت (P<sub>2</sub>) أكبر من المعدل الحسابي للساكنة الأم (P<sub>1</sub>) ..... (0.5 ن)</li> <li>- الانحراف النمطي المعياري للساكنة (P<sub>2</sub>) أصغر من الانحراف المعياري للساكنة (P<sub>1</sub>). ..... (0.5 ن)</li> <li>- الاننقاء المنجز فعال لأنه عند الساكنة البنت (P<sub>2</sub>) تم الرفع من طول الأنابيب التويجية وتم تقليل تشتيتها مما يدل على أنها أصبحت أكثر تجانسا ..... (0.5 ن)</li> </ul>	1.5 ن																																																																																																						