

المعادلات التفاضلية

I- تقديم

1- تؤدي دراسة بعض الظواهر الفيزيائية والبيولوجية والاقتصادية وغيرها إلى معادلات يكون فيها المجهول دالة وتحتوي على مشتقة أو مشتقات هذه الدالة.

هذا النوع من المعادلات يسمى المعادلات التفاضلية.

يرمز عادة إلى الدالة المجهولة بالرمز y (وقد يرمز لها بأي حرف آخر مثل f, z, u, \dots) . حل المعادلة التفاضلية يعني إيجاد جميع الدوال y التي تحقق هذه المعادلة ، و مجموعة هذه الدوال تسمى الحل العام للمعادلة ، كل عنصر من هذه المجموعة يسمى حلاً خاصاً للمعادلة ، كل حل يسمى كذلك تكاملاً.

II- أمثلة

(أ) $y' = 0$ هي معادلة تفاضلية

الدالة y المعرفة على \mathbb{R} بـ $y = 1$ حل خاص للمعادلة
مجموعة الدوال الثابتة على \mathbb{R} هي الحل العام للمعادلة $y' = 0$.

(ب) $y' = x^2 - 1$ هي معادلة تفاضلية ذات المجهول y (يمكن أن نكتب $y' = x^2 - 1$)
حلول هذه المعادلة هي الدوال الأصلية للدالة $x^2 - 1 \rightarrow x$ على \mathbb{R} .

أي الحل العام لهذه المعادلة هي مجموعة الدوال المعرفة على \mathbb{R} بما يلي $x \rightarrow \frac{1}{3}x^2 - x + k$
حيث k عدد حقيقي اعتباطي .

III- حل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$

1/ المعادلة التفاضلية $y' = ay$

* إذا كان $a = 0$ فإن $y' = 0$ أي أن الحل العام هو مجموعة الدوال الثابتة على \mathbb{R}
* إذا كان $a \neq 0$

نعلم أن $y' + ay = 0$ ادن e^{ax} حل خاص للمعادلة $\forall x \in \mathbb{R}$ $(e^{ax})'$ $= ae^{ax}$

ليكن y حلاً اعتباطياً للمعادلة $y' + ay = 0$ نضع $y(x) = z(x)e^{ax}$
ومنه $y'(x) = z'(x)e^{ax} + az(x)e^{ax}$

أي $y'(x) - ay(x) = z'(x)e^{ax} + ay(x) = 0$ و بالتالي $y'(x) = z'(x)e^{ax}$
و منه $z'(x) = 0$ و بالتالي $z(x) = \lambda$ حيث λ عدد حقيقي اعتباطي

اذن $y(x) = \lambda e^{ax} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ حيث λ عدد حقيقي اعتباطي
نلاحظ أن الحالة $a = 0$ هي ضمن الحالة العامة .

خاصية

المعادلة التفاضلية $y' = ay$ تقبل ما لازهاية من الحلول وهي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بـ $x \rightarrow \lambda e^{ax}$
حيث λ عدد حقيقي اعتباطي.

نتيجة

يوجد حل وحيد للمعادلة $y' = ay$ يتحقق الشرط $y(x_0) = y_0$ و هي الدالة $x \rightarrow y_0 e^{a(x-x_0)}$

الشرط $y(x_0) = y_0$ يسمى الشرط البدئي

أمثلة

- نحل المعادلة التفاضلية $y' = 2y$

حلول المعادلة التفاضلية $y' = 2y$ هي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بـ $x \rightarrow \lambda e^{2x}$ حيث λ عدد حقيقي اعتباطي.

$$y(1) = 2 \quad ; \quad y' = \frac{1}{3}y$$

$x \rightarrow 2e^{\frac{1}{3}(x-1)}$ حل المعادلة التفاضلية $y(1) = 2$ هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ حيث

2/ حل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$

اذا كان $a = 0$ فـ $y' = b$ ومنه حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال f حيث

$$y' = ay + b \Leftrightarrow y' = a\left(y + \frac{b}{a}\right)$$

$$z' = y' \text{ و منه } z = y + \frac{b}{a}$$

$$y' = ay + b \Leftrightarrow z' = az$$

$$\Leftrightarrow z(x) = \lambda e^{ax} \quad / \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow y(x) + \frac{b}{a} = \lambda e^{ax} \quad / \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow y(x) = \lambda e^{ax} - \frac{b}{a} \quad / \lambda \in \mathbb{R}$$

خاصية

ليكن a و b عددين حقيقين حيث $a \neq 0$

المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ تقبل ما لانهاية من الحلول وهي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بـ

حيث λ عدد حقيقي اعتبـاطي.

نتـيـحة

يوجـد حل وحـيد للمـعادـلة $y' = ay + b$ يحقق الشرط $y(x_0) = y_0$ و هي الدالة

الشرط $y(x_0) = y_0$ يسمى الشرط البدئـي

مثال

نـحلـ المعـادـلةـ التـفـاضـلـيـةـ $y' = -3y + 2$

حلـولـ المعـادـلةـ التـفـاضـلـيـةـ $y' = -3y + 2 \rightarrow \lambda e^{-3x} + \frac{2}{3}$ هي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بـ حيث λ عدد حقيقي اعتـباطـيـ.

III- حل المعادلات التفاضلية $y'' + ay' + by = 0$

1- المعادلات التفاضلية $y'' + ay' + by = 0$ حيث $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ تسمى معادلات تفاضلية خطـيةـ منـ الرـتـبةـ

الـثـانـيـةـ ذاتـ المعـامـلـاتـ الثـابـتـةـ

2- بعض الحالات الخاصة

- اذا كان $a = b = 0$ فـ $y'' = 0$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \quad y'(x) = k \Leftrightarrow \exists (k; k') \in \mathbb{R}^2 \quad y(x) = kx + k'$$

الـحلـ العامـ للمـعادـلةـ $y'' = 0$ هي مـجمـوعـةـ الدـوـالـ $x \rightarrow kx + k'$ حيث $k, k' \in \mathbb{R}^2$

- اذا كان $b = 0$ فـ $y'' + ay' = 0$

$$y'' + ay' = 0 \Leftrightarrow (y')' + ay' = 0$$

و بالـتـالـيـ $y'(x) = \lambda e^{-ax}$ حيث λ عددـ حـقـيقـيـ اعتـباطـيـ

اذـنـ الـحلـ العـامـ للمـعادـلةـ $y'' + ay' = 0$ هي الدـوـالـ الأـصـلـيـةـ

$$(\lambda; \mu) \in \mathbb{R}^2 \quad x \rightarrow \frac{-\lambda}{a} e^{-ax} + \mu$$

أـيـ الدـوـالـ

3- حلـ المعـادـلةـ التـفـاضـلـيـةـ $y'' + ay' + by = 0$

$\exists k \in \mathbb{R} \quad \forall x \in I \quad g(x) = kf(x)$ تكون f و g متناسبتين اذا و فقط اذا كان

(b) ليكن y_1 و y_2 حللين للمعادلة E و ليكن $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ بين أن $\alpha y_1 + \beta y_2$ حل للمعادلة E

خاصية

اذا كان y_1 و y_2 حللين للمعادلة $E : y'' + ay' + by = 0$ فان $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ و كان $E : y'' + ay' + by = 0$ حل للمعادلة E .

خاصية

كل حل للمعادلة التفاضلية $E : y'' + ay' + by = 0$ هو تالية خطية لحلين غير متناسبين للمعادلة E .

ملاحظة لايجاد حل العام للمعادلة التفاضلية $E : y'' + ay' + by = 0$ يكفي أن نجد حلين خاصين غير متناسبين

(d) **حل المعادلة التفاضلية**

لنبحث عن حلول من نوع $r \in \mathbb{R}$; $y : x \rightarrow e^{rx}$

$$r^2 + ar + b = 0 \Leftrightarrow r^2 e^x + a r e^x + b e^x = 0 \Leftrightarrow E$$

اذن اذا كان r حل للمعادلة $E : y'' + ay' + by = 0$ فان الدالة $y = e^{rx}$ حل للمعادلة E

خاصية

المعادلة $(a; b) \in \mathbb{R}^2$; $E : y'' + ay' + by = 0$ تسمى المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية $r^2 + ar + b = 0$

مميز هذه المعادلة هو $a^2 - 4b$

الحالة 1 اذا كان $a^2 - 4b < 0$ فان $r^2 + ar + b = 0$ تقبل حللين مختلفين r_1 و r_2 .

الدالتان $x \rightarrow e^{r_1 x}$; $x \rightarrow e^{r_2 x}$ حلان خاصان للمعادلة التفاضلية E

نلاحظ أن $x \rightarrow e^{r_1 x}$; $x \rightarrow e^{r_2 x}$ غير متناسبين

اذن حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ حيث α و β عدادن اعتباطيان.

الحالة 2 اذا كان $a^2 - 4b = 0$ فان $r^2 + ar + b = 0$ تقبل حل مزدوج r .

الدالة $x \rightarrow e^{rx}$ حل للمعادلة E . نبين أن $x \rightarrow x e^{rx}$ حل للمعادلة E .

الدالتان $x \rightarrow e^{rx}$ و $x \rightarrow x e^{rx}$ غير متناسبتين لأن $x \rightarrow \frac{e^{rx}}{e^{rx}}$ غير ثابتة.

اذن حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow (\alpha + \beta x) e^{rx}$ حيث α و β عدادن اعتباطيان

الحالة 3 اذا كان $a^2 - 4b > 0$ فان $r^2 + ar + b = 0$ تقبل جذرين متراافقين $r_1 = p + iq$ و $r_2 = p - iq$

$$e^{r_1 x} = e^{px} (\cos qx + i \sin qx) = e^{px} \cos qx + i e^{px} \sin qx$$

نبين أن الدالتين $x \rightarrow e^{px} \cos qx$ و $x \rightarrow e^{px} \sin qx$ حللين للمعادلة E .

$$\left(p = -\frac{a}{2}; \quad q = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2} \right) \text{ لاحظ}$$

و بما أن الدالتين $x \rightarrow e^{px} \cos qx$ و $x \rightarrow e^{px} \sin qx$ غير متناسبتين فان حلول المعادلة التفاضلية

هي الدوال $x \rightarrow e^{px} (\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$ حيث α و β عدادن اعتباطيان.

خاصية

للتكن المعادلة التفاضلية $E : y'' + ay' + by = 0$ و لتكن $(a; b) \in \mathbb{R}^2$ ولتكن المعادلة المميزة

$a^2 - 4b < 0$ المميزة

*- اذا كان $a^2 - 4b < 0$ فان المعادلة المميزة لها جذرين مختلفين r_1 و r_2 .

و حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ حيث α و β عدادن اعتباطيان

*- اذا كان $a^2 - 4b = 0$ فان المعادلة المميزة تقبل حل مزدوج r .

و حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow (\alpha + \beta x) e^{rx}$ حيث α و β عدادن اعتباطيان

*- اذا كان $a^2 - 4b > 0$ فان المعادلة المميزة تقبل جذرين متراافقين $r_1 = p + iq$ و $r_2 = p - iq$

و حلول المعادلة التفاضلية E هي الدوال حيث $x \rightarrow e^{px}$ ($\alpha \cos qx + \beta \sin qx$) و عددان α و β اعتباطيان.

الحل الذي يحقق

يوجد حل وحيد للمعادلة التفاضلية E يتحقق الشرطين $y'(x_0) = y'_0$ و $y(x_0) = y_0$ يسميان الشرطين البدئيين . يمكن إعطاء شرطين بدئيين آخرين.

ملاحظة

$\alpha \cos qx + \beta \sin qx = k \left(\frac{\alpha}{k} \cos qx + \frac{\beta}{k} \sin qx \right) = k (\cos \varphi \cos qx + \sin \varphi \sin qx) = k \cos(qx - \varphi)$ لدينا $\cos \varphi = \frac{\alpha}{k}$; $\sin \varphi = \frac{\beta}{k}$; $k = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ بوضع تستنتج اذا كان $a^2 - 4b < 0$ حيث k و φ اعتباطيان

تمرين 1 - حل المعادلة $y'' + 2y' - \frac{5}{4}y = 0$ و حدد الحل الخاص y_1 حيث $y_1(0) = 1$ $y_1'(0) = -1$

- حل المعادلة $y'' + 4y' + 4y = 0$

- حل المعادلة $y'' + 2y' + 5y = 0$

الجواب

- ليكن Δ مميز $r^2 + 2r - \frac{5}{4} = 0$ المعايضة المميزة للمعادلة

$$r_2 = \frac{-2 - 3}{2} = -\frac{5}{2} \text{ و } r_1 = \frac{-2 + 3}{2} = \frac{1}{2} \text{ ومنه } \Delta = 4 + 5 = 9$$

و منه حلول المعادلة هي الدوال $x \rightarrow \alpha e^{\frac{1}{2}x} + \beta e^{-\frac{5}{2}x}$ حيث α و β عددان اعتباطيان لتحديد الحل الخاص y_1 حيث $y_1(0) = 1$ و $y_1'(0) = -1$

لدينا $y_1'(x) = \frac{\alpha}{2} e^{\frac{1}{2}x} - \frac{5\beta}{2} e^{-\frac{5}{2}x}$ و منه $y_1(x) = \alpha e^{\frac{1}{2}x} + \beta e^{-\frac{5}{2}x}$

$$\begin{cases} y_1(0) = 1 \\ y_1'(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \frac{\alpha}{2} - \frac{5\beta}{2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha - 5\beta = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_1(x) = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{2}x} + e^{-\frac{5}{2}x} \right) \text{ اذن}$$

- مميز $r^2 + 4r + 4 = 0$ المعايضة المميزة للمعادلة $y'' + 4y' + 4y = 0$ منعدم ومنه

و حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow (\alpha + \beta x)e^{-2x}$ حيث α و β عددان اعتباطيان

- مميز $r^2 + 2r + 5 = 0$ المعايضة المميزة للمعادلة $y'' + 2y' + 5y = 0$ هو

$$r_2 = -1 + 2i \text{ و } r_1 = -1 - 2i \text{ ومنه}$$

و حلول المعادلة E هي الدوال $x \rightarrow e^{-x} (\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x)$ حيث α و β عددان اعتباطيان

حالات خاصة

*- اذا كان $0 > a$ فان حلول المعادلة التفاضلية $y'' + ay = 0$ هي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بما يلي $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ حيث $x \rightarrow \alpha \cos \sqrt{ax} + \beta \sin \sqrt{ax}$.

*- اذا كان $0 < a$ فان حلول المعادلة التفاضلية $y'' + ay = 0$ هي الدوال المعرفة على \mathbb{R} بما يلي $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ حيث $x \rightarrow \alpha e^{\sqrt{-a}x} + \beta e^{-\sqrt{-a}x}$.

مثال حل المعادلتين $y'' - 4y = 0$; $y'' + 2y = 0$

. $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ هي الدوال المعرفة بـ $x \rightarrow \alpha \cos \sqrt{2}x + \beta \sin \sqrt{2}x$ حيث

. $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$ هي الدوال المعرفة بـ $x \rightarrow \alpha e^{2x} + \beta e^{-2x}$ حيث $y'' + 2y = 0$ $y'' - 4y = 0$