

## تصحيح السلسلة 2

### النواي والطاقة والكتلة .

### السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية

#### تمرين 1


- النقص الكتلي هو الفرق بين كتلة النويات عندما تكون منفصلة وكتلة النواة . نعبر عنه بالعلاقة التالية بالنسبة لنواة  $Z$  مكونة من  $p$  نوكليون و  $n$  نيلونات :
$$\Delta m = (Zm_p + (A - Z)m_n) - m(Z^A X)$$
- طاقة الربط  $E_\ell$  : هي الطاقة اللازمة لإعطاء نواة لفصال نوياتها .
- العلاقة التي تمكن من حساب طاقة الربط :
$$E_\ell = \Delta m \cdot c^2$$

#### تمرين 2

يمثل منحنى أسطوون تغيرات طاقة الربط بالنسبة لنوية بدلالة عدد الكتلة  $A$  :

$$\left( -\frac{E_\ell}{A} \right) = f(A)$$

أنظر المنحنى :



#### تمرين 3

أ – حساب النقص الكتلي :

$$\Delta m = (6m_p + 8m_n) - m(^{14}_6 C)$$

$$= 6,04368 + 8,06928 - 13,9999 = 0,11306u$$

ب – طاقة الربط للنواة :

$$E_\ell = \Delta m \cdot c^2 = 0,11306u$$

$$1u = 931,5 \text{ MeV} / c^2$$

$$E_\ell = 0,11306u = 0,11306 \times 931,5 \text{ MeV} = 105,32 \text{ MeV}$$

ج – طاقة الربط بالنسبة لنوية :

$$\mathcal{E} = \frac{E_\ell}{A} = \frac{105,32 \text{ MeV}}{14} = 7,52 \text{ MeV / nucleon}$$

بالتالي فإن الكربون 12 الأكثر استقرار من الكربون 14 .

#### تمرين 4

1 - حساب تغير الكتلة  $\Delta m$  الناتج عن التفاعل النووي :

$$\Delta m = m(^4_2\text{He}) + m(n) - m(^3_1\text{H}) - m(^2_1\text{H})$$

$$\Delta m = 4,00150 + 1,00866 - 3,01550 - 2,01355$$

$$\Delta m = -0,01889\text{u}$$

$$\Delta m = -17,596\text{MeV} / c^2$$

2 - حساب الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي :

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = -17,5960\text{MeV}$$

الطاقة الناتجة عن التفاعل هي  $Q = 17,5960\text{MeV}$  خلال تكون نواة واحدة من الهيليوم .

$$Q = 17,5960 \times 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 28,189 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

3 - عند تكون 1mol والذي يحتوي على  $N_A$  نواة من الهيليوم تكون الطاقة الناتجة هي :

$$Q' = N_A \cdot Q = 169,965 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

4 - الحصيلة الطاقية باستعمال مخطط الطاقة :

#### تمرين 5

1 - حساب تغير الكتلة  $\Delta m$  :

$$\Delta m = m(^{140}_{54}\text{Xe}) + m(^{94}_{38}\text{Sr}) + 2m(n) - m(^{235}_{92}\text{U})$$

$$\Delta m = 138,89194 + 93,89446 + 2 \times 1,00866 - 234,99332$$

$$\Delta m = -0,1896\text{u}$$

$$\Delta m = -176,612\text{MeV} / c^2$$

2 - نستنتج الطاقة الناتجة عن التفاعل :

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = -176,612\text{MeV}$$

الطاقة الناتجة عن التفاعل هي  $Q = -\Delta E = 176,612\text{MeV}$  بما أن

$\Delta E < 0$  فإن التفاعل ناشر للحرارة

3 - مخطط الطاقية أنظر المخطط جانبه .

#### تمرين 6

حسب التمرينين :


خلال الاندماج يتبيّن أن 5 نوبيات تنتج أو تحرر طاقة تكافئ  $17,596\text{MeV}$  أي أن نوبية واحدة تحرر

$$3,5192\text{MeV}$$

خلال الانشطار أن 236 نوبية تحرر طاقة تكافئ  $176,612\text{MeV}$  أي أن نوبية واحد تحرر ما قيمته  $0,748\text{MeV}$  مما يبيّن أن الطاقة المحررة خلال الاندماج أكبر بكثير من الطاقة المحررة خلال الانشطار

#### تمرين 7

1 - معادلة التفاعل النووي لتفتت نواة الكوبالط .



تفسير ميكانيزم النشاط الإشعاعي  $\beta^-$



النشاط الإشعاعي  $\beta^-$  هو استحالة نووية حيث تتحول داخل النواة نوترون إلى بروتون :

$$^1_0\text{n} \rightarrow ^1_1\text{p} + ^0_{-1}\text{e}$$

2 - حساب طاقة الربط لنواة الكوبالط :

$$\Delta m = (27m_p + 33m_n) - m(^{60}_{27}\text{Co}) = 0,56333\text{u}$$

طاقة الربط هي



$$\Delta m = 0,56333 \times 931,5 = 524,47 \text{ MeV} / c^2$$

$$\Delta E = 24,74 \text{ MeV}$$

3 - الطاقة الناتجة عن تفتق 1g من الكوبالط :

- حسب طاقة التفاعل :

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = m(\text{Ni}) + m(e) - m(^{60}_{27}\text{Co}) = -0,00301 \times 931,5 \text{ MeV} / c^2$$

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = -2,804 \text{ MeV}$$

الطاقة الناتجة عن تفتق نواة واحدة من الكوبالط هي 2,804 MeV

بالنسبة ل 1g ، حسب عدد النويديات في 1g من الكوبالط :

$$Q' = N_A \cdot \frac{m}{M} \times Q$$

$$Q' = 6,02 \cdot 10^{23} \times \frac{1}{59,5} \times 2,804 \times 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 0,4545 \cdot 10^{10} \text{ J}$$