

1 - التمرين الأول :


نعتبر سكة $ABCDE$ في مستوى رأسى مكونة من أربعة أجزاء.

- الجزءان BC و AB مستقيمان ومائلان بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي.
- الجزء CD مستقىمي وأفقي.
- الجزء DE نصف دائري شعاعه $r' = 32\text{cm}$ ومركزه O .

ثبتت جسما S_1 كتلته $m_1 = 0.9\text{kg}$ في طرف خيط كتلته مهملة وغير قابل للامتداد.

نلف الطرف الآخر للخيط حول بكرة بكرة شعاعها $r = 10\text{cm}$ وزن قصورها، بالنسبة حور تماثلها هو $J_{\Delta} = 10^{-3}\text{kg.m}^2$. نعتبر أن البكرة قابل للدوران حول محور (Δ) أفقى منطبق مع محور تماثلها، بدون احتكاك، وأن الجسم S_1 ينزلق فوق السكة بدون احتكاك عدا فوق الجزء BC . نعطي: $\alpha = 30^\circ$; $g = 10\text{m.s}^{-2}$; $AB = 1\text{m}$.

نحرر المجموعة بدون سرعة بدئية، فينزلق S_1 فوق AB وفي نفس الوقت تدور البكرة حول المحور Δ .



1 - عبر عن السرعة v_B للجسم S_1 عند مروره من

النقطة B بدلالة m_1 و r و J_{Δ} و α و g و AB و احسب v_B .

2 - عند لحظة مرور S_1 من النقطة B يفصل الخيط عن S_1 ويتابع هذا الأخير حركته

فوق السكة فيمر من النقطة C بسرعة $v_C = v_B = 3\text{m.s}^{-1}$.

2-1 - بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك، عبر عن معامل الاحتكاك K بين S_1 والجزء

BC بدلالة α احسب K .

2-2 - استنتج شدة القوة \bar{R} التي يطبقها الجزء BC على S_1 أثناء حركته.

3 - يتبع الجسم S_1 حركته بنفس السرعة v_C فوق الجزء الأفقي CD .

3-1 - عبر عن سرعة S_1 في نقطة M من السكة معلومة بالزاوية $\theta = (\overrightarrow{OD}; \overrightarrow{OM})$

بدلالة v_C و r' و θ و g .

3-2 - عبر عن شدة القوة \bar{R} التي تطبقها السكة على S_1 عند M بدلالة

v_C و r' و θ و g و m_1 .

3-3 - حدد النقطة التي يغادر عنها S_1 السكة علماً أن سرعته عند النقطة D تأخذ


القيمة $v_2 = 4\text{m.s}^{-1}$.

تصحيح:

1 - بتطبيق العلاقة المستقلة عن الزمن على الجسم S_1 بين A و B :

$$(1) \quad v_B = \sqrt{2.a.AB}$$

$$\Leftrightarrow v_A = 0 \quad \text{مع} \quad v_B^2 - v_A^2 = 2.a.AB$$



بتطبيق العلاقة الأساسية للتحريك على البكرة : تم تحميل هذا الملف من موقع Talamidi.com ومنه :

$$(a) \quad T' = \frac{J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}}{r}$$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S لدينا : أي $\sum \vec{F} = m_1 \vec{a}_G$ بالأسقاط على المحور x' أي $\vec{P}_1 + \vec{R} + \vec{T} = m_1 \vec{a}_G$ وبما أن الخيط غير قابل للمد فإن $T' = T$ ومنه $-P_1 \cdot \sin \alpha + 0 - T = m_1 \cdot a$

$$m_1 \cdot \sin \alpha - \frac{J_{\Delta} \cdot a}{r^2} = m_1 \cdot a \quad \Leftrightarrow \quad a = r \cdot \ddot{\theta} \quad \text{وبالتغيير في العلاقة (1)} \quad a = \frac{m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha}{J_{\Delta} + m_1} \quad \text{ومنه} \quad a \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m_1 \right) = m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2 \cdot m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot AB}{m_1 + \frac{J_{\Delta}}{r^2}}}$$

وبالتغيير في العلاقة (1)

$$a = \frac{m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha}{J_{\Delta} + m_1}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2 \times 0,9 \times 10 \cdot \sin 30 \times 1}{0,9 + \frac{10^{-3}}{0,1^2}}} = 3 \text{ m/s}$$

تطبيق عددي :

أو بطريقة أخرى :

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على (ك) بين المختصتين t_A و t_B :

$$\frac{1}{2} m_1 (v_B^2 - v_A^2) = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{T}) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} m_1 v_B^2 - \frac{1}{2} m_1 v_A^2 = \sum W(\vec{F})$$

* نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على البكرة بين المختصتين t_A و t_B :

$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_B^2 - \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_A^2 = W(\vec{P}') + W(\vec{T}') + W(\vec{R}')$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_B^2 = m_1 g \sin \alpha - \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_B^2 \quad \text{نحصل على: (1)}$$


و بما أن الخيط لا يزال قابلا للامتداد ، فإن $\omega_B = v_B$

$$\frac{1}{2} v_B^2 \left(m_1 + \frac{J_{\Delta}}{r^2} \right) = m_1 g AB \sin \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} m_1 v_B^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \frac{v_B^2}{r^2} = m_1 g AB \sin \alpha$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2 m_1 g \cdot AB \cdot \sin \alpha}{m_1 + \frac{J_{\Delta}}{r^2}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,9 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ}{0,9 + \frac{10^{-3}}{(0,1)^2}}} = 3,0 \text{ m/s}$$

- 1-2 بما أن الجسم S_1 يصل إلى النقطة C بسرعة $V_C = V_B = 3 \text{ m/s}$ فإن حركته على الجزء BC مستقيمية منتظمة : أي تسارعه منعدم .

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ وبما أن الاحتكاكات غير مهملة بين C و B فإن القوة \vec{R} المقورة بتاثير سطح التماس مائلة فيعكس منحى الحركة ولها مركبتين ، مماسية $R_T = R_T$ و منظمية R_N . انظر الشكل .



المجموعة شبه معزولة ينطبق عليها مركز القصور .

$$\vec{P}_1 + \vec{R} = \vec{0} \quad \text{وبذلك يصبح لدينا:}$$

$$R_T = m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha \quad \Leftrightarrow \quad + P_1 \cdot \sin \alpha - R_T = 0 \quad \text{بالأسقاط على المحور } x'$$

$$R_N = m_1 \cdot g \cdot \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad - P_1 \cdot \cos \alpha + R_N = 0 \quad \text{بالأسقاط على المحور } y'$$

$$\varphi = \alpha = 30^\circ \quad k = \tan \varphi = \frac{R_T}{R_N} = \frac{m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha}{m_1 \cdot g \cdot \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan 30 = 0,58$$

$$R = \sqrt{R_T^2 + R_N^2} = \sqrt{(m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha)^2 + (m_1 \cdot g \cdot \cos \alpha)^2} = m_1 \cdot g = 0,9 \cdot 10 = 9 \text{ N} \quad - 2-2$$

$$R = P_1 = m_1 \cdot g = 9 \text{ N} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{P}_1 + \vec{R} = \vec{0}$$

بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم S بين D و M لدينا :

(b)

$$E_{CM} - E_{CD} = m_1 \cdot g(z_D - z_M) + 0 \quad \Leftarrow \quad \Delta E_C = \sum_{D \rightarrow M} \vec{W}P_1 + \vec{WR}$$

$$\Delta E_C = \sum_{D \rightarrow M} \vec{WF}$$

$$z_D - z_M = 0 - r'(1 - \cos \theta) = -r'(1 - \cos \theta)$$

$$\Leftarrow z_M = DM' = h = r' - r' \cos \theta = r'(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{1}{2} m_1 (v_M^2 - v_D^2) = -m_1 \cdot g \cdot r(1 - \cos \theta)$$

تعويض في (b)


$$v_M = \sqrt{v_C^2 - 2 \cdot g \cdot r(1 - \cos \theta)}$$

$$\text{وبما أن } v_D = v_C$$

$$v_M^2 - v_D^2 = -2 \cdot g \cdot r(1 - \cos \theta)$$

أي : 2-3 باعتبار معلم فيريني

. وبتطبيق القانون الثاني لنيوتون على S.



$$R = m_1 \cdot g \cdot \cos \theta + m_1 \cdot \frac{v_M^2}{r'} : \text{ ومنه} \quad R - P_1 \cdot \cos \theta = m_1 \cdot \frac{v_M^2}{r'} : \text{ بالإسقاط على المنظمي}$$

$$\vec{P}_1 + \vec{R} = m_1 \cdot \vec{a}_G$$

$$R = m_1 \cdot g \cdot \cos \theta + m_1 \left[\frac{v_D^2}{r'} - 2 \cdot g(1 - \cos \theta) \right] \Leftarrow v_M^2 = v_D^2 - 2 \cdot g \cdot r(1 - \cos \theta)$$

$$R = 3m_1 \cdot g \cdot \cos \theta + m_1 \frac{v_C^2}{r'} - 2 \cdot m_1 \cdot g = m_1 \cdot g \left[3 \cos \theta - 2 + \frac{v_D^2}{r' \cdot g} \right] \Leftarrow R = m_1 \cdot g \cdot \cos \theta + m_1 \frac{v_D^2}{r'} - 2 \cdot m_1 \cdot g + 2 \cdot m_1 \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$v_D = v_2 = 4 \text{ m/s}$$


$$R = 0$$

عند مغادرة المستوى المائي يكون تأثير السكة منعدما :

$$\theta = \pi \Leftarrow \cos \theta = \frac{2}{3} - \frac{v_2^2}{3 \cdot r' \cdot g} = \frac{2}{3} - \frac{4^2}{3 \times 0,32 \times 10} = -1 : \text{ ومنه}$$

$$3 \cdot \cos \theta - 2 + \frac{v_2^2}{r' \cdot g} = 0$$

الجسم يغادر السكة عند النقطة E.



2 - التمرين الثاني :


نعتبر المجموعة الممثلة في الشكل (1) حيث

- بكرة منجلة شعاعها $r = 5 \text{ cm}$ قبلةللدوران في مستوى رأسى حول محور لقى (Δ) ثابت يمر من مركزها. عزم قصور الكرة بالنسبة للمحور (Δ) هو $J_\Delta = 2 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^2$ كتلتها

- كرية صلبة مركز قصورها G كتلتها

 $m = 0,1 \text{ kg}$ مرتبطة بطرف خيط غير قابل للأمتداد و كتلته ممولة ملفوف حول محور

للكرة. يمكن للكرية (S) أن تنزلق على سكة ABCD لقى، هذه السكة مكونة من جزء مستقيم AB

و قوس دائري BC من دائرتين مركزها I و شعاعها $R = 1 \text{ m}$. نعتبر أن الاحتكاك على السكةبالتالى $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي و جزء ABCD من دائرة مركزها I و شعاعها $R = 1 \text{ m}$. نعتبر أن الاحتكاك على السكة بهملة و لن الخيط لا ينزلق على مجرى المثلثة و نأخذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.1- نحرر المجموعة في لحظة نعتبرها $t=0$ قبل اللتواريج $t=0$, فتنزلق الكرية بدون سرعة بدئية من الموضع A الذي يطبق لصل المعلم ($A, 0, 0$) وتمر في اللحظة ذات التاريix $t=2,7 \text{ s}$ من الموضع B بالسرعة v_B . نعلم موضع G في كل لحظة بالا فصول x

يمثل المنحنى في الشكل (2) تغيرات سرعة G بدلالة الزمن.

1.1- حد طبيعية حركة كل من (S) و (P).

1.2- حد قيمة v_B .

2- تفصل الكرينة عند مرورها من الموضع B في التاريخ t_1 عن الخط

توقف البكرة (P) بعد قيازها 10 دورات ليبدأ من التاريخ t_1 .

2.1- لحساب السرعة الزاوية للبكرة في التاريخ t_1 .

2.2- علماً أن البكرة تتضاعف لمزدوجة مقاومة عزمها M ثابت.

لحساب قيمة M .

3- بعد تفصيلها عن الخط ينزلق الكرينة على الجزء BCD من السكة ، حيث تمرس حركة مركز ثورتها G . نأخذ $R \approx R$.

3.1- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية، لوجد تعبير v_C سرعة الكرينة عند مرورها بالموضع C بدلالة R و g و a_B .

لحساب قيمة v_C .


3.2- بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك، لوجد تعبير شدة القوة F التي تؤثر بها السكة BCD على الكرينة في الموضع C .

لحساب F بدلالة R و g و a_B .

تصحيح

1-1- حركة S مستقيمية متغيرة بانتظام متتسارعة بينما حركة البكرة P دورانية متغيرة بانتظام.

1-2- بما أن الجسم يمر من الموضع B عند اللحظة $t=2,7s$ بالسرعة v_B نجد مبيانياً :



$$\text{نجد } v_B = 1,5 \text{ m/s}$$

$$k = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1-0}{1,8-0} = \frac{5}{9} \approx 0,56 \quad \text{مع : } v = k \cdot t$$

$$\text{ومنه : } v_B = \frac{5}{9} \cdot t = \frac{5}{9} \times 2,7 = 1,5 \text{ m/s} \quad a = \frac{dv}{dt} = 0,56 \text{ m/s}^2 \quad v = 0,56 \cdot t$$

$$\omega_1 = \frac{v_B}{r} = \frac{1,5}{0,05} = 30 \text{ rad/s} \quad \text{- 2-1-2}$$

2-2- بتطبيق العلاقة المستقلة عن الزمن على البكرة بين لحظة انفلات الحبل ولحظة التوقف :

$$\ddot{\theta} = \frac{-\omega_1^2}{4\pi \cdot n} \Leftarrow -\omega_i^2 = 4 \cdot \ddot{\theta} \cdot \pi \cdot n \quad \Leftarrow \Delta\theta = 2 \cdot \pi \cdot n \quad \text{و: } \omega_f = 0 \quad \text{مع : } \omega_f^2 - \omega_i^2 = 2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \Delta\theta$$

بتطبيق العلاقة الأساسية للتحريك على البكرة : أي : $\sum M_F = J_{\Delta} \ddot{\theta}$ أي : $M \bar{P} + M \bar{R} + M = J_{\Delta} \ddot{\theta}$

$$M = -\frac{J_{\Delta} \cdot \omega_1^2}{4\pi \cdot n} = -\frac{2 \cdot 10^{-3} \times 30^2}{4\pi \cdot 10} = -1,4 \cdot 10^{-2} \text{ N.m} \quad \text{ومنه :}$$

الطريقة الثانية :

***بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على البكرة بين لحظة انفلات الحبل ولحظة التوقف :**

$$\Delta\theta = 2 \cdot \pi \cdot n \quad \text{مع : } 0 - \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega_i^2 = 0 + 0 + M \cdot \Delta\theta \quad \Leftarrow E_{C,f} - E_{C,i} = W_{i \rightarrow f} \bar{P} + W_{i \rightarrow f} \bar{R} + W_{i \rightarrow f} C_f r o t t$$


$$M = -\frac{J_{\Delta} \cdot \omega_1^2}{4\pi \cdot n} = -\frac{2 \cdot 10^{-3} \times 30^2}{4\pi \cdot 10} = -1,4 \cdot 10^{-2} \text{ N.m} \quad \text{ومنه :}$$

$$\Delta E_C = \sum_{B \rightarrow C} W_F \quad . C$$

3-

بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على الكرينة بين B و C .

$$z_B = r - r \cos \alpha \quad \text{مع:} \quad z_C = 0 \quad E_{CC} - E_{CB} = mg(z_B - z_C) + 0$$



$$\begin{aligned} v_C &= \sqrt{v_B^2 + 2gR(1-\cos\alpha)} \quad \text{ومنه:} \quad v_C^2 - v_B^2 = 2gR(1-\cos\alpha) \iff \frac{1}{2}m.v_C^2 - \frac{1}{2}m.v_B^2 = m.gR(1-\cos\alpha) \\ &\therefore v_C = \sqrt{(1,5)^2 + 2 \times 10 \times 1 \cdot (1-\cos 30)} = 2,22 \text{ m/s} \end{aligned}$$


2-3- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكريمة على الجزء BCD



تخضع الكريمة لوزنها: \vec{P} وللقوة: \vec{F} المطبقة من طرف سطح التماس وهي عمودية على السطح.

$$F = m(g + \frac{v_c^2}{R}) = 0,1 \times \left[10 + \frac{(2,22)^2}{1} \right] = 1,49 \text{ N} \quad \leftarrow \quad \text{بالأسفاط على المنظمي:} \quad F - P = m \cdot \frac{v_c^2}{R} \quad \vec{F} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

(3) التمرین الثالث:




1- تتكون المجموعة الممثلة في الشكل 1 من:

- جسم صلب S_1 كتلته M_1 ينزلق بدون

احتكاك فوق منصة أفقية.

- جسم صلب S_2 كتلته M_2 مرتبط بالجسم S_1 بواسطة خيط غير قابل للامتداد وكتلته مهملة.

- بكرة (P) كتلتها M وشعاعها R قابلة للدوران بدون احتكاك حول محورها (A) ويمر عبر مركز اثراها الخيط الذي تعتبره لا ينزلق خلال الحركة. نحرر المجموعة عند اللحظة $t=0s$ بدون سرعة ابتدائية بحيث ينطلق الجسم S_1 من نقطة أقصى لها على المحور OX هو $0,5 \text{ cm}$ ونحدد تغيرها V



سرعة S_1 بدلالة الزمن فنحصل على الشكل 2.

1-1- اكتب التعبير العددي ل V_1 بدلالة الزمن.

1-2- استنتج طبيعة حركة S_1 واعط معادلتها

$$x = f(t)$$

1-3- بين أن L_1 و S_2 نفس التسارع a .

1-4- بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك على كل من S_1 و S_2 و (P)، أوجد العلاقة بين التسارع

$$I = M_1 = M_2 = M \quad \text{و شدة التقلل} \quad J = \frac{1}{2}MR^2 \quad \text{بالنسبة للمحور (A)}$$

تصحيح التمرین الثالث:

1.1 - حسب مبيان الشكل تم تحميل صنف من موقع Talamidi.com


$$K = \frac{\Delta V_1}{\Delta t} = \frac{4-0}{1-0} = 4 \text{ m.s}^{-2}$$

حيث K المعامل الموجي للستقيم :

2.1 - المسار مستقيم و التسارع ثابت السرعة تزايديه .
ما ذنب المركبة مستقيمية متزايدة بانتظام ، معادلتها الزمنية :
 $x + v_0 t + \frac{1}{2} a_1 t^2 = x_0$ خدد الثوابت x_0 و a_1 انطلاقاً من الشروط البدئية

$$x = 2t^2 + 5.10^{-3} \quad \text{عند } t=0, \text{ تكون } x_0 = 0.5 \text{ cm} \quad \text{إذن :}$$


3.1 - ما ذنب الخطأ الرابط بين (S_1) و (S_2) غير قابل للامتداد، فإنه عند انتقال S_2 بالمسافة x ينتقل (S_2) بالمسافة x حيث $x_1 = x_2$ في كل لحظة .
نستقر $x_1 = x_2$ بالنسبة للرصم ، $x_1 = x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ أي أن $a_1 = a_2 = a = 4 \text{ m.s}^{-2}$



الجامعة المدروسة { الجسم S_1 } ينبع (2) خلا لحركته \vec{P}_1 و وزنه \vec{R}_1 : تأثير المسطح الافقى
الجامعة المدروسة { الجسم S_2 } ينبع (2) خلا لحركته \vec{P}_2 و وزنه \vec{R}_2 : تأثير المحيط (1)
بنطبيق القانون الثاني لنيوتون على S_1 : $\vec{T}_1 = M_1 a$: $x' = \vec{P}_1 + \vec{R}_1 + \vec{T}_1 = M_1 \vec{a}$ نسقط على x'
بنطبيق القانون الثاني لنيوتون على S_2 : $T_2 = M_2 g - Ma$ $M_2 g - T_2 = Ma$: $y' = \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = M_2 \vec{a}$

الجامعة المدروسة { البكرة } ينبع (2) خلا لحركته \vec{P} و وزنها .

بنطبيق القانون الثاني لنيوتون على R : $\vec{T}_1 = M_1 a$: تأثير محور الدوران .
 $\vec{T}'_2 = T_2$: تأثير المحيط (1)
 $\vec{T}'_1 = T_1$: تأثير المحيط (2)



$$M_0(\vec{P}) = 0 \quad M_0(\vec{R}) = 0 \quad \text{مع : } 0 = J_\Delta \ddot{\theta} + M_0(\vec{P}) + M_0(\vec{R}) + M_0(\vec{T}_1) + M_0(\vec{T}_2) = J_\Delta \ddot{\theta} + 2T'_2 - 2T'_1$$

المحيط لا ينزلق على البكرة :

$$J_\Delta \cdot \frac{a}{r} = r M_2(g-a) - r M_1 a \quad \text{حصل على :}$$

$$a \left(\frac{J_\Delta}{r^2} + M_2 + M_1 \right) = M_2 g$$

$$a = \frac{M_2}{\frac{J_\Delta}{r^2} + M_2 + M_1} \cdot g$$

$$J_\Delta = \frac{1}{2} M r^2 \quad M_1 = M_2 = M : \text{مع :}$$

$$a = \frac{M}{5 \cdot \frac{M}{2}} \cdot g = \frac{2}{5} g \quad \text{نكتب :}$$