

التوالد عند النباتات

التوالد عند الكائنات الحية هو وظيفة تمكن من نقل الحياة من الآباء إلى الأبناء، وتهدف هذه الوظيفة إلى استمرارية الحياة، والحفاظ على التنوع البيولوجي عبر الأجيال.

تتميز الحميلات البيئية بتنوع هائل، فمن بين العشيرة الإحيائية التي تعيش بداخلها نجد النباتات الزهرية التي تصنف إلى نوعين: كاسيات البذور **Les angiospermes**، وعاريات البذور **Les gymnospermes**، والنباتات اللازهرية كالطحالب **Les algues**، والسرخسيات **Les fougères**، والحزازيات **Les mousses** وتتكاثر هذه النباتات عن طريق التوالد الجنسي والتوالد اللاجنسي.

- كيف تتوالد هذه النباتات وما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التوالد؟
- ما هي الآليات التي تقود من الزهرة إلى البذرة؟
- كيف تؤمن البذرة تكون نبات جديد؟

الفصل الأول:

التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية

تمهيد: تتميز النباتات الزهرية بوجود الزهرة التي تعتبر جهاز التوالد لدى هذه النباتات.

- كيف تتوالد النباتات الزهرية؟ وما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التوالد؟
- ما الآليات المؤدية إلى تشكل المشيج الذكري والمشيج الأنثوي عند النباتات الزهرية؟
- أين وكيف يتم الإخصاب عند النباتات الزهرية؟
- كيف يتم تشكل البذرة وكيف يتم إنباتها؟

I – التوالد الجنسي عند كاسيات البذور.


النباتات كاسيات البذور هي نباتات زهرية تتميز أساسا بكونها تنتج بذورا محفوظة داخل الثمرة.

① تعضي الزهرة عند كاسيات البذور

أ – ملاحظة أزهار مختلفة: أنظر الوثيقة 1.

الوثيقة 1: أمثلة لأزهار كاسيات البذور.

تعرف وقرن مختلف أصناف الأزهار المدرجة في الوثيقة. ماذا تستنتج من هذه الملاحظات؟



هناك تنوع كبير فيما يخص الأزهار عند كاسيات البذور، حيث نجد:


- تنوع في لون، شكل، عدد، وتموضع أعضاء الزهرة.
- أزهارا بسيطة (زهرة البرتقال) وأخرى مركبة من عدة زهرات تتوفر كل واحدة على الأعضاء الزهرية الموجودة عند الزهرة البسيطة (زهرة دوار الشمس).
- أزهار ثنائية الجنس Bisexuée تحمل الأعضاء الذكرية والأنثوية (زهرة البرتقال)، وأخرى أحادية الجنس Monosexuée تحمل أعضاء ذكرية أو أنثوية (زهرة الكوسى).

لكن رغم تنوع شكلها الخارجي، تتميز أزهار كاسيات البذور بوحدة التعضي.

ب - تشريح زهرة البرتقال: أنظر الوثيقة 2.

الوثيقة 2: تشريح زهرة كاسيات البذور.

انطلاقاً من تشريح عدة أزهار كاسيات البذور، بين ان هذه الأخيرة رغم تنوعها فإنها تتميز بوحدة التعضي.



تتمثل دراسة الزهرة في انجاز مقطع طولي، وأخطوط زهري لتعرف مختلف عناصرها وتمثيلها.

a - ملاحظة وتشريح الزهرة:

تتشكل الزهرة عند كاسيات البذور من:


* أعضاء وقائية:

- الكأس (Le calice) وهو مجموع السبلات (Les sépales)، تكون إما ملتحمة أو منفصلة.
- التويج (Le Corolle) وهو مجموع الأوراق التويجية التي تسمى البتلات (Les pétales). تكون ملتحمة أو منفصلة.

* أعضاء التوالد:

- أعضاء ذكرية: الكش (L'androcée) وهو عبارة عن مجموعة من الأسدية (Les étamine)، وتتكون كل سداة من خويط filet ومثبر Anthère .
- أعضاء أنثوية: المدقة (Le gynécée) وهو عبارة عن كربلة (Carpelle) أو مجموعة من الكربلات، حيث تتكون الكربلة من مبيض، قلم، وميسم.

b - انجاز الأخطوط الزهري: أنظر الوثيقة 3.




الأخطوط الزهري هو تمثيل لمختلف القطع الزهرية على دوائر مع ترتيبها واحترام تموضعها بالنسبة لبعضها البعض.

② تعضي جهاز التوالد عند كاسيات البذور.





أ - السداة جهاز التوالد الذكري:

a - تعضي جهاز التوالد الذكري: أنظر الوثيقة 4.

الوثيقة 4: السداة جهاز توالد ذكري ينتج حبوب اللقاح.



الشكل 1 يبين الشكل الخارجي لسداة.
 الشكل 2 صورة لمقطع عرضي لمنبر فتي.
 الشكل 3 صورة لمقطع عرضي لمنبر ناضج.
 الشكل 4 ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي للمنبر.
 الشكل 5 ملاحظة مقطع عرضي لكيس اللقاح.
 الشكل 6 ملاحظة الخلايا الأم لحبوب اللقاح.
 انطلاقا من معطيات هذه الوثيقة، تعرف تعضي جهاز التوالد الذكري وتعرف بنية حبة اللقاح.



عناصر الشكل 4 من الوثيقة: ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي للمنبر
 1 = خلايا أم لحبوب اللقاح Grains de pollen ، 2 = كيس لقاحي Sac pollinique ،
 3 = شق الانفلاق Fente de déhiscence .

عناصر الشكل 5 من الوثيقة: ملاحظة مقطع عرضي لكيس اللقاح
 1 = حبة اللقاح . 2 = البشرة . Epiderme 3 = طبقة آلية . Assise mécanique .
 4 = طبقة مغذية . Assise nourricière .

عناصر الشكل 6 من الوثيقة: ملاحظة الخلايا الأم لحبوب اللقاح
 1 = مرحلة خليتين . 2 = مرحلة أربع خلايا . (رباعية)

عناصر الشكل 8 من الوثيقة: رسم تخطيطي لحبة لقاح
 1 = سيتوبلازم . 2 = نواة الخلية الانباتية . 3 = غشاء داخلي Intine . 4 = ثقب Pore .
 5 = غشاء خارجي Exine . 6 = خلية توالدية Cellule reproductrice = 7 = سيتوبلازم .
 8 = نواة الخلية التوالدية .

حصيلة الملاحظات:

تتكون السداة من خويط ينتهي بمنبر. كل منبر يكون من أربعة أكياس لقاحية محاطة بثلاث طبقات: البشرة في الخارج، وطبقة مغذية في الداخل بينها طبقة آلية. تتشكل حبوب اللقاح داخل الأكياس اللقاحية ثم تتحرر خلال مرحلة النضج عبر شق يسمى شق الانفلاق. تتكون حبة اللقاح الناضجة من خليتين: خلية كبيرة تسمى خلية إنباتية و خلية صغيرة تسمى خلية توالدية.

b - تشكل حبوب اللقاح:


★ تختلف حبوب اللقاح من حيث الحجم والشكل حسب نوع النبات، إذ يمكن أن تكون كروية أو بيضاوية، ملساء أو مشوكة.
بالمجهر الضوئي تبدو حبة اللقاح مكونة من نواتين، نواة توالدية ونباتية. يعني أن حبة اللقاح تتكون من خليتين: خلية أنبائية وخلية توالدية.

★ خلال تشكلها، تتعرض الخلايا الأم لحبوب اللقاح لانقسام خاص يسمى الانقسام الاختزالي، أنظر الوثيقة 5.

الوثيقة 5: دور الانقسام الاختزالي في تشكل حبوب اللقاح.

تتوفر الخلية الأم لحبة اللقاح على صبغيات متماثلة، تتجمع على شكل أزواج. نقول أنها خلية ثنائية الصيغة الصبغية (عدد صبغياتها $2n$). خلال الانقسام الاختزالي *Méiose* (الشكل أ) تتعرض الخلية الأم لانقسامين متتاليين:


- خلال الانقسام الأول تتفرد الصبغيات المتماثلة لنحصل على خليتين تتوفر كل واحدة على نصف عدد الصبغيات (n)، فنقول أنها أحادية الصيغة الصبغية.
- خلال الانقسام الثاني، نحصل على أربع خلايا متشابهة وأحادية الصيغة الصبغية (n). تتعرض نواة كل خلية لانقسام غير مباشر (الشكل ب) لتعطي حبة لقاح تتشكل من خليتين أحاديتي الصيغة الصبغية.



يتميز الانقسام الاختزالي بكونه يتم عبر انقساميين متتاليين، الشيء الذي يمكننا من المرور من خلية ثنائية الصيغة الصبغية ($2n$) إلى أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n).

★ تتشكل حبوب اللقاح داخل المآبر حسب المراحل الأساسية التالية: أنظر الوثيقة 6.

الوثيقة 6: مراحل تشكل حبوب اللقاح.







- تكون الخلايا الأم لحبوب اللقاح ثنائية الصيغة الصبغية من خلال انحدارها من إحدى خلايا المنبر.
- تتعرض الخلايا الأم ($2n$) لانقسام اختزالي فتعطي 4 خلايا تسمى بويغات أحادية الصيغة الصبغية (n)
- تنقسم نواة كل بويغ بانقسام غير مباشر لتعطي نواة أنبائية ونواة توالدية.
- بعد مجموعة من التحولات خلال مرحلة تسمى مرحلة التفريق، يتحول كل بويغ إلى حبة لقاح مكونة من خليتين إحداهما إنبائية والأخرى توالدية.

ب – المدقة جهاز التوالد الأنثوي:

a – تعضي جهاز التوالد الأنثوي: أنظر الوثيقة 7.

الوثيقة 7: المدقة جهاز توالد أنثوي ينتج الكيس الجنيني.


انطلاقاً من معطيات هذه الوثيقة، تعرف تعضي جهاز التوالد الأنثوي وتعرف بنية المبيض، الببيضة والكيس الجنيني.



- تتشكل المدقة (Gynécée (Pistil) من ميسم Stigmate ، قلم الميسم Style، والمبيض Ovaire.
- يمكن ملاحظة عدة أشكال من المدقات حسب أنواع الأزهار.
- تبين ملاحظة مقاطع عرضية للمبيض أنه يتكون من كربلة واحدة أو عدة كربات Carpelles. فنجد مثلاً زهرة أحادية الكربلة أو متعددة الكربات.
- تحتوي كل كربلة على بيبيضة أو أكثر Ovules، ترتبط بالمشيمة Placenta بواسطة الحبل السري Funicule وتتكون من نسيج يسمى الجويضة Nucelle، تحتوي في جزئها الأعلى على الكيس الجنيني. ويحيط بالجويضة غشاءان يحددان فتحة صغيرة تسمى النقير Micropyle.
- ينتج الكيس الجنيني Sac embryonnaire انطلاقاً من تكاثر خلايا الجويضة.

b – تشكل الكيس الجنيني: أنظر الوثيقة 8.

الوثيقة 8: مراحل تشكل الكيس الجنيني.



عناصر الوثيقة:

- 1 = الخلية الأم للكيس الجنيني. 2 = ثلاثة أبواغ ضامرة. 3 = بوع كبير
 4 = الانقسام الأول. 5 = الانقسام الثاني. 6 = الانقسام الثالث. 7 = خلايا معاكسة.
 8 = نواتا الكيس الجنيني. 9 = ببيضة غير ملقحة. 10 = خليتان مساعدتان.
 1 = انقسام اختزالي، 2 و 3 و 4 = انقسامات غير مباشرة، 5 = تشكل الكيس الجنيني.

يتشكل الكيس الجنيني عبر المراحل الأساسية التالية:

- تتعرض احدى خلايا الجوزة للتفريق فتعطي الخلية الأم للكيس الجنيني، تكون ثنائية الصيغة الصبغية.
- تتعرض الخلية الأم للانقسام الاختزالي فتعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n)، تنحل ثلاثة منها وتبقى واحدة.
- تتعرض نواة الخلية المتبقية لثلاث انقسامات غير مباشرة فتعطي 8 نوى أحادية الصيغة الصبغية (n).
- تتفرق هذه الخلية فتتوزع النوى الثمانية على سبع خلايا تعطي الكيس الجنيني وهذه الخلايا هي:

- ✓ ببيضة غير ملقحة والتي تقوم مقام المشيخ الأنثوي تتموضع قرب النقيير.
- ✓ خليتان مساعدتان تحيطان بالبويضة غير الملقحة.
- ✓ ثلاث خلايا معاكسة تتموضع بالقطب المعاكس.
- ✓ خلية مركزية تضم نواتين.

ج - خلاصة:


- تخضع الكائنات الحية عامة والنباتات خاصة لنوعين من الانقسامات، حسب طبيعة الوظيفة المؤهلة للقيام بها ورميز بين:
- الانقسام غير المباشر: يمكن من تكاثر وتضاعف خلايا الكائنات الحية، دون تغيير صيغتها الصبغية. حيث تنقسم كل خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2n) إلى خليتين ثنائيتي الصيغة الصبغية (2n).
 - الانقسام الاختزالي وهو ظاهرة تخضع لها الخلايا التي تلعب دورا في التوالد الجنسي، لتعطي أمشاجا أحادية الصيغة الصبغية، وذلك للحفاظ على ثبات عدد الصبغيات بعد الإخصاب. ويتميز بانقسامين متتاليين لخلية أم ثنائية الصيغة الصبغية (2n)، لنحصل على أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n).

3 الأبر، أنواعه وأهميته الزراعية.

أ - الأبر وأنواعه: أنظر الوثيقة 9

الوثيقة 9: دور الأسدية والمدقة في تكون الثمرة

لدينا أربع نباتات من الخزامى 1، 2، 3، و 4، كما هو مبين على الرسم أسفله.



1 : نترك الأزهار عادية (شاهدة).

النتيجة: تحول المدقة إلى ثمرة تحتوي على بذور.

2 : نغطي مدقة الزهرة بستار شفاف، قبل نضج الأسدية. النتيجة: عدم تحول المدقة إلى ثمرة.

3 : نرج سداة هذه الزهرة فوق الميسم، قبل تغطية المدقة بستار شفاف، النتيجة: تحول المدقة إلى ثمرة تحتوي على بذور.


4 : نرج سداة زهرة البنفسج فوق ميسم زهرة الخزامى، قبل تغطية مدقة الخزامى بستار شفاف، النتيجة: عدم تحول المدقة إلى ثمرة.

1) ماذا تستنتج من هذه التجربة؟


2) كشفت هذه التجربة عن ظاهرة أساسية في حياة الزهرة. سم هذه الظاهرة، وأعط تعريفا لها.

3) بالاعتماد على ما سبق وعلى الوثائق التالية، أذكر أنواع هذه الظاهرة.


(تابع) الوثيقة 9: دور الأسدية والمدقة في تكون الثمرة



أزهار ذكورية
أزهار أنثوية
أبر غير مباشر
أبر مباشر




الأبر غير المباشر




الأبر المباشر


عند نبات الذرة تتموضع الأسدية بالأزهار الذكورية والمدقات بالأزهار الأنثوية في مستويين مختلفين.




الأبر عن طريق الرياح



الأبر عن طريق الطيور



أبر أزهار نبات القويصة بواسطة النحل



تدخل الإنسان في عملية الأبر

- 1) نستنتج من هذه التجربة أن حبوب اللقاح يجب أن تصل إلى مياسم الأزهار لتتحول إلى ثمار ثم بدور. وأن حبوب اللقاح هذه يجب أن تكون لزهرة من نفس النوع.
- 2) الظاهرة التي تكشف عنها هذه التجربة هي ظاهرة الأبر La pollinisation ، ويتمثل الأبر في نقل حبوب اللقاح من المثير والتصاقها بميسم زهرة من نفس النوع.
- 3) يتم الأبر بعدة عوامل مثل: الرياح، الجاذبية، الماء بالنسبة للنباتات المائية، بعض الحيوانات خاصة الحشرات، الإنسان. ونميز بين نوعين من الأبر:
 - الأبر المباشر أو الذاتي: عندما يتم نقل حبوب اللقاح من أسدية زهرة إلى مدقة نفس الزهرة. ويكون هذا الأبر ممكنا في حالة الأزهار ثنائية الجنس.
 - الأبر غير المباشر أو المتقاطع: عندما يتم نقل حبوب اللقاح من أسدية زهرة إلى مدقة أخرى من نفس النوع. ويكون الأبر المتقاطع ضروريا بالنسبة للأزهار الأحادية الجنس مثل النخيل. ولبعض الأزهار الثنائية الجنس، نظرا لوجود بعض المعوقات الفيزيولوجية، كعدم النضج المتزامن لكل من الأسدية والمدقات، والمعوقات الشراحية كقصر الأسدية بالمقارنة مع المدقة.

ب - الأبر وأهميته الزراعية: أنظر الوثيقة 10

الوثيقة 10: أهمية الأبر في الميدان الفلاحي

- ★ جرت العادة في واحات النخيل أن يقوم الفلاحون بقطع أزهار النخيل الذكر، وتحريكها فوق أزهار النخيل الأنثوي
- ★ يلجأ الباحث إلى تقنية الأبر الاصطناعي عندما يرغب في انتقاء سلالات نباتية جيدة، أو عند انجاز تزاوجات مرغوب فيها، حيث يستأصل الأسدية ويحفظ الأزهار المبتورة بأكياس بلاستيكية. ويمكن تخصيبها يدويا بحبوب اللقاح المختارة.
- ★ نقوم بقياس كمية إنتاج البذور لدى أزهار نبات عباد الشمس، وذلك حسب المسافة بين حقل التجربة وخلايا النحل. نتائج هذه الملاحظات مدونة على الجدول التالي.

200 - 160	160 - 120	120 - 100	100 - 80	40 - 0	المسافة بm بين خلايا النحل وحقل التجربة
1000	1000	1100	1200	1400	إنتاج البذور ب Kg/ha بحقل التجربة
800					إنتاج البذور ب Kg/ha بحقل شاهد


انطلاقا من هذه المعطيات بين أهمية الأبر في الميدان الزراعي.

يتبين من معطيات هذه الوثيقة أن الأبر يلعب دورا أساسيا في الميدان العلمي والفلاحي. نلاحظ أنه كلما كانت المسافة بين خلايا النحل وحقل التجربة قصيرة، إلا وكانت المرودية كبيرة. أي كلما ساهم عدد كبير من النحل في ظاهرة الأبر تزداد المرودية. إذن للأبر أهمية كبيرة في الميدان الزراعي، يعني أن هناك ارتباط وثيق بين المرودية الزراعية وظاهرة نقل حبوب اللقاح إلى مياصم الأزهار.

④ إنبات حبوب اللقاح. أنظر الوثيقة 11

الوثيقة 11: الكشف عن الانتحاء الكيميائي لأنبوب اللقاح

نقوم بتهيء محلول جيلاتيني سكري (10 غرام من السكر + 2 غرام من الجيلاتين + 100 cm³ من الماء).



نضع الخليط في علبه بتري. نضع في مركز الإناء قطعة ميسم زهرة، ثم نرج مئبرا ناضجا فوق الجيلاتين. نقوم بتبليل سطح الجيلاتين بقطرات من الماء. نترك الإناء في وسط درجة حرارته 28°C، وبعد يومين، نلاحظ بواسطة المكبر الزوجي النتائج المحصل عليها (أنظر الشكل أ).

(1) صف توجه أنابيب اللقاح كلما اقتربت من الميسم. كيف تفسر ذلك؟



تمكن ملاحظة مقاطع طولية للكربلات من تتبع مسار أنابيب اللقاح. يعطي الشكل ب رسما تخطيطيا لمسار أنابيب اللقاح داخل المدقة.

(2) حدد مسار أنابيب اللقاح أثناء إنباتها.

(3) انطلاقا من هذه المعطيات ومعلوماتك، ما هي شروط إنبات حبة اللقاح؟

يعطي الشكل ج مراحل إنبات حبة اللقاح.

(4) أبرز التحولات التي تعرفها حبة اللقاح خلال ظاهرة الإنبات.



(1) بوجود الماء والعناصر المغذية تنبت حبوب اللقاح فتحرر أنبوبا يسمى أنبوب اللقاح **Tube pollinique**، يتوجه جهة الميسم. نستنتج أن الميسم يفرز مادة كيميائية تحدد اتجاه نمو أنابيب اللقاح، نتكلم عن ظاهرة الانتحاء الكيميائي **Chimiotropisme =**

(2) في الظروف الطبيعية، تمتص حبة اللقاح الماء والعناصر المغذية الموجودة في الميسم فتنتبت، ويمتد أنبوب اللقاح داخل القلم حتى يصل إلى المبيض فيدخل عبر النقيير.

(3) يتطلب إنبات حبوب اللقاح عدة شروط منها:

- نضج حبوب اللقاح وجودتها والمرتبطة بأمد حياتها منذ تحريرها حتى وصولها الميسم.
- سقوط حبوب اللقاح على المدقة خلال فترة تكون فيها قابلة لاستقبال حبوب اللقاح.
- وجود الماء والعناصر المغذية في الميسم.
- حصول تلاؤم بين حبوب اللقاح والميسم (أن يكونا من نفس النوع).

(4) مراحل إنبات حبة اللقاح:


- بعد سقوطها على الميسم، تمتص حبة اللقاح الماء فيظهر أنبوب لقاحي.
- في بداية الإنبات، تحتل النواة الإنباتية مقدمة أنبوب اللقاح متبوعة بالخلية التوالدية.
- خلال استطالة أنبوب اللقاح داخل القلم، يتقلص حجم النواة الانباتية، بينما تخضع الخلية التوالدية لانقسام غير مباشر لتعطي مشيجين ذكريين نسميهما حبيبين مثيريين.
- عندما يصل أنبوب اللقاح إلى البويضة تكون الخلية الانباتية قد تلاشت وانحلت.

⑤ الإخصاب المضاعف وتكون البذرة وإنباتها.

أ - الإخصاب المضاعف: أنظر الوثيقة 12.

الوثيقة 12: رسوم تخطيطية توضيحية لمراحل الإخصاب عند نبات كاسي البذور.

- تبين الوثيقة ظاهرة بيولوجية تحدث على مستوى البويضة عند وصول أنبوب اللقاح إلى الكيس الجنيني.
- (1) أكتب أسماء العناصر المرقمة على هذه الوثيقة.
 - (2) صف مراحل هذه الظاهرة مبينا سلوك الصبغيات.
 - (3) بماذا تنعت هذه الظاهرة؟ علل جوابك.



(1) أسماء العناصر: أنظر الوثيقة.

(2) عندما يصل أنبوب اللقاح إلى الكيس الجنيني فإنه يلج عبر النقير إلى البويضة فيخترق الجوزة ويفرغ الحبيبين المثيريين داخل الكيس الجنيني.

★ يتحد أحد الحبيبين المثيريين (n) مع البويضة غير الملقحة (n) فينتج عن ذلك تكون بيضة ثنائية الصيغة الصبغية ($2n$) نسميها البويضة الرئيسية Oeuf principal .

★ يتحد الحي المثيري الثاني (n) مع نواتي الكيس الجنيني ($n+n$) فينتج عن ذلك تكون خلية ثلاثية الصيغة الصبغية ($3n$)، نسميها البويضة الثانوية أو البويضة التابعة Oeuf secondaire .

إذن خلال هذه الظاهرة يؤدي تجمع صبغيات الحي المثيري مع صبغيات البويضة غير الملقحة إلى استعادة الخلية الناجمة الصيغة الصبغية الثنائية ($2n$).

(3) تنعت الظاهرة بالإخصاب المضاعف $\text{Double fécondation}$ ، لأن الحبيبين المثيريين يلحقان خليتين منفردتين: البويضة غير الملقحة و خلية الكيس الجنيني.

ب - تشكل البذرة: أنظر الوثيقة 13.

الشكل أ

الوثيقة 13: تشكل بذرة نبات ذي فلتقتين.

انطلاقاً من معطيات الوثيقة، حدد التحولات التي تعرفها الزهرة بعد الإخصاب المضاعف.

الشكل ب

الشكل ج: فقدان الماء عند بذور الذرة

عدد الأيام بعد الإزهار	21	42	63	77	91
كتلة الماء ب g في كل 50 بذرة	8	10.5	8	6.3	4.4

الشكل د: التركيب الكيميائي لبعض البذور

ماء	دهنيات	بروتينات	سكريات	
14	2	25	55	بذور الفاصوليا
7	60	20	10	بذور الخروع
12	5	11	70	بذور الذرة

بعد الإخصاب تذبل وتنحل الأوراق الواقية والأسدية، تضرر الخلايا المساعدة والخلايا المعاكسة، فيتحول المبيض إلى ثمرة وتتحول البيضة إلى بذرة.

★ تتعرض البيضة الرئيسية لانقسامات غير مباشرة فتعطي البنات الأولية للجنين (الجذير، الفلقة أو الفلتقتين، البرعم النهائي).

★ تتعرض البيضة التابعة إلى انقسامات غير مباشرة فتعطي كتلة خلوية مليئة بالمدخرات الغذائية نسميها السويداء Albumen. في هذه الحالة نتحدث عن بذرة ذات سويداء.

★ تشكل السويداء والجنين ما نسمي بالبذرة.

★ تراكم البذرة خلال نضجها مدخرات سكرية، دهنية، وبروتينية. ثم تتعرض للتجفيف (فقدان الماء)، فتخضع من تبادلاتها الغذائية والتنفسية مع الوسط الخارجي لتدخل في الحياة البطيئة.

★ ان الظواهر التي رافقت نضج البذرة تسمح لهذه الأخيرة بتحمل الظروف القاسية للوسط في انتظار الإنبات.

ج - إنبات البذرة: أنظر الوثيقة 14.


a - البذرة ومكوناتها: أنظر الشكل أ.

الوثيقة 14: إنبات البذرة.

الشكل ب: أهمية الحرارة والرطوبة في إنبات البذور

النتائج	ظروف وسط الزرع	
	حالة القطن	درجة الحرارة
إنبات البذور	مبلل بالماء	20 °C
عدم إنبات البذور	جاف	20 °C
عدم إنبات البذور	مبلل بالماء	6 °C


الشكل أ: مناولة: نضع بذور فاصوليا في إناء به ماء لعدة ساعات، ثم نزيل قشرتها، ونلاحظها بالعين المجردة، ثم بالمكبر الزوجي.




رسم تخطيطي لمقطع بذرة فاصوليا

بذرة مشرحة

الشكل د: الكشف عن التنفس عند البذور.



الشكل ج: نضع فوق قطن مبلل بذور نبات الفاصوليا، وفق الظروف التجريبية المبينة في الوثيقة أسفله. ماذا تستنتج من نتائج هذه التجربة؟



تتكون البذرة من قشرة خارجية تحيط بفلقة أو فلقتين غنية بالمخدرات، يوجد بها جنين يتكون من جذير وسويق ووريات (الشكل أ).

b - شروط إنبات البذرة: أنظر الشكل ب، ج ود.

يتطلب الإنبات ظروفا ملائمة. أهمها:

- وجود الماء الذي يسمح بتليين أغلفة البذرة حيث تصبح مرنة ونفوذ للغازات، مما يؤدي إلى استعادة نشاط البذرة، الذي ينتج عنه تمزيق الأغلفة وبروز الجذير.
- الحرارة الملائمة التي تلعب دورا مهما في تنشيط الأنزيمات وبالتالي استعادة نشاط البذرة.
- الهواء (الأكسجين) الذي يمكن من تفكيك المخدرات العضوية لإنتاج الطاقة الضرورية لنمو الجنين وبالتالي إنباته.

c - المظاهر الفيزيولوجية لإنبات البذرة: أنظر الوثيقة 15 والوثيقة 16.

الوثيقة 15: نأخذ بذورا في مراحل مختلفة من الإنبات. نزيل أجنحتها ونحتفظ بالسويداء. نهرس سويدااء كل من

البذور في إناء مختلف بوجود الماء.

نرشح المحلول المحصل عليه ثم نختبر الرشاخة باستعمال الماء اليودي الذي يكشف عن وجود النشا، ومحلول فهلينغ الذي يكشف عن الكليكوز. النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول أسفله.


على ضوء نتائج تلون الكواشف، حدد كمية كل من النشا ثم سكر الكليكوز في سويدااء البذور. باستعمال الرموز التالية:

+++ وجود كمية مهمة، ++ كمية متوسطة، + كمية قليلة، - غياب.

كيف تفسر نتائج هذه التجربة؟

مراحل الإنبات	ساعة	ساعتين	ثلاث ساعات
الاختبار بالماء اليودي	تلون أزرق داكن	تلون أزرق داكن	تلون أزرق جد فاتح
كمية النشا			
الاختبار بمحلول فهلينغ + التسخين	غياب الراسب الأحمر	راسب أحمر أجوري	راسب أحمر قاتم
كمية الكليكوز			

الوثيقة 16: الكشف عن تحرير الحرارة خلال عملية الإنبات.



خلال إنبات البذور، نسجل:

✓ انخفاض تدريجي للنشا (سكر معقد) وظهور تدريجي للكليكوز (سكر بسيط) (الوثيقة 15)، لا يمكن تفسير هذه النتيجة إلا بكون النشا يتعرض للتحلل بوجود الماء فيتحول إلى كليكوز، نسمي هذا التفاعل بحلمأة النشا ويحدث وفق التفاعل الكيميائي التالي:




✓ طرح البذرة لثاني أكسيد الكربون مع تحريرها لكمية من الطاقة، يفقد جزء منها في شكل حرارة، (الوثيقة 16). لا يمكن تفسير هذه النتيجة إلا بحدوث تفاعلات أكسدة مستهلكة لمادة طاقة (الكليكوز) لدى خلايا الجنين من أجل الحصول على الطاقة اللازمة للنمو، يمكن تلخيص ذلك في التفاعل الكيميائي التالي:



يتمثل الإنبات إذن في مظاهر فيزيولوجية تتجلى في تنشيط الوظائف الفيزيولوجية الأساسية (تغذية، تنفس، نمو، تركيب...) حيث تخرج البذرة ثم النبتة من الحياة البطيئة إلى الحياة النشيطة.

ملحوظة: تحتاج هذه التفاعلات إلى أنزيمات، تلزم حرارة معينة، هذا ما يبرر حدوث الإنبات في ظروف حرارية محددة.


d – مراحل إنبات البذرة: أنظر الوثيقة 17.



عندما تتوفر الظروف الملائمة من ماء، هواء وحرارة، فان البذرة تنبت حسب المراحل التالية:

- دخول الماء إلى البذرة مما يؤدي إلى انتفاخها وتمزق الأغشية المحيطة بها.
- بروز الجدير وانغرازه في التربة.
- نمو الجدير وتفرعه إلى جذور ثانوية.
- بروز الساق وبروز البرعم الذي سيعطي الأوراق.
- يتلاشى غشاء البذرة وتذبل الفلقتين.

⑥ دورة النمو عند كاسيات البذور. أنظر الوثيقة 18




تتميز حياة الكائن الحي الذي يتوالد جنسيا، بتتالي عدة أحداث تبندئ بالإخصاب وتنتهي بالإخصاب الموالي، مروراً بالنمو والانقسام الاختزالي. يشكل تعاقب هذه الأحداث دورة النمو

خلال دورة النمو عند كاسيات البذور، نقوم بتحديد موقع الإخصاب والانقسام الاختزالي. وبهذا نحدد مرحلتين أو جيلين:

- جيل ثنائي الصيغة الصبغية يتمثل في النبات المورق: من الإخصاب إلى الانقسام الاختزالي.
- جيل أحادي الصيغة الصبغية، يتمثل في الكيس الجنيني وحبوب اللقاح، من الانقسام الاختزالي إلى الإخصاب.

II – التوالد الجنسي عند عاريات البذور.

النباتات عاريات البذور هي نباتات زهرية تتميز أساسا بكونها تنتج بذورا غير محفوظة داخل الثمرة. وتضم مجموعة كثيرة التنوع من الأشجار، والشجيرات مثل الصنوبر Le pin، الأرز Le cèdre، العرعر Juniperus... (أنظر الوثيقة 19)



تحمل غالبية عاريات البذور بذورها داخل مخاريط. وتُعدُّ المخروطيات أكثر النباتات عاريات البذور شهرة، وتتميز أوراق غالبية المخروطيات بأنها شبه إبرية. وتنمو بذورها على السطح العلوي للحراشف التي تتكون منها المخاريط. تظل غالبية المخروطيات دائمة الخضرة، و ذلك بتساقط الأوراق المسنة، ونمو أوراق حديثة باستمرار.

- ما هي البنيات المسؤولة عن التوالد عند عاريات البذور؟
- كيف يتم التوالد الجنسي عند عاريات البذور؟

① أعضاء التوالد عند عاريات البذور.

يتم التوالد الجنسي عند عاريات البذور على مراحل، ويتطلب عدة سنوات، وغالبا ما يحدث ابتداء من فصل الربيع. توجد الأزهار عند عاريات البذور ضمن مخاريط، وهي أزهار مختزلة في الأعضاء التوالدية أي بدون كأس أو تويج. لدى تصنف هذه النباتات ضمن ما نسمي بالمخروطيات = les Conifères.


لدراسة التوالد الجنسي عند عاريات البذور، نأخذ كمثال نبات الصنوبر.

أ – أعضاء التوالد الذكرية: أنظر الوثيقة 20.

الوثيقة 20: الأعضاء التوالدية الذكرية عند عاريات البذور (شجر الصنوبر).




- 1 شجرة صنوبر تظهر غصن ومخروط ناضج، مع أوراق إبرية.
 - 2 المخاريط السدائية الذكرية للصنوبر.
 - 3 ملاحظة مجهرية لحبوب لقاح الصنوبر.
 - 4 رسوم تخطيطية لأعضاء التوالد الذكرية عند الصنوبر.
- انطلاقاً من معطيات هذه الوثيقة، تعرف الأعضاء التوالدية الذكرية عند الصنوبر.




- ✓ تتمثل الأعضاء التوالدية الذكرية في شكل مجموعة من المخاريط، يتموضع في قاعدة برعم السنة. ويتشكل كل مخروط ذكري من عدة حراشف Ecailles متموضعة حول المحور.
- ✓ يحمل كل حرشف في وجهه السفلي كيسين منبريين (كيسي لقاح) توجد بداخلهما حبوب اللقاح. و تتميز حبوب اللقاح عند الصنوبر بتوفرها على كيسين هوائيين يسهلان تبعثرها بواسطة الرياح.
- ✓ مقارنة مع كاسيات البذور، يمكن اعتبار الحرشف الذكري سداة وبالتالي فإن المخروط عبارة عن زهرة أحادية الجنس.
- ✓ تتشكل حبوب اللقاح داخل كيس اللقاح عبر المراحل الأساسية التالية: أنظر الوثيقة 21.

الوثيقة 21: مراحل تشكل حبة اللقاح عند الصنوبر.




- تتعرض الخلية الأم لحبة اللقاح (2n) لانقسام اختزالي فتعطي 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية تدعى بويغات (n).
- يتعرض كل بويغ إلى انقسامين غير مباشرين ليعطي أربع خلايا.
- تخضع هذه الخلايا لمرحلة تفريق (يتكون الكيسان الهوائي بامتلاء الحيز البيغشائي على الجانبين بالهواء) فنحصل على حبة لقاح تحتوي على خلية أو خليتا النبات المشيجي (الخلايا المشيرية)، خلية انباتية، وخلية توالدية.

ب - أعضاء التوالد الأنثوية: أنظر الوثيقة 22.




- ✓ تتمثل الأعضاء التوالدية الأنثوية في شكل مخروط صغير (1 cm)، مكون من عدة حرشف حمراء اللون، ويتموضع في قمة برعم السنة.
- ✓ يحمل كل حرشف على وجهه العلوي بيضتين ويسمى حرشفاً بيضياً، وبالتالي فالمخروط هو عبارة عن زهرة أحادية الجنس.
- ✓ تتشكل حاملة الأمشاج عند الصنوبر حسب المراحل التالية: أنظر الوثيقة 23.



- في السنة الأولى، تخضع هذه الخلية إلى انقسام اختزالي فتعطي 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n) تسمى الأبواغ الكبيرة.
- تتحلل 3 أبواغ وتبقى واحدة. تخضع لعدة انقسامات غير مباشرة، لتشكل الكيس الجنيني (مشيرة أنثوية)، الذي ينمو على حساب الجوزة.
- يتوقف نمو المشيرة خلال فصل الشتاء ليستأنف في ربيع السنة الموالية، حيث تتفرق خليتان أو ثلاث من خلايا الكيس الجنيني الموجودة قرب النقيير، وتعطي كل واحدة منها حامله ببيضة غير ملقحة (حامله الأمشاج) تتضمن ببيضة غير ملقحة محاطة بطبقة من الخلايا العقيمة.

② من الإخصاب إلى إنبات البذور. أنظر الوثيقة 24.

الوثيقة 24: من الإخصاب إلى إنبات البذور



أ - الأبر:

- يتوفر الصنوبر (وجل عاريات البذور) على أزهار مختزلة، يغيب فيها الكأس (مجموع السبلات) والتويج (مجموع الأوراق التويجية)، مما لا يترك مجالاً للأبر بواسطة الحشرات، حيث تتم هذه العملية أساساً بواسطة الرياح.
- تتوفر حبوب اللقاح على أكياس هوائية تساعدها على الأبر بواسطة الرياح. ويكون هذا الأبر غير مباشر (متقاطع).
- بوصولها إلى المخروط الأنثوي، تنسل حبوب اللقاح بين الحراشف الأنثوية، فتصل إلى قمة الببيضة. بعد ذلك تنسد حراشف المخروط الأنثوي لحماية البويضات المأبورة.
- في نفس السنة، يبدأ إنبات حبوب اللقاح، حيث يحرر أنبوب لقاح، يخترق الجوزة حاملاً في مقدمته الخلية الانباتية، أما الخلية التوالدية فتبقى في مكانها. وبهذه الأحداث يتوقف الإنبات خلال السنة الأولى.

ب - الإخصاب:


- في ربيع السنة الثانية، يتواصل نمو أنبوب اللقاح في اتجاه حامله الأمشاج التي تكون في طور التشكل. فتتضاعف الخلية التوالدية لتعطي حبيبين مثبريين يتموضعان خلف الخلية الانباتية داخل أنبوب اللقاح.
- يخترق أنبوب اللقاح عنق حامله الأمشاج، فينحل طرفه ثم يفرغ محتواه داخل الببيضة غير الملقحة.

- يتم إخصاب الببيضة غير الملقحة بواسطة حيي مئبري واحد، أما الحيي المئبري الآخر والخلية الانباتية فيتعرضان للانحلال.
- ينتج عن الإخصاب بيضة ثنائية الصيغة الصبغية (2n).

ج - تشكل البذور وانباتها:

مباشرة بعد الإخصاب، تتعرض البيضة إلى انقسامين، فتتكون أربع خلايا جنينية، تتطور كل واحدة منها لتعطي جنينا، لكن سرعان ما يتوقف نمو ثلاثة منها، بينما يواصل جنين واحد نموه ليغطي نبيطة فتية. في نفس الوقت تتجمع المدخرات المقيمة في خلايا السويداء، و يتلجنن (بخشوشب) غشاء الببيضة الملقحة، وتفقد الماء، لتدخل في حياة بطيئة. إنها البذرة. تظل البذرتان المشكلتان خلال صيف السنة الثانية داخل المخاريط الأنثوية. و خلال فصل الربيع من السنة الثالثة، تيبس الحراشف وتنفصل عن بعضها البعض، حيث يحمل كل حرشف على سطحه بذرتين مجنحتين يسهل انتشارهما بواسطة الرياح. بعد سقوطها على التربة، تثبت بذور عاريات البذور وفق ظروف و شروط الإنبات عند كاسيات البذور، لتعطي نبتة جديدة.

د - دورة النمو عند عاريات البذور: (شجرة الصنوبر) أنظر الوثيقة 25.



تتميز دورة النمو عند عاريات البذور بوجود جيلين: جيل ثنائي الصيغة الصبغية يتمثل في الصنوبر المورق الذي يشكل النبات البوغي، وهي المرحلة السائدة في الدورة. وجيل أحادي الصيغة الصبغية ممثل في المشيرة التي تحتوي على حاملة الأمشاج (نبات مشيجي). إن دورة نمو الصنوبر هي دورة أحادية - ثنائية الصيغة الصبغية مع سيادة الطور الثاني الصيغة الصبغية.